

صبح جمعه
۸۷/۱۱/۲۵

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور



آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۸۸

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
(کد ۱۳۱۷)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی	۳۰	۱	۳۰
۲	الودگی‌های محیط زیست	۳۰	۳۱	۶۰
۳	اکولوژی حیات وحش	۳۰	۶۱	۹۰
۴	شناخت و حمایت محیط زیست	۳۰	۹۱	۱۲۰
۵	ارزیابی محیط زیست	۳۰	۱۲۱	۱۵۰
۶	بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری	۳۰	۱۵۱	۱۸۰

بهمن ماه سال ۱۳۸۷

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

PARDAZESHPUH.COM
PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- The rise in unemployment was just a further ----- of the government's incompetence.
 1) inclination 2) approximation 3) modification 4) manifestation
- 2- The country's most valuable agricultural ----- include wheat and rice.
 1) revenues 2) attributes 3) proportions 4) commodities
- 3- These changes are a(an)----- to wide-ranging reforms.
 1) prelude 2) allocation 3) schedule 4) implication
- 4- Honesty is a very attractive character -----.
 1) trait 2) prospect 3) conviction 4) outcome
- 5- The driver was found guilty on ----- the speed limit.
 1) pursuing 2) enhancing 3) exceeding 4) surpassing
- 6- The members of the committee will be ----- on October 25.
 1) restoring 2) locating 3) convening 4) accompanying
- 7- The region needs housing which is strong enough to ----- severe wind and storms.
 1) object 2) recline 3) diminish 4) withstand
- 8- Two decades ----- between the completion of the design and the operation of the dam.
 1) overlapped 2) intervened 3) transferred 4) overwhelmed
- 9- The ----- goal of this research is to gather data on the process of first language acquisition.
 1) principal 2) successive 3) continual 4) insightful
- 10- Flexibility is ----- to creative management.
 1) intrinsic 2) compatible 3) forthcoming 4) contemporary

PART B: Grammar

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

The computer evolved from mechanical calculating machines that could do arithmetic by having cogs and levers that turned and moved (11) ----- numbers. The first one was built by the French inventor Blaise Pascal in 1642. Pascal's calculating machine was improved over the next 200 years, and in 1833 the British mathematician Charles Babbage designed a machine (12) ----- be "programmed" to carry out different mathematical operations. This machine was called the Analytical Engine. It (13) ----- to have the mechanical equivalent of the input, processing, memory, and output units found in today's electronic computers.

Over a hundred years (14) -----, in 1944, a mechanical computer, powered by electricity, was completed in the United States on Babbage's principle. (15) -----, in the previous year, the first electronic computer had been built in Britain. It was called Colossus and was used to crack enemy codes during World War II.

- | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 11- 1) representing | 2) to represent | 3) for representing | 4) from representing |
| 12- 1) which can | 2) that could | 3) where it can | 4) where it could |
| 13- 1) meant | 2) was meant | 3) had the meaning | 4) was the meaning |
| 14- 1) subsequent | 2) next | 3) later | 4) following |
| 15- 1) Since then | 2) Therefore | 3) However | 4) Afterwards |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and choose the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark it on your answer sheet.

As cold-blooded predators, crocodiles are lethargic, therefore survive long periods without food, and rarely need to actively go hunting. Despite their slow appearance, crocodiles are top predators in their environment, and various species have been observed attacking and killing sharks. A famous exception is the Egyptian plover which is said to enjoy a symbiotic relationship with the crocodile. According to unauthenticated reports, the plover feeds on parasites that infest the crocodile's mouth and the reptile will open its jaws and allow the bird to enter to clean out the mouth. Many large crocodilians swallow stones and they are believed to be of use in acting as ballast to balance their body. Other suggestions have been made that they may have a function similar to that of grit in birds, which is in crushing food. Salt glands are present in the tongues of most crocodylids and they have a pore opening on the surface of the tongue. They appear to be similar to those in marine turtles, however these seem to be absent in Alligatoridae. Crocodilians can produce sounds during distress and in aggressive displays. They can also hear well and the tympanic membranes are concealed by flat flaps that may be raised or lowered by muscles. Crocodiles are protected in many parts of the world, but they also are farmed commercially. Their hide is tanned and used to make leather goods such as shoes and handbags, whilst crocodile meat is also considered a delicacy. The most commonly farmed species are the Saltwater and Nile crocodiles. Farming has resulted in an increase in the Saltwater crocodile population in Australia, as eggs are usually harvested from the wild, so landowners have an incentive to conserve crocodile habitat.

Nuisance wildlife management is the term given to the process of selective removal of problem individuals or populations of certain species of wildlife. Some species of wildlife may become habituated to man's presence causing property damage or risk transfer of disease to humans or pets. Many wildlife species coexist with humans very successfully. In fact, commensal rodents have become more or less dependent on people. Typically, species that are most likely to be considered a nuisance by humans have the following characteristics. First, they are adaptable to fragmented habitat. Animals such as Canada geese love ponds with low sloping banks leading to lush green grass. Unsurprisingly, humans love this sort of landscaping too. Thus it is perfectly understandable that Canada geese have thrived. Second, these animals are not tied to eating a specific type of food. For example, lynx do not thrive in human impacted environments because they rely so heavily on snowshoe hares. In contrast, raccoons have been incredibly successful in urban landscapes because they can live in attics, chimneys, and even sewers and can sustain themselves with food gained from trashcans. Third, successful animals must not pose a significant risk to human health and safety. Animals perceived as grave threats will incur the incredible ire of humans and be under constant threat of humans seeking their demise. Finally, successful animals in humanized landscapes are often perceived as cute, at least until they become so numerous that their preferential status becomes diminished. Many wildlife species have the potential of becoming a nuisance species. Whether or not a species becomes a pest can be directly correlated to the degree at which that animal can be tolerated by humans.


- 21- We understand from the passage that -----.**
- 1) pets usually transfer dangerous diseases to humans
 - 2) Canada geese are able to adapt to a fragmented habitat
 - 3) species of rodents coexist very successfully with people
 - 4) man's presence is quite habitual with species of wildlife
- 22- It is stated in the passage that -----.**
- 1) geese feed on the green grass near the ponds
 - 2) lynx is regarded as a common nuisance species
 - 3) nuisance species can survive on a specific food
 - 4) raccoons are not tied to eating a specific type of food
- 23- The passage points to the fact that -----.**
- 1) nuisance species are not a very serious threat to human life
 - 2) snowshoe hares are found only in compacted environments
 - 3) food gained from trashcans can put human life at great risk
 - 4) humans are normally after the extinction of nuisance species
- 24- The passage suggests that -----.**
- 1) we don't often regard nuisance species as ugly
 - 2) humanized landscapes are considered to be cute
 - 3) a pest is a developed species of nuisance species
 - 4) nuisance species have a great potential as wildlife
- 25- The word 'ire' in line 16 (underlined) is best related to -----.**
- 1) 'pain'
 - 2) 'anger'
 - 3) 'threat'
 - 4) 'attention'

Warm water typically decreases the level of dissolved oxygen in the water. The decrease in levels of dissolved oxygen can harm aquatic animals such as fish, amphibians and copepods. Thermal pollution may also increase the metabolic rate of aquatic animals, as enzyme activity, resulting in these organisms consuming more food in a shorter time than if their environment were not changed. An increased metabolic rate may result in food source shortages, causing a sharp decrease in a population. Changes in the environment may also result in a migration of organisms to another, more suitable environment, and to in-migration of organisms that normally only live in warmer waters elsewhere. This leads to competition for fewer resources; the more adapted organisms moving in may have an advantage over organisms that are not used to the warmer temperature. As a result one has the problem of compromising food chains of the old and new environments. Biodiversity can be decreased as a result. It is known that temperature changes of even one to two degrees Celsius can cause significant changes in organism metabolism and other adverse cellular biology effects. Principal adverse changes can include rendering cell walls less permeable to necessary osmosis, coagulation of cell proteins, and alteration of enzyme metabolism. These cellular level effects can adversely affect mortality and reproduction. Primary producers are affected by warm water because higher water temperature increases plant growth rates, resulting in a shorter lifespan and species overpopulation. This can cause an algae bloom which reduces the oxygen levels in the water. The higher plant density leads to an increased plant respiration rate because the reduced light intensity decreases photosynthesis. This is similar to the eutrophication that occurs when watercourses are polluted with leached agricultural inorganic fertilizers.

- 26- It is stated in the passage that -----.**
- 1) decreased levels of oxygen make for high temperature waters
 - 2) number of aquatic animals can depend on their metabolic rate
 - 3) thermal pollution does not always lead to food source shortages
 - 4) amphibians, fish and copepods are harmed by dissolved oxygen
- 27- The passage mentions that -----.**
- 1) algae bloom may be the result of higher water temperatures
 - 2) warm aquatic environments affect the biodiversity adversely
 - 3) in-migration can only happen in thermal pollution conditions
 - 4) migrating organisms quickly adapt to high water temperatures
- 28- We may understand from the passage that -----.**
- 1) oxygen levels in primary producers is an index of growth in warm waters
 - 2) higher growth rates alter the enzyme metabolism and balance of protein
 - 3) aquatic animals' cellular biology functions best at low temperatures
 - 4) speed of plant respiration is related to the amount of photosynthesis
- 29- Which of the following is NOT affected as a result of higher water temperature in water?**
- 1) 'plant density'
 - 2) 'oxygen levels'
 - 3) 'eutrophication'
 - 4) 'plants' lifespan'
- 30- The word 'leached' in the passage is best related to the word -----.**
- 1) 'consumed'
 - 2) 'dissolved'
 - 3) 'warmed'
 - 4) 'leaked'

- به فرآیندی که در آن از میکرووارگانیزم‌ها برای تجزیه و کاهش مواد آلاینده خاک استفاده می‌کنند چه می‌گویند؟ -۲۱
Phytoremediation (۴) **Nitrification** (۳) **Eutrophication** (۲) **Bioremediation** (۱)
- غلظت بعضی از عناصر و ترکیبات در بدن موجودات زنده در امتداد زنجیره غذایی افزایش می‌یابد. به این پدیده چه می‌گویند؟ -۲۲
 ۱) تجزیه زیستی ۲) بزرگنمایی زیستی ۳) رشد ناهنجار بیولوژیکی ۴) یوتربیکاسیون
- کدامیک از اکسیدهای نیتروژن خاصیت سمی بودن بیشتری را دارد؟ -۲۳
 ۱) NO_x (۴) ۲) NO_y (۳) ۳) N₂O (۲)
- در بحث پیرامون ذرات، کدام گروه از ذرات ذیل از نظر تأثیر بر سلامتی انسان بیشترین اهمیت را دارد؟ -۲۴
 ۱) PM_{2,5} (۴) ۲) PM₅ (۳) ۳) PM_{۰,۵} (۲)
- کدامیک از آلاینده‌ها به خصوص در فصل تابستان برای بسیاری از انواع آبزیان سمی و خطرناک است؟ -۲۵
 ۱) فسفات‌ها ۲) گاز آمونیاک محلول در آب ۳) مواد آلی معلق ۴) یون آمونیوم
- کدامیک از آلاینده‌ها از نظر تأثیر بر سلامتی انسان‌ها، اثر هم بیشی دارند؟ -۲۶
 ۱) منواکسید ازت و دی‌اکسید کربن ۲) منواکسید کربن و دی‌اکسید ازت ۳) دی‌اکسید گوگرد و منواکسید ازت ۴) ذرات معلق و دی‌اکسید گوگرد
- هرگاه کاهش درجه حرارت اتمسفر نسبت به ارتفاع از سرعت کاهش آدیاباتیک کمتر باشد، وضعیت ثبات و پایداری اتمسفر و در نتیجه پراکنش آلاینده‌ها چگونه خواهد بود؟ -۲۷
 ۱) تغییرات درجه حرارت اتمسفر تأثیری بر پراکنش آلاینده‌ها ندارد. ۲) اتمسفر باثبات و پایدار است و پراکنش آلاینده‌ها محدود می‌شود.
 ۳) اتمسفر بسیار بی‌ثبات است و پراکنش آلاینده‌ها به نحو مطلوب پراکنده نمی‌شوند.
 ۴) اتمسفر بی‌ثبات است اما به دلیل کاهش درجه حرارت با افزایش ارتفاع، آلاینده‌ها به نحو مطلوب پراکنده نمی‌شوند.
- بیشترین ماده آلاینده که در نتیجه ترافیک وسایط نقلیه بنزینی و گازوئیلی به ترتیب وارد هوا می‌شوند کدام است؟ -۲۸
 ۱) NO_x-HC (۴) ۲) NO_x-CO (۳) ۳) HC-CO (۲) ۴) CO-NO_x
- بهترین و تنها راه از بین بودن آلودگی نفتی در مناطق قطبی کدام روش است؟ -۲۹
 ۱) احتراق ۲) استفاده از مواد جاذب ۳) به تعیق در آوردن نفت ۴) تشکیل سدهای شیمیایی
- در پایش آلودگی هوا، کدامیک بعنوان PSI تعیین و اعلام می‌شود؟ -۳۰
 ۱) بالاترین PSI محاسبه شده برای یک آلاینده ۲) کمترین PSI محاسبه شده برای آن آلاینده
 ۳) مجموع PSI‌های محاسبه شده برای آلاینده‌ها ۴) میانگین PSI‌های محاسبه شده برای آلاینده‌ها
- سمیت کدامیک از فرم‌های کروم (Cr) و آرسنیک (As) بیشتر است؟ -۳۱
 ۱) As(V), Cr(VI) (۴) ۲) As(III), Cr(VI) (۳) ۳) As(III), Cr(III) (۲) ۴) As(V), Cr(III)
- کدامیک از عناصر سنگین دارای ویژگی بزرگنمایی زیستی در زنجیره غذایی است؟ -۳۲
 ۱) آرسنیک ۲) سرب ۳) جیوه ۴) کروم
- بیشترین و مهمترین آلاینده‌های الی در اثر ترکیب مواد الی با کدام عنصر تشکیل می‌شوند؟ -۳۳
 ۱) فلزات سنگین ۲) فلورور ۳) گوگرد ۴) کلر
- سهم کدامیک از منابع در الودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی بیشتر است؟ -۳۴
 ۱) روان آب‌های شهری ۲) زه آب‌های کشاورزی ۳) فاضلاب‌های شهری ۴) فاضلاب‌های صنعتی
- در فرایند نیترات‌سازی، تبدیل نیتریت به نیتروات به وسیله کدام گروه از میکرووارگانسیم‌ها انجام می‌گیرد؟ -۳۵
 ۱) باکتری‌های نیتروباکتر ۲) باکتری‌های ترموفیل ۳) باکتری‌های نیتروزومonas ۴) باکتری‌های بی‌هوایی
- استعمال دخانیات در افزایش جذب کدام عنصر به وسیله بدن نقش دارد؟ -۳۶
 ۱) ارسنیک ۲) جیوه ۳) سرب ۴) کادمیوم
- میزان کل جامدات محلول (TDS) یک نمونه فاضلاب برابر $\frac{\text{mg}}{\text{L}}$ ۲۵۰۰ اندازه‌گیری شده است. این مقدار بیانگر غلظت در نمونه می‌باشد. -۳۷
 ۱) مجموع آنیون‌ها ۲) مجموع کاتیون‌ها ۳) مجموع آنیون‌ها و کاتیون‌ها ۴) مجموع کاتیون‌ها
- حضور کدامیک از آلاینده‌ها در آب باعث تغییر طعم و مزه آن می‌شود؟ -۳۸
 ۱) نیترات ۲) الاینده‌های میکروبی ۳) ترکیبات نفتی ۴) سوم افت‌کش
- هدف از ارایه استانداردهای کیفیت هوا تعیین کدام است؟ -۳۹
 ۱) PSI (۱) ۲) میزان حداقل نشر آلاینده‌ها ۳) میزان اثرات آلاینده‌ها بر روی انسان ۴) میزان حداقل نشر آلاینده‌ها
- کدام گاز ناشی از تجزیه زباله در قسمت‌های زیرین محل دفن بهداشتی متراکم می‌شود و چه تأثیری بر کیفیت آب‌های زیرزمینی دارد؟ -۴۰
 ۱) آمونیاک - افزایش اسیدیته و قلیانیت ۲) دی‌اکسید کربن - افزایش مواد معدنی و سختی
 ۳) متان - افزایش قلیانیت ۴) سولفید هیدروژن - ایجاد بو و طعم نامطبوع
- جهت رسم نمودار وارونگی هوا دو پارامتر مورد نیاز به ترتیب از راست به چپ در دو محور افقی و عمودی کدامند؟ -۴۱
 ۱) ارتفاع - دما ۲) رطوبت - دما ۳) دما - ارتفاع ۴) دما - رطوبت

- ۵۲ کدام یک معیار لازم برای یک آفت‌کش خوب نیست؟
- ۱) انتخابی عمل کردن آن
 - ۲) پایداری زیاد آن در محیط‌زیست
 - ۳) عدم قابلیت تجمع آن در زنجیره غذایی
 - ۴) پایداری کم آن در محیط‌زیست
- ۵۳ فعالیت‌های کدام یک از بخش‌های زیر موجب تولید آلودگی‌های غیرمتصرکز (بی‌کانون) می‌شود؟
- ۱) کشاورزی
 - ۲) صنعتی
 - ۳) منازل و مسکن
 - ۴) معادن
- ۵۴ کدام یک روشی مناسب تر برای حل مشکل زباله‌های شهری است؟
- ۱) جمع‌آوری و دفن زباله‌ها در زیر خاک
 - ۲) ریختن آن‌ها در دره‌های عمیق و پرکردن آنها
 - ۳) سوزاندن زباله‌ها در کوره‌های زباله‌سوز
 - ۴) مدیریت درجهت کاهش میزان تولید زباله
- ۵۵ مقاومت کدام یک در برابر دی‌اکسید‌گوگرد (SO_2) بیشتر است؟
- ۱) صنوبر
 - ۲) نراد
 - ۳) نوبل
 - ۴) نمدار
- ۵۶ نقش کدام یک در کاهش آلودگی نفتی دریا بیشتر است؟
- ۱) اشعه ماوراء بنفش
 - ۲) افزایش میزان بارندگی
 - ۳) میکروارگانیسم‌ها
 - ۴) کاهش میزان بارندگی سالیانه
- ۵۷ عایق‌بندی حرارتی و کاهش تبادل هوا در منازل و اماكن بسته مهمترین عامل افزایش در آنها است.
- ۱) دی‌اکسین
 - ۲) رادون
 - ۳) گاز کربنیک
 - ۴) متان
- ۵۸ پان و ازن حاصل واکنش هیدروکربن‌ها و با کمک اشعه ماوراء بنفش خورشید در بالای جو است.
- ۱) اکسیدهای کربن
 - ۲) اکسیدهای گوگرد
 - ۳) اکسیدهای سرب
 - ۴) اکسیدهای نیتروژن
- ۵۹ زمینه فعالیت پروتکل کیوتو کدام است؟
- ۱) کاهش آلودگی نفتی در دریاها
 - ۲) مدیریت پایدار مواد زائد و جامد و دفع زباله‌ها
 - ۳) کدام یک در کاهش پایداری آفت‌کش‌های موجود در خاک موثرتر است؟
- ۶۰
- ۱) افزودن خاک رس
 - ۲) افزودن مواد آلی
 - ۳) افزودن مواد آلی و معدنی به نسبت مساوی

- ۶۱ استفاده از کدام تله موثرترین روش برای صید پرنده‌گان آبزی و کنار آبزی محسوب می‌گردد؟
 Rocket net (۴) Mist net (۳) Drop net (۲) Clap net (۱)
- ۶۲ کدام مورد در تعدیل رانش ژنتیکی (Genetic drift) در جمیعت‌های کوچک بیشترین تأثیر را دارد؟
 (Mutation) (۱) سازش (Adaptation) (۲) بروز کوچی (Emigration) (۳) درون کوچی (Immigration) (۴) جهش (Allele)
- ۶۳ اثر Allee چیست؟
 (۱) یک جمیعت فقط از چند فرد شکل گرفته و خلوص ژنتیکی بالایی دارد.
 (۲) بدیل کاهش تنوع ژنتیکی جمیعت، حساسیت به بیماری‌ها افزایش می‌یابد.
 (۳) کارکردهای اجتماعی در گونه‌های اجتماعی زی بدیل کوچک شدن جمیعت دچار اختلال می‌گردد.
 (۴) گونه‌های همبوی همبوی برای کاهش رقابت با یکدیگر در آشیان بوم شناختی خود متخصص می‌شوند.
- ۶۴ پناه (Cover) برای حیات وحش به چه معنی است؟
 (۱) مکانی که طعمه خوار برای حمله سریع و غافلگیرانه در آنجا کمین می‌کند.
 (۲) مکانی که طعمه برای مخفی شدن یا در امان ماندن از طعمه خوار به آنجا می‌رود.
 (۳) مکانی که حیوان به کمک آن می‌تواند شرایط سخت آب و هوایی را پشت سریگذارد.
 (۴) هر عامل فیزیکی زیستگاه که بتواند هر یک از عملکردهای طبیعی حیوان را تأمین یا حمایت کند.
- ۶۵ کدام یک از شاخص‌های زیر به مفهوم تعداد گونه‌های موجود در یک مکان یا اکوسیستم می‌باشد؟
 (۱) Alpha diversity (نوع آلفا)
 (۲) Beta diversity (نوع بتا)
 (۳) Gamma diversity (نوع گاما)
 (۴) Lambda diversity (نوع لامدا)
- ۶۶ روش تجزیه و تحلیل فاکتوری آشیان اکولوژیک (ENFA) به کدام نرم‌افزار قابل اجراست؟
 Ramas Ecolab (۴) SPSS (۳) Vortex (۲) Biomapper (۱)
- ۶۷ کدام یک از موارد زیر شرط نهایی در انتخاب زیستگاه برای گونه‌هایی است که به شکل دسته جمعی زادآوری می‌کنند؟
 (۱) مطلوبیت بالای زیستگاه
 (۲) حضور سایر افراد از همان گونه
 (۳) عدم حضور طعمه‌خواران به ویژه طعمه‌خواران زمینی
 (۴) دسترس پذیری به منابع غذایی فراوان برای تغذیه جوجه‌ها
- ۶۸ بیشترین میزان تولید آب متابولیک در جانوران از اکسیداسیون کدام ماده بدست می‌آید؟
 (۱) چربی‌ها
 (۲) پروتئین
 (۳) کربوکسیدراتها
 (۴) ناشاسته
- ۶۹ کدام یک از آزمون‌های زیر برای سنجش ناهمگنی واریانس‌ها بکار می‌رود؟
 (۱) بار تله
 (۲) کای مرربع
 (۳) همبستگی اسپیرمن
 (۴) کولموگروف - اسمیرنوف
- ۷۰ نسبت مساحت ۳ زیستگاه A، B و C برای گور در منطقه پهراشم ۰٪، ۴۲٪، ۱۸٪ و ۴۰٪ است که ترتیب ۳۷، ۴۲ و ۴۰ گروه سرگین در ۳ زیستگاه یاد شده مذکور شمارش شدند. گور کدام زیستگاه را ترجیح می‌دهد؟
 C و A (۴)
- ۷۱ در معادله لوتكا و ولترا، اثر رقابت گونه دوم بر گونه اول را با نشان می‌دهیم.
 α۲۱ (۴) α۱۲ (۳) $\frac{k_1}{\alpha_{12}}$ (۲) $\frac{k_2}{\alpha_{21}}$ (۱)
- ۷۲ الگوی مکانی توزیع جانداران در یک منطقه را می‌گویند.
 (۱) انتشار (Migration) (۲) توزیع (Dispersion) (۳) پراکندگی (Distribution)
- ۷۳ واحد نرخ قطعی رشد (λ) و واحد نرخ ذاتی رشد (r) به ترتیب از راست به چپ عبارتند از:
 (۱) یک سال - یک سال
 (۲) یک سال - یک ماه
 (۳) یک سال - فاصله زمانی بین دو زادآوری
 (۴) فاصله زمانی بین دوزادآوری - هر دوره زمانی مشخص
- ۷۴ در معادله رشد منطقی $\frac{dN}{dT} = rN(\frac{k-N}{k})$ در صورتی که N خیلی کوچک باشد (نزدیک به صفر)، شکل منحنی رشد به کدام یک از اشکال زیر نزدیکتر خواهد بود؟
- 
- ۷۵ رقابت درون گونه‌ای و بین گونه‌ای به ترتیب باعث و پهنه‌ای آشیان بوم شناختی (Niche) گونه می‌گردد.
 (۱) افزایش می‌افزایش
 (۲) افزایش کاهش
 (۳) کاهش می‌افزایش
 (۴) کاهش کاهش
- ۷۶ با توجه به اصل جارمن بلکه در کدام گروه از نشخوارکنندگان زیر بزرگتر است؟
 (۱) علف‌جرها
 (۲) میوه‌خوارها
 (۳) سرشاخه‌خوارهای انتخابی
 (۴) تغذیه کنندگان حد وسط (علف‌چر و سرشاخه‌خوار)

-۷۷ در صورتی که تراکم لانه‌های یک پرنده در سه زیستگاه یک منطقه متفاوت باشد، کدامیک از طرح‌های نمونه‌گیری زیر برآورد دقیق‌تری از تراکم لانه‌ها (که در واحدهای نمونه‌گیری شمارش می‌شوند) بدست خواهد داد؟

- (۱) تصادفی ساده (Cluster sampling) (Simple random sampling)

(Stratified random sampling) (Systematic sampling)

- (۴) اشکوبندی شده تصادفی (Systematic sampling)

-۷۸ کدامیک از پارامترهای زیر برای بدست آوردن تراکم حیوان براساس تراکم گروه‌های سرگین (که در طول یک ماه در پلات‌های تمیز شده تجمع یافته‌اند) ضروری است؟

- (۱) تعداد دفعات دفع در شبانه روز

- (۲) نرخ تجزیه گروه‌های سرگین

- (۳) متوسط تعداد سرگین در یک گروه سرگین


-۷۹ در صورتی که محدوده آشیان بوم شناختی (Niche) یک گونه (S_2) در داخل محدوده آشیان بوم شناختی گونه رقیب (S_1) باشد، با توجه به نمودار مقابل نتیجه رقابت چه خواهد شد؟

- (۱) گونه اول (S_1) گونه دوم (S_2) را از میدان بدر می‌کند.

- (۲) گونه اول (S_1) می‌تواند در مناطقی که گونه دوم (S_2) حضور ندارد زندگی کند.

- (۳) گونه دوم (S_2) گونه اول (S_1) را از میدان بدر می‌کند.

- (۴) هر دو گونه می‌توانند در محدوده آشیان بوم شناختی گونه دوم (S_2) حضور داشته باشند.



-۸۰ اگر فقط چند فرد از یک جمعیت به زیستگاهی جدید منتقل شوند به نحوی که برقراری ارتباط آنها با سایر جمعیت‌ها غیر ممکن شود، کدامیک از موارد زیر بروز خواهد نمود؟

- (۱) اثر علی (Allee effect)

- (۲) اثر بروز (Bruce effect)

- (۳) اثر حاشیه (Edge effect)

-۸۱ بنیانگذار علم زیست‌شناسی حفاظت چه کسی است؟

- (۱) جان التون (۲) جمیز هاتون

-۸۲ در مورد پرنده‌گانی مثل گاو چرانک که از انگلهای بیرونی سمداران تغذیه می‌کنند کدامیک از روابط زیر صدق می‌کند؟

- (۱) انگلی (۲) رقابتی

-۸۳ کدامیک از تله‌های زیر کشنده است؟

- (۱) Havahart (۲) Conibear

-۸۴ در روش کلدال میزان نیتروژن موجود در یک ماده غذایی $4/5$ گرم محاسبه شده است. مقدار پروتئین موجود در آن حدوداً چند گرم است؟

- (۱) $26/5$ (۲) $28/1$ (۳) $21/5$ (۴) $25/0$

-۸۵ کدامیک از موارد زیر معرف اصل جابجایی صفات (Character displacement) است؟

- (۱) طول منقار دو گونه پرنده هنگام همجایی (Sympatry) متفاوت و هنگام دگر جایی (Allopatry) مشابه است.

- (۲) رنگ دو گونه حلوzon هنگام همجایی (Sympatry) مشابه و هنگام دگر جایی (Allopatry) متفاوت است.

- (۳) طول منقار دو گونه پرنده هنگام همجایی (Sympatry) مشابه و هنگام دگر جایی (Allopatry) متفاوت است.

-۸۶ (۴) رنگ دو گونه حلوzon هنگام همجایی (Sympatry) متفاوت و هنگام دگر جایی (Allopatry) مشابه است.

برای محاسبه حدود اعتماد میانگین یک برآورد، به کدام گروه از داده‌های زیر نیاز است؟

- (۱) میانه و انحراف استاندارد (۲) مقدار ۱ از جدول و اشتباہ معیار

- (۳) مقدار F از جدول و انحراف استاندارد

-۸۷ مفهوم آشیان بوم شناختی بنیادی (Fundamental Niche) به کدامیک از پارامترهای دموگرافیک زیر نزدیک‌تر است؟

- (۱) I_m (۲) R_o (۳) N_o (۴) I

-۸۸ در شرایط مشابه اندازه آشیان بوم شناختی (Niche) یک گونه در کدامیک از محیط‌های مشخص شده در زیر می‌تواند کوچکتر باشد؟

- (۱) ناپایدار (۲) قابل پیش‌بینی

- (۳) غیرقابل پیش‌بینی

-۸۹ در کدامیک از روش‌های برآورد جمعیت زیر هر حیوان صید شده باید دارای نشانه ویژه باشد؟

- (۱) Petersen (۲) Schnabel (۳) Jolly-Seber (۴) Mark - resighting

-۹۰ تراکم گروه‌های سرگین شوکا در یک منطقه 10 کیلومتر مربعی ۶ گروه در 100 متر مربع برآورد شده است. در صورتی که مدت زمان تجمع

گروه‌های سرگین در پلات‌های تمیز شده ۲ ماه و تعداد دفعات دفع در یک شبانه‌روز ۲۰ بار باشد، فراوانی شوکا در این منطقه چقدر است؟

- (۱) 120 (۲) 150 (۳) 500 (۴) 1500

- نقش بوم‌شناختی وجود درختان دار خشک در داخل جنگل کدام است؟
 ۱) افزایش پخش و پراکندگی حشرات
 ۲) کاهش ارزش کیفی درختان جنگلی
 ۳) کاهش زادآوری و تجدید حیات طبیعی
 ۴) بالاترین میزان مصرف و هدرروی آب مربوط به کدام بخش است؟
- ۹۱
- ۱) آب شرب
 ۲) تجارت
 ۳) صنعت
- ۹۲
- ناحیه‌ای از ساحل یک دریاچه که تحت تأثیر باشمان آب قوار می‌گیرد چه نام دارد؟
 ۱) Eulittoral
 ۲) Supralittoral
 ۳) Uperlittoral
- ۹۳
- در افزایش متوسط طول عمر انسان (امید به زندگی) نقش کدام یک موثرتر است؟
 ۱) کاهش زاد و ولد
 ۲) افزایش مرگ و میر در سنین کودکی و نوجوانی
 ۳) افزایش مرگ و میر در سنین پیری
- ۹۴
- مزوپاز (Mesopause) کدام یک از لایه‌های اتمسفر را از هم جدا می‌کند؟
 ۱) استراتوسفر - ترموسفر
 ۲) استراتوسفر - تروپوسفر
 ۳) استراتوسفر - یونوسفر
 ۴) تروپوسفر - یونوسفر
- ۹۵
- براساس توصیه IUCN، حدود چند درصد مساحت یک کشور باید به عنوان مناطق تحت حفاظت اختصاص یابد؟
 ۱) ۲۰٪
 ۲) ۱۵٪
 ۳) ۱۰٪
 ۴) ۵٪
- ۹۶
- رابطه تنوع و ارتفاع درختان در جنگل با افزایش ارتفاع از سطح دریا چگونه است؟
 ۱) ارتفاع درختان افزایش - تنوع درختان کاهش می‌یابد.
 ۲) ارتفاع و تنوع درختان کاهش می‌یابد.
 ۳) تنوع افزایش، ارتفاع درختان افزایش می‌یابد.
 ۴) تنوع و ارتفاع درختان کاهش می‌یابد.
- ۹۷
- سومین نشست رسمی سران کشورهای جهان در زمینه محیط زیست در چه سالی و در کدام کشور برگزار شد؟
 ۱) ۱۹۷۲ - استکلهلم
 ۲) ۱۹۹۲ - ریودوزانیرو
 ۳) ۱۹۹۴ - مونترال
 ۴) ۲۰۰۲ ژوهانسبورگ
- ۹۸
- مدیریت آفات یک رویکرد اکوسیستمی کنترل آفات است که هدف آن مهار آفات است و نه انقراض آنها.
 ۱) اقتصادی
 ۲) تلفیقی
 ۳) صنعتی
 ۴) محدود
- ۹۹
- کدام یک از واژه‌های ذیل در ارتباط با اکوسیستم‌های تخریب شده صادق است؟
 ۱) Subclimax
 ۲) Polyclimax
 ۳) Monoecimax
 ۴) Disclimax
- ۱۰۰
- فرضیه گایا یوسیله کدام یک مطرح شده است؟
 ۱) ادوم
 ۲) بولتزمن
 ۳) جیمز لاولاک
 ۴) کوبس
- ۱۰۱
- کل ماده آلی که توسط بخش تولیدکنندگان طی عمل فتوسنتز ساخته می‌شود، چه نامیده می‌شود؟
 ۱) تولید اولیه
 ۲) تولید اولیه ناخالص
 ۳) تولید ناخالص
 ۴) تولید ناخالص
- ۱۰۲
- رویشگاه بلوط ایرانی (Q-persoica) در کدام منطقه است؟
 ۱) اروپا - سیبری
 ۲) البرز جنوبی
 ۳) زاگرس
 ۴) کرانه‌های دریای عمان
- ۱۰۳
- در یک اکوسیستم، موجوداتی که از طریق تجزیه بقاوی گیاهی و جانوری چرخش مواد را تکمیل می‌کنند نامیده می‌شوند.
 ۱) آوتروف
 ۲) الیکوتروف
 ۳) ساپروتروف
 ۴) هتروتروف
- ۱۰۴
- کدام عبارت با اصل وحدت زیست محیطی مطابقت دارد؟
 ۱) سیستم‌های زیست محیطی تأثیرات متقابل بر هم دارند.
 ۲) عامل اصلی تغییرات محیطی، فعالیت‌های انسان است.
 ۳) فرایندهای تغییر شکل دهنده زمین در گذشته و حال مشابه هستند.
 ۴) زمین به عنوان یک ابر موجود زنده توانایی سازگاری با تغییرات را دارد.
- ۱۰۵
- در چرخه هیدرولوژیک، بیشترین میزان تبخیر و بارش به ترتیب مربوط به چه مناطقی است؟
 ۱) دریاها - دریاها
 ۲) دریاها - جنگل‌ها
 ۳) دریاها - مناطق قطبی
- ۱۰۶
- در یک اکوسیستم دریاچه‌ای، کدام شکل کربن غیرآلی در pH بالاتر از ۱۰ غالب می‌گردد؟
 ۱) H_2CO_3
 ۲) HCO_3^-
 ۳) CO_3^{2-}
- ۱۰۷
- به ترتیب کدام عامل‌ها موجب افزایش حلایت اکسیژن محلول در آب می‌شوند؟
 ۱) افزایش رطوبت هوا - افزایش شوری
 ۲) کاهش رطوبت هوا - افزایش شوری
 ۳) افزایش رطوبت هوا - افزایش شوری
- ۱۰۸
- به ترتیب مکانیسم‌های بی‌حالی (Torpor) و توقف رشد (Diapause) در کدام مناطق مورد استفاده قرار می‌گیرند؟
 ۱) قطبی - قطبی
 ۲) قطبی - کویرهای گرم
 ۳) کویرهای گرم - قطبی
- ۱۰۹
- نظریه اشتقاد قاره‌های موجود در کره زمین بوسیله کدام یک ارائه شده است؟
 ۱) تبل
 ۲) میلر
 ۳) لاپلاس
- ۱۱۰
- رنگ آمیزی استنتاری نشان دهنده کدام نوع مکانیسم خود - نظمی در سیستم‌های زنده است؟
 ۱) بیولوژیکی
 ۲) رفتاری
 ۳) ریختی یا مورفوولوژیکی
- ۱۱۱
- کدام زیستگاه فراوانترین منبع غذایی را با کمترین درجه رقابت برای جانوران تأمین کرده است؟
 ۱) آبی
 ۲) خاکی
 ۳) زیرزمینی
- ۱۱۲

- گونه‌های گیاهی سازگار با شوری خاک را گویند.
 ۱) اپیفیت ۲) هالوفیت
 ۳) تالوفیت ۴) کرزوفیت
- نتیجه عمل فتوسنتز در گیاهان سبز در اتمسفر است.
 ۱) افزایش میزان CO_2 ۲) کاهش میزان O_2
 ۳) کاهش میزان NO_2 ۴) افزایش میزان CO_2
- حفاظت و حمایت از محیط‌زیست دریایی در برابر آلودگی از وظایف کدام کنوانسیون است?
 ۱) کویت ۲) تشویق زیستی
 ۳) رامسر
- تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوری و گیاهی در معرض خطر
 ۱) کدام یک گسترده‌ترین زیستگاه محسوب می‌شود?
 ۲) آبهای شیرین ۳) آبهای شور
 ۴) خاکی
- اگر نرخ رشد یک جمعیت به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد، زمان دو برابر شدن آن جمعیت چه تغییری می‌کند?
 ۱) به نصف کاهش می‌یابد. ۲) تغییری نمی‌کند.
 ۳) دو برابر می‌شود. ۴) چهار برابر می‌شود.
- تشکیل ذخیره گاه بیوسفری با شکل گیری کدام یک از سازمان‌های بین‌المللی همراه بود?
 ۱) FAO ۲) MAB ۳) IUCN
- کدام یک موجب حفظ پایداری و تنوع در اکوسیستم‌های جنگلی و مرتعی می‌شود?
 ۱) آتش‌سوزی طبیعی ۲) بذرپاشی و کوددهی
 ۳) حذف گونه‌های خوش خوراک ۴) جلوگیری کامل از ورود دام
- کدام یک به عنوان اساس پایداری اکوسیستم‌ها محسوب می‌شود?
 ۱) مدیریت نهاده‌های ورودی و خروجی از اکوسیستم به وسیله انسان
 ۲) بزرگی و وسعت اکوسیستم
 ۳) تغییرات آب و هوایی در محدوده اکوسیستم

- ۱۲۱- ارزیابی چند متغیره کامپیوتري و یا همان MCE یک روش است و برای مناسب است.
- ۱) سیستمی، ارزیابی آبها
 - ۲) مختص استرالیا، ارزیابی جنگلها
 - ۳) سیستمی، مناطق متنوع بوم شناختی
 - ۴) غیرسیستمی، ارزیابی حداکثر نیمی از ایران برای کاربری های کلان پطور جداگانه
- ۱۲۲- در تعیین تناسب یک یگان محیط‌زیستی برای آبزی پروری کدام یک از عوامل زیر مهم‌ترند؟
- ۱) ارتفاع، سنگ مادر
 - ۲) جهت دامنه، ارتفاع
 - ۳) شب، سنگ مادر
- ۱۲۳- در ارزیابی بیشتر به کدام یک از موضوعات زیر بها داده می‌شود؟
- ۱) ساختار اکوسیستم
 - ۲) فرایندهای اکولوژیک و عملکرد اکوسیستم
- ۱۲۴- در ارزیابی کلی هم زمان ۲۰ استان ایران برای کاربری های مختلف از کدام روش استفاده می‌کنیم؟
- ۱) دو عامله
 - ۲) فقط از پوشش گیاهی به عنوان مبنای ارزیابی
 - ۳) چند عامله براساس منابع کلیدی و شاخص
- ۱۲۵- دور کاوی و GIS در ارزیابی محیط‌زیست به ترتیب چه نقشی دارند؟
- ۱) مدیریت - منبع تامین داده‌ها
 - ۲) مدیریت - ادغام نقشه‌ها
 - ۳) منبع تامین داده‌ها - تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی اطلاعات
 - ۴) منبع تامین داده‌ها - ادغام نقشه‌ها
- ۱۲۶- وجود گونه آندمیک در یک منطقه اولویت کدام کاربری زیر را بیشتر می‌کند؟
- ۱) جنگلداری
 - ۲) حفاظت
 - ۳) کشاورزی
 - ۴) مرتعداری
- ۱۲۷- واحد کاری در منابع طبیعی برای ارزیابی محیط‌زیست کدام است؟
- ۱) سامان عرفی
 - ۲) حوزه آبخیز
 - ۳) محدوده شهرستان
 - ۴) محدوده حفاظت شده
- ۱۲۸- دفتر آمایش سرزمین برای اولین بار در کدام سازمان و در چه سالی ایجاد شد؟
- ۱) سازمان برنامه و بودجه - ۱۲۶۵
 - ۲) سازمان برنامه و بودجه - ۱۳۵۳
 - ۳) سازمان حفاظت محیط‌زیست - ۱۳۶۵
 - ۴) سازمان حفاظت محیط‌زیست - ۱۳۵۳
- ۱۲۹- از مدل رقومی ارتفاع می‌توان نقشه را بدست آورد.
- ۱) تراکم آبراهه‌ها
 - ۲) تراکم چشم‌های منطقه
 - ۳) زیستگاه حیات وحش
 - ۴) سنگ‌شناسی منطقه
- ۱۳۰- اگر فاصله منحنی‌های میزان بر روی زمین $\frac{1}{50000}$ متر و مقیاس نقشه $\frac{1}{50000}$ باشد، شب ۵ تا ۱۵ درصد بر روی نقشه چند میلی‌متر خواهد بود؟
- ۱) بیش از ۱۶۰
 - ۲) بین ۱۶ و ۵۲
 - ۳) بین از ۱۶ و ۵/۳
 - ۴) بین ۳ و ۱۶
- ۱۳۱- در ارزیابی چند متغیره کامپیوتري (MCE) یک منطقه ۱۰۰ هزار هکتاری برای جنگلداری از رسترهایی با ابعاد ۱۰۰ ستون و ۱۰۰ ردیف استفاده شده است. در این صورت حداکثر پس از ترکیب شب ۷ طبقه‌ای و ارتفاع ۸ طبقه‌ای چند قطعه جهت ارزیابی خواهیم داشت؟
- ۱) ۵۶۰۰۰
 - ۲) ۱۰۰۰۰
 - ۳) $\frac{1}{10000}$
 - ۴) $\frac{1}{50000}$
- ۱۳۲- روش شبکه‌ها برای ارزیابی به روش مناسب است.
- ۱) ترکمن صحرا، کامپیوتري
 - ۲) سلسله کوه‌های زاگرس، دستی
 - ۳) کل ایران، کامپیوتري
 - ۴) نیمرخ شمالی البرز، کامپیوتري
- ۱۳۳- برای تهیه نقشه طبقات شبی محدوده شهرستان تهران نیاز به نقشه توپوگرافی با مقیاس داریم.
- ۱) $\frac{1}{250000}$
 - ۲) $\frac{1}{50000}$
 - ۳) $\frac{1}{10000}$
 - ۴) $\frac{1}{5000}$
- ۱۳۴- در گام اول ارزیابی به روش دستی، منابع براساس انتخاب و نقشه‌سازی می‌شوند.
- ۱) ایجاد حساسیت برای اکوسیستم‌های ارزشمند، تعیین کنندگی میزان توسعه
 - ۲) تأثیرگذاری بر تناسب و یا حساسیت و جداسازی اکوسیستم‌ها
 - ۳) قابلیت مدیریت، موجود بودن منابع نقشه‌ای، هزینه
 - ۴) عدم همیستگی، تناسب برای جنگلداری و حفاظت و توسعه
- ۱۳۵- با کدام یک از روش‌های زیر می‌توان ارزش پدیده‌های موجود در یک نقشه را از طریق عملیات ریاضی به طور یکسان تغییر داد؟
- ۱) ایجاد حاشیه
 - ۲) تبادلات
 - ۳) توابع Scaler
 - ۴) روی هم گذاری
- ۱۳۶- در لایه‌های اطلاعاتی برداری، اطلاعات توصیفی کجا ذخیره می‌شوند؟
- ۱) پیکسل‌ها
 - ۲) پایگاه داده
 - ۳) فراداده
 - ۴) لایه‌های برداری فاقد اطلاعات توصیفی هستند.
- ۱۳۷- برای مطالعات چند مقیاسی کدام یک از داده‌های ماهواره‌ای زیر مناسب است؟
- ۱) MSS
 - ۲) NOAA
 - ۳) Aster
 - ۴) Liss III
- ۱۳۸- نقشه تراکم درصد پوشش گیاهی با ۳ طبقه تراکمی کم، متوسط و زیاد نشان دهنده چه نوع داده‌ای می‌باشد؟
- ۱) نسبی
 - ۲) فاصله‌ای
 - ۳) اسمی
 - ۴) رتبه‌ای
- ۱۳۹- به صحت موقعیت یک پدیده بر روی نقشه در مقایسه با موقعیت روی زمین چه گفته می‌شود؟
- ۱) صحت هندسی
 - ۲) صحت موضوعی
 - ۳) همسانی
 - ۴) مقیاس

-۱۴۰

- کدام یک از ویژگی‌های مدل‌های اکولوژیک ایران هستند؟
 ۱) برای ارزیابی یک عامله ساخته شده‌اند.

۲) طبقه‌بندی توان سرزمین براساس شرایط محلی است.

۳) مدل‌های اکولوژیک فقط توان سرزمین را نشان می‌دهند و سرزمین را طبقه‌بندی نمی‌کنند.

۴) بودن چند رخداد در واحد زیست محیطی نشان داشتن توان سرزمین برای کاربری مورد نظر است در مدل اکولوژیک توسعه شهری و روستایی اولویت کدام پارامتر از سایرین بیشتر است؟

-۱۴۱

- ۱) ارتفاع از سطح دریا ۲) پوشش گیاهی ۳) سرعت باد ۴) هیدرولوژی

۵) مطابق مدل ارزیابی توان اکولوژیک چنانچه جهت جغرافیایی و آب با طبقه ۲ تفرق متمرکز مطابقت داشته باشد و شیب و خاک با طبقه ۱ تفرق متمرکز، کدام گزینه، درست است؟

-۱۴۲

- ۱) تفرق متمرکز طبقه ۱ ۲) تفرق گسترده طبقه ۱
 ۳) تفرق گسترده طبقه ۲ ۴) تفرق گسترده طبقه ۲

۶) کدام گروه از فعالیت‌ها تماماً جزو تفرق متمرکز محسوب می‌شوند؟

-۱۴۳

۱) اردوزدن، کوه نورده، ماهیگیری، شکار

۲) اسب‌سواری، ماهیگیری، شکار

-۱۴۴

۱) اردوزدن، کوه نورده، ماهیگیری

۲) دو چرخه‌رانی، اسکی، خورگشت

-۱۴۵

۳) حاسترین سنگ نسبت به فرسایش کدام مورد است؟

۱) گرانیت

۲) مارن

-۱۴۶

۳) نقشه یگان‌های زیست محیطی از تلفیق کدامیک از منابع زیر بدست می‌آیند؟

-۱۴۷

- ۱) منابع اکولوژیکی ۲) منابع فیزیکی
 ۳) منابع زیست محیطی ۴) منابع اکولوژیکی پایدار

-۱۴۸

۵) روش ایان مک‌هارگ کدام‌یک از روش‌های ارزیابی را در بر می‌گیرد؟

-۱۴۹

۱) ارزیابی یک عامله ۲) ارزیابی دو عامله

-۱۵۰

۳) ارزیابی چند عامله ۴) ارزیابی به روش شبکه‌ها

-۱۴۱

۵) زمین سیما بیان فیزیکی کدام سطح از تنوع زیستی است؟

-۱۴۲

- ۱) تنوع رنگی ۲) تنوع گونه‌ای

-۱۴۳

۳) حداقل مساحت یگان‌های زیست محیطی در یک مطالعه با مقیاس $\frac{1}{100,000}$ چند هکتار خواهد بود؟

-۱۴۴

-۱۴۵

۱) ۱۰ ۲) ۲۵ ۳) ۵۰ ۴) ۱۰۰

-۱۴۶

-۱۴۷

۵) در ارزیابی محدوده شهرستان نور برای کاربری دفن زباله کدام‌یک از عوامل زیر مهم‌ترند؟

-۱۴۸

-۱۴۹

-۱۵۰

- ۱) ارتفاع، جهت، پوشش گیاهی ۲) شیب، پوشش گیاهی، ارتفاع ۳) شیب، جهت، ارتفاع

-۱۵۱

-۱۵۲

-۱۵۳

-۱۵۴

-۱۵۵

-۱۵۶

-۱۵۷

-۱۵۸

-۱۵۹

-۱۶۰

-۱۶۱

-۱۶۲

-۱۶۳

-۱۶۴

-۱۶۵

-۱۶۶

-۱۶۷

-۱۶۸

-۱۶۹

-۱۷۰

-۱۷۱

-۱۷۲

-۱۷۳

-۱۷۴

-۱۷۵

-۱۷۶

-۱۷۷

-۱۷۸

-۱۷۹

-۱۸۰

-۱۸۱

-۱۸۲

-۱۸۳

-۱۸۴

-۱۸۵

-۱۸۶

-۱۸۷

-۱۸۸

-۱۸۹

-۱۹۰

-۱۹۱

-۱۹۲

-۱۹۳

-۱۹۴

-۱۹۵

-۱۹۶

-۱۹۷

-۱۹۸

-۱۹۹

-۲۰۰

-۲۰۱

-۲۰۲

-۲۰۳

-۲۰۴

-۲۰۵

-۲۰۶

-۲۰۷

-۲۰۸

-۲۰۹

-۲۱۰

-۲۱۱

-۲۱۲

-۲۱۳

-۲۱۴

-۲۱۵

-۲۱۶

-۲۱۷

-۲۱۸

-۲۱۹

-۲۲۰

-۲۲۱

-۲۲۲

-۲۲۳

-۲۲۴

-۲۲۵

-۲۲۶

-۲۲۷

-۲۲۸

-۲۲۹

-۲۳۰

-۲۳۱

-۲۳۲

-۲۳۳

-۲۳۴

-۲۳۵

-۲۳۶

-۲۳۷

-۲۳۸

-۲۳۹

-۲۴۰

-۲۴۱

-۲۴۲

-۲۴۳

-۲۴۴

-۲۴۵

-۲۴۶

-۲۴۷

-۲۴۸

-۲۴۹

-۲۴۱

-۲۴۲

-۲۴۳

-۲۴۴

-۲۴۵

-۲۴۶

-۲۴۷

-۲۴۸

-۲۴۹

-۲۴۱

-۲۴۲

-۲۴۳

-۲۴۴

-۲۴۵

-۲۴۶

-۲۴۷

-۲۴۸

-۲۴۹

-۲۴۱

-۲۴۲

-۲۴۳

-۲۴۴

-۲۴۵

-۲۴۶

-۲۴۷

-۲۴۸

-۲۴۹

-۲۴۱

-۲۴۲

-۲۴۳

-۲۴۴

-۲۴۵

-۲۴۶

-۲۴۷

-۲۴۸

-۲۴۹

-۲۴۱

-۲۴۲

-۲۴۳

-۲۴۴

-۲۴۵

-۲۴۶

-۲۴۷

-۲۴۸

-۲۴۹

-۲۴۱

-۲۴۲

-۲۴۳

-۲۴۴

-۲۴۵

-۲۴۶

-۲۴۷

-۲۴۸

-۲۴۹

-۲۴۱

-۲۴۲

-۲۴۳

- ۱۵۱ - کدام یک از خانواده‌های زیر در زیر راسته *Ruminantia* قرار دارد؟
 ۱) در پهنه و ساقه شاهپرها اولیه و ثانویه
 ۲) در حاشیه خارجی و حاشیه داخلی انتهای شاهپرها اولیه
 ۳) در حاشیه داخلی و حاشیه خارجی انتهای شاهپرها اولیه
 ۴) کدام یک از خانواده‌های زیر در زیر راسته *Ruminantia* (Camelidae) (Giraffidae) است؟
- ۱۵۲ - کدام یک از موارد زیر معمولاً در پرندگان صحیح است؟
 ۱) گلbul های قرمز خون دارای هسته و ماده‌ها دارای تخدمان و تخم راهه چپ هستند.
 ۲) گلbul های قرمز خون فاقد هسته و ماده‌ها دارای تخدمان و تخم راهه چپ هستند.
 ۳) مثانه معمولاً موجود نیست و ماده‌ها دارای تخدمان و تخم راهه راست هستند.
 ۴) مثانه معمولاً موجود و گلbul های قرمز خون دارای هسته هستند.
- ۱۵۳ - استخوان‌های *Metapodials* در کدام گروه از پستانداران زیر بیش از بقیه طویل شده است؟
 ۱) پنجه‌رو (Digitigrade)
 ۲) سم رو (Unguligrade)
 ۳) کف رو (Plantigrade)
 ۴) نیمه پنجه‌رو (Semi-digitigrade)
- ۱۵۴ - کدام یک از گونه‌های زیر در مناطق دشتی تر و با پوشش (پناه) کمتر دیده می‌شود؟
 ۱) آهوی ایرانی
 ۲) جیر
 ۳) گور ایرانی
 ۴) مرال
- ۱۵۵ - در یک گروه گرگ، غالبترين فرد کدام است?
 ۱) نر بتا
 ۲) ماده بتا
 ۳) ماده آلفا
 ۴) نر آلفا
- ۱۵۶ - دندان‌های گوشت بر (Carnassial) شامل کدام دندان‌ها می‌گردد؟
 ۱) آخرین دندان پیش آسیا در آرواره بالا و پایین
 ۲) اولین دندان آسیا در آرواره بالا و پایین
 ۳) آخرین دندان پیش آسیا در آرواره بالا و اولین دندان آسیا در آرواره پایین
 ۴) اولین دندان آسیا در آرواره بالا و آخرین دندان پیش آسیا در آرواره پایین
- ۱۵۷ - ظرفیت دریافت نور از نسبت به چشم محاسبه شده و برای پرندگان شب پرواز این ظرفیت است.
 ۱) مساحت شبکیه - مساحت قرنیه - بالا
 ۲) مساحت شبکیه - مساحت عنبه - پایین
 ۳) مساحت قرنیه - مساحت عنبه - بالا
- ۱۵۸ - کدام یک از گربه‌سانان زیر با محیط‌های آبی سازش یافته تر است?
 ۱) پلنگ
 ۲) ببر
- ۱۵۹ - کدام یک گستره خانگی (Home range) وسیع‌تر دارد?
 ۱) شاه روباه
 ۲) شغال
- ۱۶۰ - کوچکترین گله‌ها مربوط به کدام است?
 ۱) آهو
 ۲) بز و پازن
- ۱۶۱ - از نظر تکاملی کدام به سگ‌سانان نزدیک‌تر است?
 ۱) پلنگ
 ۲) بوز
- ۱۶۲ - کدام گونه از نظر ساختمان دستگاه گوارش با بقیه متفاوت است?
 ۱) بز و پازن
 ۲) شوکا
- ۱۶۳ - کدام گونه بیشتر از مواد گیاهی تغذیه می‌کند?
 ۱) خرس قهوه‌ای
 ۲) روباه معمولی
- ۱۶۴ - غدد تولید بو در سمداران در چه محل‌هایی قرار گرفته است?
 ۱) پشتی - شکمی
 ۲) پیش چشمی - بین سمی
- ۱۶۵ - کدام گونه از گونه‌های زیر در مناطق با تنوع زیستگاهی بیشتری دیده می‌شود?
 ۱) پشتی - بین سمی
 ۲) روباه شنی
- ۱۶۶ - چه سازگاری در شکل تخم و شکل آشیانه پرندگان مناطق دشتی خشک و نیمه خشک شکل گرفته است?
 ۱) تخمهای سفید و آشیانه کاسه‌ای متراکم از خار و خاشاک در بوته‌های آنبوه می‌باشد.
 ۲) تخمهای سفید رنگ و آشیانه درون سوراخ‌های جوندگان بنا می‌شود.
 ۳) تخمهای سفید با لکه‌های روشن فراوان و در زیر سنگ‌ها و بوته‌ها بنا می‌شود.
 ۴) رنگ‌آمیزی روی تخم شبیه به قلوه سنگ‌ها و آشیانه چاله‌ای کوچک با مواد و مصالح بسیار اندک است.
- ۱۶۷ - چند جمعیت از اردک سرسفید (*Oxyura leucocephala*) در جهان وجود دارد و جمعیت ایران جزو کدام یک از آنهاست?
 ۱) جمعیت - جمعیت آسیایی
 ۲) جمعیت - جمعیت آسیایی
 ۳) جمعیت - جمعیت آسیایی
 ۴) جمعیت - جمعیت آسیایی
- ۱۶۸ - در کدام پرنده زیر نیم نوک بالایی متحرک است و غذا را به درون دهان می‌ریزد?
 ۱) پلیکان سفید
 ۲) فلامینگو
 ۳) کفچه نوک
- ۱۶۹ - (اردک نوک بین)

- ۱۷۰- بین کدام زیر گونه‌های قرقاول (*Phasianus colchicus*) در نوار شمالی ایران گزارش‌های مشکوکی از بروز هیبریداسیون وجود دارد؟
 P.c. persicus × P.c. talischensis (۲) P.c. principalis × P.c. colchicus (۱)
 P.c. colchicus × P.c. talischeusis (۴) P.c. persicus × P.c. principalis (۳)
- ۱۷۱- منطقه جغرافیای جانوری Holoarctic شامل کدام‌یک از مناطق جغرافیای جانوری زیر می‌گردد؟
 Oriental و Palearctic (۴) Oriental و Australian و Nearctic (۳) Palearctic و Nearctic (۲) Australian (۱)
- ۱۷۲- کامل ترین نوزاد در کدام گروه از پستانداران زیر بدنیا می‌آید؟
 Prototheria (۴) Monotremata (۳) Metatheria (۲) Eutheria (۱)
- ۱۷۳- کدام گونه زندگی انفرادی دارد؟
 ۱) روباه معمولی ۲) قوچ و میش
 ۳) گرگ ۴) یوز
- ۱۷۴- کدام‌یک از پرنده‌گان زیر قبل از برواز کمی روی آب می‌دوند؟
 ۱) اردک سرخنایی و فیلوش ۲) خوتکا و اردک سرخنایی
- ۱۷۵- غدد نمکی در کدام پرنده رشد بیشتری دارد؟
 ۱) اگرت کوچک ۲) باکلان
 ۳) اردک بلوطی ۴) غاز پیشانی سفید
- ۱۷۶- انجستان پا در کدام‌یک از گونه‌های زیر زرد رنگ است و با رنگ پاها تباين دارد؟
 ۱) اگرت کوچک ۲) حواصیل ارغوانی
 ۳) حواصیل خاکستری ۴) گاو چرانک
- ۱۷۷- به کدام‌یک از پرهای زیر، پرهای دهانی گفته می‌شود؟
 ۱) رشته پر ۲) شاهپر
 ۳) کرک پر ۴) موی پر
- ۱۷۸- با توجه به پراکنش جغرافیایی و زیستگاه، کدام گروه از گونه‌های زیر می‌توانند با هم در یک منطقه حضور داشته باشند؟
 ۱) آهوی کوهی، کاراکال، گربه‌شنی، شاه روباه
 ۲) تیهو، خرس سیاه، گراز، کبک چیل
 ۳) پلنگ، سیاه گوش، کل و بز، کبک دری
 ۴) مرال، کبک چیل، خرس قهوه‌ای، شاه روباه
- ۱۷۹- روده کوچک در پرنده‌گان است.
 ۱) گیاه خوار کوتاه ۲) گوشت خوار بلند
- ۱۸۰- جوجه‌های کدام پرنده زودرس (Precocial) است?
 ۱) بحری ۲) کبوتر چاهی