

صبح جمعه  
۹۳/۱۲/۱۵

دفترچه شماره ۱۱ از ۲



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.

## آزمون ورودی دوره‌های دکتری (نیمه مرکز) داخل - سال ۱۳۹۴

### بیوتکنولوژی کشاورزی (۲۴۳۵)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (زنگیک عمومی، مبانی بیوشیمی - زنگیک (بیوکاریوت و پروکاریوت)، بیولوژی سلولی و مولکولی، بیوتکنولوژی کشاورزی)	۸۰	۱	۸۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسفند ماه - سال ۱۳۹۳

- ۱ جعبه **TATA** مربوط به کدام فرآیند ژنتیکی است؟
- (۱) ترجمه      (۲) نو ترکیبی      (۳) رونویسی DNA
- ۴ همانندسازی DNA      ۲۸ (۴) سلول لایه آلورون در گیاه جو، دارای چند کروموزوم است؟
- ۲۱ (۳)      ۱۴ (۲)
- ۲ ژن‌های کنترل کننده صفات محدود به جنس (**Sex-limited**) روی چه کروموزومی قرار دارند؟
- (۱) کروموزوم‌های X و اتوزومی      (۲) کروموزوم‌های اتوزومی Y
- ۴ کروموزوم X      ۳ کروموزوم Y
- ۳ اگر گیاهی  $10 = 2n = 2x$  باشد، تعداد مولکول‌های DNA در متافاز میتوزی، متافاز ۱ و متافاز ۲ به ترتیب از راست به چپ کدام است؟
- (۱) ۵، ۱۰، ۱۰      (۲) ۱۰، ۱۰، ۲۰      (۳) ۵، ۲۰، ۱۰      (۴) ۱۰، ۲۰، ۲۰
- ۴ اگر سه جایگاه ژنی A، B و C با اثر افزایشی در تعیین رنگ دانه یک گیاه نقش داشته باشند به گونه‌ای که ژنوتیپ aa bb cc دارای رنگ سفید و ژنوتیپ AA BB CC دارای رنگ قرمز تیره باشد، چند نوع رنگ دانه در نسل  $F_2$  قابل انتظار است؟
- (۱) ۷      (۲) ۸      (۳) ۱۶      (۴) ۲۷
- ۵ یک نشانگر ژنتیکی بایستی دارای کدام ویژگی باشد؟
- (۱) قابلیت توارث و چند شکلی      (۲) هتروزیگوستی و چند شکلی
- (۳) قابلیت توارث و هموزیگوستی      (۴) هتروزیگوستی
- به انتقال ماده ژنتیکی از یک باکتری به باکتری دیگر توسط ویروس‌ها چه گفته می‌شود؟
- (۱) Inoculation      (۲) Transduction      (۳) Transformation      (۴) Conjugation
- ۶ کدام عامل، با اتصال به پروتئین، آن را برای تحریب علامت‌گذاری می‌کند؟
- (۱) CAMP      (۲) عوامل رونویسی      (۳) پروتئین‌های G      (۴) یوبی‌کوئتین
- ۷ ژن‌های منقطع و پلی‌سیسترونیک، (به ترتیب از راست به چپ) بیشتر مختص چه موجوداتی هستند؟
- (۱) باکتری‌ها - ویروس‌ها      (۲) پروکاریوتی - پروکاریوتی      (۳) یوکاریوتی - یوکاریوتی      (۴) پلیمراز، هم ویژگی پلیمرازی  $3' \rightarrow 5'$  و هم اگزونوکلئازی  $5' \rightarrow 3'$  دارد؟
- ۸ (۱) DNA پلیمراز I در باکتری‌ها      (۲) DNA پلیمراز III در باکتری‌ها      (۳) DNA پلیمراز  $\alpha$  در یوکاریوت‌ها      (۴) DNA پلیمراز  $\delta$  در یوکاریوت‌ها
- ۹ قدیمی‌ترین قطعه اوکازاکی در کدام بخش از DNA در حال همانندسازی قرار می‌گیرد؟
- (۱) انتهای  $3'$  رشتہ دنباله‌رو      (۲) انتهای  $5'$  رشتہ دنباله‌رو      (۳) انتهای  $3'$  رشتہ پیش‌رو
- ۱۰ در تجزیه تترادهای حاصل از تلاقي AB $\times$ ab در نوروسیپورا، ۶۵ آسک والدینی (PD)، ۲ تا غیروالدینی (NPD) و ۳۳ تا تتراتیپ (T) دیده شده است. با توجه به پیوسته بودن دو ژن مورد مطالعه، چندتا از PD‌ها و چندتا از T‌ها از کراسینگ اور مضاعف بدست آمدند؟
- (۱) ۲ و ۴      (۲) ۴ و ۸      (۳) ۲ و ۸      (۴) ۴ و ۲
- ۱۱ اگر ۴۹ درصد از افراد یک جمعیت، فنوتیپ مغلوب را نشان دهند، درصد فراوانی افراد هتروزیگوت کدام است؟
- (۱) ۲۱ (۲)      (۳) ۴۲ (۴)      (۵) ۴۹
- ۱۲ ژنوتیپ - A باعث پابلندی و ژنوتیپ aa باعث پاکوتاهی در یک گیاه می‌شود. اگر درصد نفوذ صفت پابلندی در حالت هتروزیگوت ۷۰٪ باشد، چند درصد نتاج حاصل از تلاقي زیر، پابلند خواهد بود؟
- AaBb $\times$ AaBb
- |   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| ۷۵ (۴)  | ۶۰ (۳)    | ۳۰ (۲)    | ۲۵ (۱)    |
| در انسان صفت زالی یک صفت مغلوب است. در یک خانواده با ۳ فرزند با پدر هتروزیگوت و مادر زال احتمال این‌که ۲ فرزند اول سالم و فرزند سوم زال باشد، کدام است؟ |           |           |           |
| ۰/۱۲۵ (۴)   | ۰/۱۴۱ (۳) | ۰/۳۷۵ (۲) | ۰/۴۲۲ (۱) |

- ۱۶ از تلاقي  $AB \times ab$  در قارچ نوروسپورا تعداد ۱۸۰ تتراد تجزيه شده و ۳۰ آسک تراتيپ (T) و ۵ آسک غيروالدیني (NP) حاصل شده است. فاصله دو ژن بهطور تقربي کدام است؟
- (۱) ۱۱      (۲) ۱۲      (۳) ۱۶      (۴) ۲۰
- ۱۷ در جامعه‌اي با تعادل هاردي - واينبرگ فراوانی ژن‌ها و ژنتيپ‌ها چه وضعیتی دارد؟
- (۱) از نسلی به نسل دیگر تغیير می‌کند.  
 (۲) از نسلی به نسل دیگر ثابت می‌ماند.  
 (۳) از نسلی به نسل دیگر فراوانی ژن افزایش و فراوانی ژنتيپ‌ها کاهش می‌يابد.  
 (۴) از نسلی به نسل دیگر فراوانی ژن‌ها متناسب با نوع گامتها و فراوانی ژنتيپ‌ها افزایش می‌يابد.
- ۱۸ کدام واقعه موجب تشکيل کروموزوم‌های دی‌سانتریك می‌شود؟
- (۱) جابه‌جايی متعادل  
 (۲) وارونگي پاراسانتریك  
 (۳) وارونگي پري‌سانتریك  
 (۴) کراسینگ اور نامتعادل
- ۱۹ کدام يك از اشكال DNA در موجودات زنده مشاهده می‌شود؟
- (۱) Z-DNA      (۲) A-DNA      (۳) B-DNA      (۴) DNA - سه رشته‌اي
- ۲۰ چنانچه فاصله  $A-B=10$ ،  $A-C=40$  و  $B-C=30$  سانتيمتر گان بوده و ضريب تطابق برابر با  $5/5^{\circ}$  باشد. درصد فراوانی هر يك از ژنتيپ‌های والدیني در آمييزش  $aBC / Abc \times abc / abc$  کدام است؟
- (۱) ۶۱/۵۰      (۲) ۳۰/۷۵      (۳) ۲۸/۵۰      (۴) ۸/۵۰
- ۲۱ کدام تركيب زير، دهنده نيتروژن شماره ۱ بازه‌اي پوريين می‌باشد؟
- (۱) گلايسين  
 (۲) گلوتامين  
 (۳) آسيپارتات  
 (۴)  $N^{10}$ -فرميل ترا هييدروفولات
- ۲۲ استيل کو آكربوکسيلاز گياهان و باكتري‌ها، توسط کدام مورد تنظيم می‌گردد؟
- (۱) سيترات      (۲) فسفوريلاسيون      (۳) د فسفوريلاسيون      (۴) افزایش غلظت  $Mg^{+2}$
- ۲۳ در رابطه با ويتامين C کدام مورد درست است؟
- (۱) ويتامين C محلول در چربی است.  
 (۲) افزایش ويتامين C باعث افزایش جذب آهن می‌گردد.  
 (۳) در خاک فاقد موليبيدن، ميزان ويتامين C گياه افزایش می‌يابد.  
 (۴) عدم ساخت ويتامين C، به دليل حضور آنزيم گلوكونواكسيداز است.
- ۲۴ در چرخه بتا اكسيداسيون کارايني واکنش چند درصد بوده و چه مولکول‌هایي تولید می‌گردد؟
- (۱)  $5ATP - 40$  -  $FADH_2 - 40$  و  $NADH_2 - 60$       (۲)  $5ATP - 40$  -  $NADH_2 - 45$  و  $FADH_2 - 60$
- ۲۵ کدام گروه از آنزيم‌ها جزو خانواده سرين پروتئاز هستند؟
- (۱) كموتربيسين - تريبيسين - الاستاز  
 (۲) كموتربيسين - لاكتات د هييدروژناز - الاستاز  
 (۳) تريبيسين - فسفو فروكتوكيناز - لاكتات د هييدروژناز  
 (۴) فسفو فروكتوكيناز - لايزوزايم - لاكتات د هييدروژناز
- ۲۶ در مسیرهای اكسيداسيون - احياء، عامل اصلی پيش برنده واکنش‌ها چيست و کدام قانون در بيوشيمي آن را توضيح مي‌دهد؟
- (۱) اختلاف مغناطيسي و قانون گيبس  
 (۲) اختلاف پتانسيل و قانون نرست  
 (۳) اختلاف سطح انرژي و قانون اول ترموديناميک
- ۲۷ کدام مورد درست است؟
- (۱)  $P_K$  برابر  $P_I$  است.  
 (۲) همیشه بزرگتر از  $P_I$  است.  
 (۳)  $P_K$  همان نقطه ميانی تغييرات  $P_H$  است.  
 (۴)  $P_K$  تعیین کننده برابري آنيون و بنیان است.
- ۲۸ کدام اسييد آمينه، باعث خمس در زنجирه پلي‌پپتيد می‌شود؟
- (۱) لوسين  
 (۲) تريپتوفان  
 (۳) پرولين  
 (۴) ايزولوسين
- ۲۹ تعداد ايزومرهای فضائي قند گلوکز کدام است؟
- (۱) ۲  
 (۲) ۴  
 (۳) ۸  
 (۴) ۱۶

-۳۰	P <sub>I</sub> اسید آمینه گلوتامیک، کدام است؟	
(۱) ۳/۲۲	۵/۲۲ (۲)	
-۳۱	کدام اسید آمینه میل ترکیبی با نیکل دارد؟	
(۱) سرین (۲) پرولین (۳) هیستیدین (۴) آسپارژین		
-۳۲	در بخش هیدروکربنی دیواره سلول باکتری‌ها، کدام ترکیب دیده می‌شود؟	
(۱) N استیل مورامیک اسید (۲) N استیل گلوکز آمین (۳) N استیل مورامیک اسید (۴) N استیل گلوکورونیک اسید		
(۱) N استیل مورامیک اسید (۲) D گلوکورونیک اسید (۳) N استیل مورامیک اسید (۴) D گلوکورونیک اسید		
-۳۳	عضو متحرک در زنجیره تنفسی کدام است؟	
(۱) سیتوکروم B (۲) سیتوکروم C (۳) کو آنژیم Q (۴) کو آنژیم فلاوینی		
-۳۴	کدام آنتی‌بیوتیک ساختار پیتیدی دارد؟	
(۱) آمپی‌سیلین (۲) کانامایسین (۳) تتراسایکلین (۴) پنی‌سیلین		
-۳۵	در مورد گلیکولیز بی‌هوازی و هوازی، به ترتیب چه ترکیبات انرژی‌زاوی تولید می‌شوند؟	
(۱) ۲ATP - ۲NADH <sub>۲</sub> (۲) ۲ATP - ۲NADPH <sub>۲</sub> (۳) ۲ATP - ۲ATP و ۲NADH <sub>۲</sub> (۴) ۲ATP - ۲ATP و ۲NADPH <sub>۲</sub>		
-۳۶	برای مطالعه اثر متقابل پروتئین - پروتئین چه دترجنتی استفاده می‌شود؟	
(۱) یونی (۲) غیریونی (۳) آمفوتر (۴) از دترجنت استفاده نمی‌شود.		
-۳۷	از سوختن کامل اسید چرب اشیاع ۱۸ کربنه چه تعداد مولکول ATP تولید می‌شود؟	
(۱) ۱۲۶ (۲) ۱۱۴ (۳) ۱۱۲ (۴) ۱۰۷		
-۳۸	واکنش زیر مربوط به فعالیت کدام مهار کننده‌ها است؟	
E + S ⇌ ES → E + P		
+ +		(۱) رقابتی
I I		(۲) غیررقابتی
		(۳) غیرقابل رقابت
EI + S ⇌ ESI		(۴) برگشت‌ناپذیر
-۳۹	چرخش حول پیوندهای منفرد کربن آلفا در زنجیره پروتئینی، منجر به تشکیل ساختمان نوع چندم می‌شود؟	
(۱) چهارم (۲) سوم (۳) دوم (۴) اول		
-۴۰	باندهای دی‌سولفیدی عمدتاً موجب پایداری ساختار کدام پروتئین‌ها می‌گردد؟	
(۱) موجود در ماتریکس خارج سلولی (۲) داخل سلولی (۳) دیمر		
-۴۱	کدام پروتئین در فرآیند نوترکیبی هومولوگ در باکتری‌ها نقش اصلی را بر عهده دارد؟	
RecA (۴) UVrA (۳) LexA (۲) CRP (۱)		
-۴۲	سیستم <b>Quroum sensing</b> در کدام فرایند زیستی، در میکروارگانیسم‌ها نقش ندارد؟	
(۱) نورزایی باکتریایی (۲) ترانسفورماسیون طبیعی (۳) مقاومت به آنتی‌بیوتیک		
-۴۳	هم‌یوغی (conjugation) بین کدام یک از سویه‌های <i>E. coli</i> منجر به انتقال ژن‌های کروموزومی می‌شود؟	
Hfr × Hfr (۴) F <sup>+</sup> × F <sup>-</sup> (۳) F <sup>+</sup> × F <sup>+</sup> (۲) Hfr × F <sup>-</sup> (۱)		

- ۴۴ در مورد نسخه برداری در باکتری‌ها کدام مورد درست است؟
- (۱) توالی ۳۵ - در پرموتورها نقش اصلی را در نسخه برداری ایفا می‌کند.
  - (۲) توالی ۱۰ - در پرموتورها به عنوان ناحیه تشخیصی بوده و همیشه TATAAT می‌باشد.
  - (۳) نقطه شروع نسخه برداری در باکتری‌ها در اغلب موارد یک پورین و عموماً باز مرکزی در ترا福德 CAT می‌باشد.
  - (۴) فاکتور سیگما در ابتدا پرموتور را تشخیص داده و پس از اتصال به آن سبب هدایت Core بر روی آن ناحیه می‌شود.
- ۴۵ در یک چشم‌آب گرم میکروارگانیسم‌هایی یافت شده که مقاوم به پنی‌سیلین هستند. با کدام روش می‌توان مؤثرترین ژن مقاوم به این آنتی‌بیوتیک را شناسایی کرد؟
- |               |             |                 |                 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Proteomic (۴) | Genomic (۳) | Metagenomic (۲) | Metabolomic (۱) |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
- ۴۶ در اپرون Trp، کدام مورد نتیجه جهش در جایگاه اتصال به DNA رپرسور است؟
- |                        |                         |                          |                       |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| ۱) کاهش بیان اپرون Trp | ۲) بیان مداوم اپرون Trp | ۳) بیان القایی اپرون Trp | ۴) عدم بیان اپرون Trp |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
- ۴۷ کدام مورد از عناصر Trans-acting است؟
- |                                       |                      |                                |                  |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|
| ۱) عناصر تنظیمی مانند افزایش دهنده‌ها | ۲) توالی‌های پرموتری | ۴) عناصر رونویسی از روی ژن DNA | ۳) نواحی بین ژنی |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|
- ۴۸ مهم‌ترین ویژگی یوکاریوت‌های هاپلوئید جهت مطالعات ژنتیکی کدام است؟
- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| ۱) دیده نشدن مرحله میوز در اکثر موجودات هاپلوئید | ۲) تشخیص سریع و دقیق رابطه غالب و مغلوبی بین آللهای ژنی | ۳) ارتباط مستقیم ژنتیک با فنوتیپ قابل مشاهده | ۴) بالا بودن میزان و شدت نوترکیبی در هاپلوئیدها |
|--|---|--|---|
- ۴۹ کدام توالی، محل شناسایی دقیق و اتصال ریبوزوم در ابتدای ژن‌های یوکاریوتی است؟
- |                       |                    |              |                    |
|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| ۱) ناحیه پرموتری TATA | ۲) جعبه DNA pol II | ۳) DNA pol I | ۴) اندونوکلئاز III |
|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------|
- ۵۰ نقش flap endonuclease در یوکاریوت‌ها معادل نقش کدام یک در پروکاریوت‌هاست؟
- |                 |             |               |                |
|-----------------|-------------|---------------|----------------|
| ۱) توپوایزومراز | ۲) دالگارنو | ۳) توالی شاین | ۴) توالی کوزاک |
|-----------------|-------------|---------------|----------------|
- ۵۱ نقش mi RNA ها در تنظیم بیان ژن‌های یوکاریوتی چگونه است؟
- |                              |                             |                               |                                   |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ۱) موجب ختم رونویسی می‌گردد. | ۲) باعث مهار ترجمه می‌شوند. | ۳) موجب شروع رونویسی می‌شوند. | ۴) موجب ختم سنتز پروتئین می‌گردد. |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
- ۵۲ مهم‌ترین فاکتورهای تمایز سلول‌های جنینی و ایجاد گونه‌های زیستی به ترتیب کدام است؟
- |                    |              |                    |
|--------------------|--------------|--------------------|
| ۱) جهش - تنظیم ژنی | ۲) جهش - جهش | ۳) تنظیم ژنی - جهش |
|--------------------|--------------|--------------------|
- ۵۳ در یک آمیزش تری هیبرید (AaBbCc) چه نسبتی از زاده‌ها یک صفت غالب و دو صفت مغلوب را بروز می‌دهند؟

$$\begin{array}{r}
 54 \\
 \hline
 64
 \end{array} (1)$$

$$\begin{array}{r}
 9 \\
 \hline
 16
 \end{array} (2)$$

$$\begin{array}{r}
 27 \\
 \hline
 64
 \end{array} (3)$$

$$\begin{array}{r}
 9 \\
 \hline
 64
 \end{array} (4)$$

-۵۴- در شکل زیر، محتمل‌ترین پیامد جهش در محل مشخص شده با پیکان در کدام مورد به صورت درست آمده است؟



- (۱) پاسخ تغییر یافته نسبت به عوامل تنظیمی
- (۲) یوبیکیتیون دار شدن و به دنبال آن تجزیه شدن
- (۳) بدون اثر، چرا که این محل از RNA عملکرد خاصی ندارد.
- (۴) تغییر یک آمینواسید در پروتئین مربوطه

-۵۵- با فرض این که در غشاء کلروپلاستی گیاهان، نسبت وزن لیپیدها به پروتئین‌ها به ترتیب ۱ به ۱ باشد، کدام مورد صحیح‌تر است؟

- (۱) به ازای هر مولکول پروتئین، تقریباً ۵۰۰ مولکول چربی وجود دارد.
- (۲) به ازای هر مولکول پروتئین، تقریباً ۵۰۰ مولکول چربی و قند وجود دارد.
- (۳) به ازای هر مولکول چربی، تقریباً ۵۰۰ مولکول پروتئین وجود دارد.
- (۴) به ازای هر مولکول چربی، تقریباً ۵۰۰ مولکول قند و پروتئین وجود دارد.

-۵۶- تشکیل ساختار **Polyubiquitination** با کدام پیوند، سبب تنظیم فرایند تقسیم سلول می‌شود؟




-۵۷- در ساختار **u-turn**، پیوند هیدروژنی بین کدام کربن ستون اصلی زنجیره پلی‌پیتیدی تشکیل می‌شود؟

- (۱) ۱ و ۳
- (۲) ۱ و ۴
- (۳) ۲ و ۳
- (۴) ۲ و ۴

-۵۸- بزرگترین حوزه پروتئینی (**domain**) در پروتئین‌هایی که از غشاء سلولی می‌گذرند، کدام مورد است؟

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Structural domain (۲)  | Functional domain (۱) |
| Topological domain (۴) | Structural motif (۳)  |

-۵۹- در فرایند تاخورده‌گی پروتئین‌ها، کدام چاپرون مولکولی ساختار دایمر تشکیل می‌دهد؟



-۶۰- کدام پیش‌نیاز اولیگوساکاریدی در فرایند تاخوردن (**folding**) گلیکوپروتئین‌های شبکه آندوپلاسمی دخالت دارد؟




-۶۱- بخشی از ماده وراثتی **DNA** که درون هستک قرار می‌گیرد، چه نام دارد؟

- |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| tDNA (۴) | tRNA (۳) | rDNA (۲) | rRNA (۱) |
|----------|----------|----------|----------|

-۶۲- نام دیگر لیزوژوم ثانویه کدام است؟

- (۱) اگزوسیتوز
- (۲) واکوئل تجزیه‌ای

-۶۳- مولکول پیش‌ساز سلولز چیست؟



-۶۴- ارگانل **Glyoxysome** در چه تبدیلی دخالت دارد؟

- (۱) اسیدهای آمینه به پروتئین

- (۳) اسیدهای چرب به لیپیدها

-۶۵- وظیفه **DNA** گلیکولاز در تعمیر **DNA** چیست؟

- (۱) اضافه نمودن نوکلئوتید صحیح

- (۳) برداشتن باند فسفو دی‌استر

-۶۶- کدام مورد، نسبت **DNA** - پروتئین را در کروماتین سلول‌های یوکاریوتی نمایش می‌دهد؟

- (۱) ۱ به ۱
- (۲) ۳ به ۱
- (۳) ۴ به ۱
- (۴) ۲ به ۱

- ۶۷ کدام مورد، در خصوص دیپلوزوم صحیح است؟
- (۱) دیپلوزوم همان سنتروزوم است.
  - (۲) از گسترش سنتروزوم، دیپلوزوم حاصل می‌شود.
  - (۳) هر سنتروزوم شامل دو دیپلوزوم است.
  - (۴) هر دیپلوزوم شامل دو سانتریول است.
- ۶۸ در روش انتخاب باکتری‌های تاریخت با مکانیسم آزمون سفید - آبی، دلیل استفاده از ماده **IPTG** و **Xgal** به ترتیب کدام است؟
- (۱) القاء‌کننده و سوبسترای **LacZ**
  - (۲) سوبسترای **LacZ** و القاء‌کننده
  - (۳) تشدید‌کننده و خاموش کننده **LacZ**
  - (۴) عامل رشد باکتری و تشدید کننده
- ۶۹ در کدام اوپرون، پروتئین تنظیم کننده، هم نقش بازدارنده (**Repressor**) و هم نقش فعال کننده (**Activator**) می‌تواند داشته باشد؟
- (۱) لاکتوز
  - (۲) فنیل آلانین
  - (۳) آرابینوز
  - (۴) تریپتوفان
- ۷۰ با کدام روش، می‌توان نواحی بالادرست و پایین دست ژنی که حداقل توالی قطعه‌ای از آن مشخص است را، جداسازی کرد؟
- (۱) Gradient PCR
  - (۲) Inverse PCR
  - (۳) Real-time PCR
  - (۴) Touchdown PCR
- ۷۱ با کدام روش، می‌توان تعیین کرد که گیاهان تاریخته تولید شده طی یک فرآیند انتقال ژن از یک سلول تاریخته حاصل شده‌اند یا از سلول‌های تاریخته مختلفی به دست آمده‌اند؟
- (۱) Touchdown PCR
  - (۲) Real-time PCR
  - (۳) Southern blotting
  - (۴) Northern blotting
- ۷۲ با کدام ناقل، می‌توان قطعات بزرگتری از **DNA** را همسانه‌سازی کرد؟
- (۱) Cosmid
  - (۲) Plasmid
  - (۳) BAC'
  - (۴) YAC
- ۷۳ کدام روش در فرآیند خاموشی ژن، کارآمدترین است؟
- (۱) Cosuppression
  - (۲) RNAi
  - (۳) Mutation Method
  - (۴) Antisense RNA
- ۷۴ کدام کتابخانه برای تولید پروتئین مناسب‌تر است؟
- (۱) ژنی
  - (۲) ژنومی
  - (۳) پیانی
  - (۴) cDNA
- ۷۵ کدام روش در خصوص توالی یابی مولکول **DNA** به روش پایاندهی زنجیره، مناسب است؟
- (۱) اتوماتیک
  - (۲) سانگر - کلسوم
  - (۳) میکرو چیپ
  - (۴) ماکسام - گیلبرت
- ۷۶ مناسب‌ترین روش برای جلوگیری از آلودگی‌های **DNA** در فرآیند **RT-PCR** کدام است؟
- (۱) طراحی آغازگر از نواحی exon
  - (۲) طراحی آغازگر از نواحی Intron
  - (۳) تیمار با DNase قبل از انجام واکنش
  - (۴) طراحی آغازگرهای از محل اتصال exon- Intron
- ۷۷ اگر هدف تکثیر نسخه‌های تک رشتهدی از یک توالی **DNA** باشد، کدام روش PCR، مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- (۱) Asymmetric
  - (۲) Real time
  - (۳) Inverse
  - (۴) Rt
- ۷۸ یک کتابخانه ژنومی **BAC 4X** گندم در مقایسه با یک کتابخانه **BAC 4X** جو، کدام است؟
- (۱) کلون‌های کمتری دارد.
  - (۲) کلون‌های بیشتری دارد.
  - (۳) تعداد کلون‌ها مساوی‌اند.
  - (۴) قابل مقایسه نیست.
- ۷۹ روش **TILLING** کدام است؟
- (۱) ژنتیک مستقیم
  - (۲) ژنتیک معکوس
  - (۳) ژنتیک انتقالی
  - (۴) ژنتیک مستقیم و یا معکوس
- ۸۰ در آزمایش‌های **Real time PCR** کدام رابطه میان **CT** و نسخه‌برداری صادق است؟
- (۱) **CT** کمتر، مقدار نسخه اولیه بیشتر
  - (۲) **CT** بیشتر، مقدار نسخه تولیدی بیشتر
  - (۳) در **CT** کمتر از  $3^{\circ}$ ، هیچ نسخه‌ای تولید نشده است.
  - (۴) در **CT** بیشتر از  $3^{\circ}$ ، هیچ نسخه‌ای تولید نشده است.

