

286

F

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :



صبح جمعه
۹۲/۱۲/۱۶
دفترچه شماره (۱)



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

**آزمون ورودی
دوره‌های دکتری (نیمه مرکز) داخل
سال ۱۳۹۳**

**مجموعه علوم دامی (کد ۲۴۲۴)
– فیزیولوژی دام –**

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (بیوشیمی، آمار و طرح‌های آزمایشی، فیزیولوژی دام)	۸۰	۱	۸۰

استندهای سال ۱۳۹۲

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) بس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقوقی و حقوقی نهایا با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برای مقررات رفتار می‌شود.

-۱

اگر در پیتیدی PK های گروه آمینی برابر با 10° و 13° و PK های گروه کربوکسیلی برابر با 4° و 2° باشد، PH_1 آن چند خواهد بود؟

۶


۳ (۱)

۱۱/۵ (۴)

۷/۵ (۳)

-۲

با توجه به منحنی لینیور-برک ذیل ثابت میکائیلیس (Km) برای خط A چند mM است؟



۰/۱ (۱)

۰/۵ (۲)

۱ (۳)

۲ (۴)

-۳

یون منیزیم برای فعالیت کدامیک از آنزیمهای زیر ضروری است؟

(۱) انولاز

(۲) کاتالاز

(۳) کربوکسی پیتیداز A

کدامیک کوفاکتور آنزیم گلوتامیک دکربوکسیلاز است؟

(۱) بیوتین

(۲) تراهیدروفولیک اسید

(۳) تیامین پیروفسفات

کدام مورد از خصوصیات مشترک هموگلوبین و میوگلوبین نیست؟

(۱) هر دو دارای ساختمان نوع چهارم هستند.

(۲) در ساختمان هر دو آلفاھلیکس وجود دارد.

(۳) هر دو دارای مجموعه‌ای از دورهای وارونه هستند.

(۴) هر زنجیره گلوبین دارای یک مولکول «هم» می‌باشد.

-۴

کمبود بیوتین ممکن است سبب کاهش کدامیک از فرآیندهای سوخت و ساز ذیل شود؟

(۱) ساخت گلیکوزن

(۲) ساخت کلسترول

(۳) ساخت اسید چرب

(۴) اکسیداسیون اسید چرب

لیستین، یک می‌باشد.

(۱) نوکلئوتید

(۲) فسفولیپید

(۳) هتروساکارید

(۴) دی‌پیتید

-۵

غشاء میتوکندری برای کدامیک از موارد زیر نفوذپذیر است؟

(۱) ملات

(۲) NADH, H^+

(۳) اگزالوآستات

(۴) پالمیتیل COA

-۶

از سوختن هر مولکول پیروات در چرخه کربس چند مولکول ATP در زنجیر تنفسی تولید می‌شود؟

۱۴ (۲)

۱۲ (۱)

۳۸ (۴)

۱۵ (۳)

- ۱۰ آنزیم گلوكو کیناز متعلق به کدام رده از آنزیم‌ها می‌باشد؟
 ۱) لیازها
 ۲) لیگازها
 ۳) هیدرولازها
 ۴) ترانسферازها
- ۱۱ تعداد چربه β -اکسیداسیون و ATP تولیدی در اثر اکسیداسیون کامل یک اسید چرب ۱۶ کربنی اشباع به ترتیب چقدر است؟
 ۱) ۱۲۹ و ۷
 ۲) ۱۳۰ و ۸
 ۳) ۱۲۹ و ۸
 ۴) ۱۳۰ و ۸
- ۱۲ کدام یک از آنزیم‌های زیر قادر است در مسیر گلیکولیز واکنش مربوطه را بطور دو طرفه کاتالیز نماید؟
 ۱) هگروکیناز
 ۲) پپروات کیناز
 ۳) فسفوفروکتوکیناز
 ۴) فسفوگلیسرات کیناز
- ۱۳ نام اسید چربی با مشخصات $25\Delta^{4,8,11,14}$ کدام است؟
 ۱) اسید لینولئیک
 ۲) اسید آراشیدونیک
 ۳) اسید آراشیدیک
 ۴) اسید لینولنیک
- ۱۴ تأثیر ۵ درجه حرارت روی جوانه‌زنی گیاهی در قالب طرح مربع لاتین مطالعه و اعداد جدولی زیر حاصل شده است. SS_R چقدر است؟
 ۱) ۱/۸
 ۲) ۶/۴۸
 ۳) ۱۵۰
 ۴) ۱۶۲
- | | | | | | |
|---------|---|---|----|----|----|
| تیمار | ۰ | ۵ | ۱۰ | ۱۵ | ۲۰ |
| میانگین | ۱ | ۳ | ۵ | ۷ | ۸ |
- ۱۵ اگر $S_{\bar{d}}$ در یک طرح مربع لاتین 5×5 برابر $\sqrt{2}$ باشد، SS_R برابر است با:
 ۱) ۱۰۰
 ۲) ۱۲۰
 ۳) ۱۶۰
- ۱۶ در مقایسه گروهی تیمارها چون به طور متعارف بیش از ۲ گروه از تیمارها با یکدیگر مقایسه می‌شوند از شاخص آماری برای پی بردن به وجود یا عدم وجود تفاوت معنی‌دار بین میانگین گروه‌ها استفاده می‌شود.
- (۱) R
 (۲) t
 (۳) F
 (۴) Z
- ۱۷ اثر یک صفت در یک آزمایش فاکتوریل 3×2 به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی ۴ تکراره مورد بررسی قرار گرفته است. اگر از هر واحد آزمایشی ۳ نمونه مورد مطالعه قرار گرفته باشد، درجه آزادی خطای آزمایشی و خطای نمونه‌برداری از چه به راست کدام‌اند؟
 ۱) ۱۵ و ۴۸
 ۲) ۷۱ و ۲۴
 ۳) ۴۸ و ۲۴

- ۱۸ اگر در یک آزمایش فاکتوریل 3^4 که به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا شده، در ۲ تکرار آن برای فاکتور اول و در ۲ تکرار آن برای اثر متقابل رده دوم عمل اختلطان شده باشد، درجه آزادی بلوک و خطای آزمایش از راست به چه کدام‌اند؟
- (۱) ۲ و ۲۱
(۲) ۳ و ۲۱
(۳) ۳ و ۱۷
- ۱۹ در یک طرح کامل تصادفی کدام یک از معادله‌های زیر برابر با مجموع مربعات تیمار می‌باشد؟
- $$\sum_i \sum_j (\bar{X}_{ij} - \bar{X}_{..})^2 \quad (۱)$$
- $$\sum_i \sum_j (X_{ij} - \bar{X}_{..})^2 \quad (۲)$$
- $$\sum_i \sum_j (X_{ij} - \bar{X}_{..})^2 \quad (۳)$$
- $$\sum_i \sum_j (X_{ij} - \bar{X}_{ij})^2 \quad (۴)$$
- ۲۰ یک طرح کرت‌های خرد شده با ۴ تاریخ کاشت (اصلی) و ۳ رقم با طرح بلوک‌های کامل تصادفی $5^2 = 25$ اجرا شده است. درجه آزادی اشتباه اصلی و فرعی از راست به چه چقدر است؟
- (۱) ۶ و ۴۰
(۲) ۱۲ و ۴۰
(۳) ۳۲ و ۴۰
- ۲۱ مفهوم ضریب همبستگی -۱ - آن است که بین ۲ متغیر همبستگی
 (۱) کامل و مستقیم وجود دارد.
 (۲) کامل و معکوس وجود دارد.
 (۳) تا اندازه‌ای وجود ندارد.
 (۴) وجود ندارد.
- ۲۲ اگر فراوانی تجمعی عدد $18/7$ برابر باشد، توجیه بیشتر این است که بگوییم درصد از اعداد
 (۱) بیشتر از ۱۸ هستند.
 (۲) مساوی ۱۸ هستند.
 (۳) کمتر از ۱۸ هستند.
 (۴) از حداقل ارزش ۱۸ برخورداراند.
- ۲۳ کدام گزینه برای مقایسه خطای آزمایش‌های مختلف مناسب‌تر است؟
 (۱) واریانس کل
 (۲) مجموع مربعات خطای آزمایشی
 (۳) واریانس خطای آزمایشی
 (۴) C.V. (ضریب تغییرات) آزمایش
- ۲۴ در چه موقعی $F = t^2$ است؟
 (۱) وقتی تعداد تیمار ۲ باشد.
 (۲) وقتی تعداد تیمار 2^2 باشد.
 (۳) وقتی تعداد تیمار ضربی از ۲ باشد. (۴) همیشه
- ۲۵ چه زمانی توزیع t به توزیع Z نزدیک‌تر است؟
 (۱) واریانس بیشتر باشد.
 (۲) درجه آزادی کمتر از 30 باشد.
 (۳) درجه آزادی از 30 بیشتر باشد. (۴) توزیع t همانند توزیع Z باشد.
- ۲۶ درصد روغن یک رقم کلزا برابر 40 درصد گزارش شده است. در آزمایشی روی این رقم با ۱۶ کرت یکسان، میانگین میزان روغن برابر 36 و واریانس برابر 25 برآورد شده است. اگر عدد جدول برابر 3 باشد، کدام گزینه درست است؟
 (۱) $t = -3/2$ و فرض صفر رد می‌شود.
 (۲) $Z = -3/2$ و فرض صفر رد می‌شود.
 (۳) $Z = -3/2$ و میزان خطای نوع I کمتر از حد قابل قبول است.
 (۴) $t = -3/2$ و میزان خطای نوع I بیشتر از حد قابل قبول است.

- ۲۷ سلولهای ویژه در Juxtaglomerular apparatus عبارتند از:
- (۱) Macula densa در اطراف DCT و سلولهای Macula densa در اطراف Juxtaglomerular
 - (۲) Macula densa در DCT و سلولهای Macula densa در اطراف آرتريول آوران
 - (۳) Granular cells در اطراف آرتريول آوران و Macula densa در اطراف Juxtaglomerular
 - (۴) Macula densa در اطراف DCT و Macula densa در دیواره آرتريول آوران و واپران در خصوص افزایش غلظت هورمون‌های غده تیروئید کدام مورد نادرست است؟
- ۲۸
- (۱) بروون ده قلب را کاهش می‌دهد.
 - (۲) تعداد میتوکندری‌ها در سلول‌ها را افزایش می‌دهد.
 - (۳) تعداد و تمایل گیرنده کاتکولامین‌ها را افزایش می‌دهد.
- ۲۹
- (۴) فعالیت $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATP}_{ase}$ در غشاء سلول‌ها را افزایش می‌دهد. سطح درونی بطن‌های مغز را سلول‌های می‌پوشانند.
- ۳۰
- (۱) آستروسايت (۲) اولیکودندروسایت (۳) اپندیمال سلول بنیادی از نوع totipotent از نوع Pleuripotent است.
 - (۲) بلاستومر - اسپرماتوگونیم
- ۳۱
- (۱) Zygote - بلاستومر
 - (۲) Myeloid- Zygote
 - (۳) Myeloid- Lymphoid گزینه صحیح در خصوص میانجی عصبی استیل کولین کدام است؟
- ۳۲
- (۱) داروی کورار (Curar) گیرنده‌های ماس کارنیک را مسدود می‌کند.
 - (۲) در هر دو سیستم ANS,SNS هم بصورت تحریکی و هم بصورت ممانعت کننده عمل می‌کنند.
 - (۳) در سیستم عصبی سوماتیک (SNS) اتصال استیل کولین به گیرنده‌های نیکوتینیک، تحریکی و اتصال آن به گیرنده‌های ماسکارنیک، ممانعت کننده است.
 - (۴) در سیستم عصبی سوماتیک (SNS) همیشه تحریکی ولی در سیستم عصبی خودمختر ANS هم تحریکی و هم ممانعت کننده است.
- ۳۳
- (۱) در CNS مایع مغزی - نخاعی بوسیله ترشح و مواد بیگانه بوسیله فاگوستیوز می‌شود.
 - (۲) Ependymal- Microglia
 - (۳) Oligodendrocytes-Astrocytes
- ۳۴
- (۱) قلب
 - (۲) پیاز مو
 - (۳) چشم (iris)
- ۳۵
- (۱) بافت ریه تمایل به خواهیدن روی هم را دارد که درصد آن به دلیل وجود مایع در سطح آلوئول‌ها است.
 - (۲) کوندرسايت‌ها، سلول‌های هستند که توان تقسیم شدن دارند.
- ۳۶
- (۱) غضروفی - دارند
 - (۲) تمایز یافته استخوانی - دارند
 - (۳) کدامیک از خصوصیات هورمون‌های استرونژیدی نیست؟
- ۳۷
- (۱) نیمه عمر طولانی‌تری دارند.
 - (۲) آنزیم‌هایی که آنها را از کلسترول تولید می‌کنند در میتوکندری و شبکه اندوپلاسمی قرار دارند.
 - (۳) در سلولهایی که تولید می‌شود ذخیره نشده بلکه بلافاصله بعد از تولید به داخل خون آزاد می‌شود.
 - (۴) از غشای سلول عبور کرده به گیرنده خود در سیتوپلاسم متصل و باعث فعل شدن آنزیم‌ها در سیتوپلاسم می‌شود. از تراوش‌های سلول‌های سرتولی برای باروی اسپرم ضروری است.
- ۳۸
- (۱) ترانسفرین
 - (۲) گلایکو پروتئین سولفاته - ۲
 - (۳) گلایکو پروتئین سولفاته - ۱
- ۳۹
- (۱) فعال شدن کلارنزا
 - (۲) تبدیل پلاسمینوژن به پلاسمین
 - (۳) هماهنگی رفتارهای جنسی در ناحیه‌ای از مغز به نام انجام می‌شود.

-۴۰

کدام گزینه نادرست است؟

- ۱) در خوک آبستن، با افزایش تعداد جنین‌ها غلظت پلاسمایی لاکتوژن جفتی نیز افزایش می‌یابد.
- ۲) ترشح لاکتوژن جفتی در بزهای دولو آبستن بیشتر از تک قلو آبستن است.
- ۳) رشد و توسعه بافت‌های پستانی در میش‌ها و بزهای دولو آبستن بیشتر از تک قلو آبستن است.
- ۴) به دلیل مصرف بالای گلوكز توسط رحم، میش‌های دولو آبستن در صورت تغذیه نامناسب احتمال رخ دادن مسمومیت آبستنی زیاد است.

-۴۱

ساخت اسید چرب در ابتدا در داخل تا تشکیل اسید پالمیتیک انجام گرفته و سپس برای طویل شدن و غیر اشبع شدن داخل می‌شود.

-۴۲

- ۱) میتوکندری - سیتوپلاسم
 - ۲) سیتوپلاسم - میتوکندری
 - ۳) سیتوپلاسم - شبکه آندوپلاسمیک
 - ۴) میتوکندری - شبکه آندوپلاسمیک
- کدام ترکیب از چرخه اوره وارد مسیر تری کربوکسیلیک می‌شود؟

-۴۳

در حیوانات نشخوار کننده منبع اصلی گلوكونوژن می‌باشد که در شرایط گرسنگی نقش آن به صفر رسیده و بیشترین اهمیت را خواهد داشت.

-۴۴

- ۱) پروپیونات - لاکتان
 - ۲) پروپیونات - گلیسرول
 - ۳) لاکتان - اسید آمینه
 - ۴) لاکتان - گلیسرول
- آنزیم مورد نیاز در واکنش زیر کدام است؟



-۴۵

- ۱) پیرووات کربوکسیلاز
 - ۲) پیرووات دهیدروژناز
 - ۳) پیرووات کربوکسی کیناز
 - ۴) اگزالوستات دهیدروژناز
- نحوه تبدیل لاکتان به گلوكز چگونه است؟

-۴۶

- ۱) لاکتان ← فسفوanol پیرووات ← گلوكز
 - ۲) لاکتان ← پیرووات ← اگزالوستات ← گلوكز
 - ۳) لاکتان ← پیرووات ← فسفوanol پیرووات ← گلوكز
- کدام یک از حالات زیر بیانگر ردیف‌های دو سر خوانا "Palindrome" در دو زنجیره DNA می‌باشد؟

-۴۷

- ۱) ۵'...GAATTAGA...3'
- ۲) ۳'...CTTAAT...5'

-۴۸

- ۱) ۵'...TCCAGA...3'
- ۲) ۳'...AGGTCT...5'
- ۳) ۵'...GAATTC...3'
- ۴) ۳'...CTTAAG...5'

-۴۹

- کدام اسید آمینه در بافت‌های پستانداران به میزان قابل توجهی متحمل دامیناسیون اکسیداتیو می‌شود؟
- ۱) آسپارتات
 - ۲) گلوتامین
 - ۳) آسپارژین
 - ۴) گلوتامات

-۵۰

- کدام یک از ترکیبات قندی زیر در غضروف یافت می‌شود؟
- ۱) D - گالاكتوزآمین
 - ۲) D - گلوكز آمین
 - ۳) D - مانیتول
 - ۴) L - رامنوز

-۵۱

نقشه ذوب کدام مولکول DNA دو رشته‌ای زیر بیشتر است؟

-۵۲

- ۱) دارای بیست درصد گوانین
- ۲) دارای سی درصد تیمین
- ۳) دارای سی درصد سیتوزین
- ۴) دارای چهل درصد آدنین

-۵۳

- کدام یک از رمزهای زیر خاتمه دهنده پروتئین سازی در ریبوزوم است؟

-۵۴

- ۱) UGC (۴)
- ۲) UGU (۳)
- ۳) UAA (۲)
- ۴) AUU (۱)

-۵۵

بیشترین تعداد جفت باز در هر دور از مارپیچ DNA مربوط به کدام نوع DNA است؟

-۵۶

- ۱) A (۱)
- ۲) B (۲)
- ۳) C (۳)
- ۴) Z (۴)

-۵۷

۲ و ۳ بیس فسفوگلیسرات چه نقشی در ساختمان هموگلوبین دارد؟

-۵۸

- ۱) زنجیره بتا یک و بتا دو را به هم وصل می‌کند.
- ۲) زنجیره آلفا یک و آلفا دو را به هم وصل می‌کند.
- ۳) زنجیره آلفا دو و بتا یک را به هم وصل می‌کند.
- ۴) زنجیره آلفا دو و بتا دو را به هم وصل می‌کند.

-۵۹

جمله زیر مربوط به کدام نوع از ممانعت کننده‌های آنزیمی است؟

-۶۰

«ممانعت کننده هم به سوبسترای تنها متصل می‌شود و هم به مجموعه کمپلکس سوبسترا + آنزیم، اما میل ممانعت کننده برای این حالات متفاوت است.»

-۶۱

- ۱) رقابتی
- ۲) نارقابتی
- ۳) غیر رقابتی
- ۴) مخلوط

-۵۴ در آزمایشی برای مقایسه ۳ رقمی در ۵ تکرار، چنانچه

$$\sum_{i=1}^3 (\bar{X}_{i..} - \bar{X}_{..})^2 = ۳۴$$

و مقدار آن چقدر است؟

(۱) تیمار، ۸۵

(۲) خطأ، ۱۴/۱

۸۵

۳۴

-۵۵ کدام مورد از مزایای طرح های مربع لاتین چندگانه محسوب نمی شود؟

(۱) امکان مقایسه تیمارها در چند محل یا ناحیه

(۲) افزایش دقیق آزمایش از طریق افزایش تکرار تیمارها

(۳) افزایش درجه آزادی خطأ و قیمت تیمار کم است.

(۴) امکان پیاده کردن طرح مربع لاتین وقتی تیمارها کمی باشند.

-۵۶ جدول زیر عملکرد دو رقم A و B در آزمایش برای مقایسه ۵ سطوح کودی

(۱) امکان نشان می دهد، درجه آزادی کل و تیمار از راست به چپ کدام

است؟

۴	۳	۲	۱	۰	سطح کود
۴	۷	۸	۶	۵	A رقم
۴	۹	۶	۷	۴	B رقم

(۱) ۹ و ۱

(۲) ۹ و ۲

(۳) ۹ و ۴

(۴) ۱۰ و ۴

-۵۷ چنانچه یک طرح مربع لاتین ۵ تیماری در ۲ سال زراعی و ۳ منطقه تکرار شده

باشد، در تجزیه مرکب ۶ آزمایشی درجات آزادی اشتباه ۱ و اشتباه ۲ به ترتیب از

چپ به راست کدام است؟

(۱) ۷۲ و ۲۶

۲۶ و ۷۲

(۲) به اطلاعات بیشتری نیاز است.

۴۸ و ۷۲

-۵۸ در یک طرح مربع لاتین تکرار دار با ۴ تیمار و در ۲ مربع مقدار میانگین مربعات

خطای آزمایشی $\frac{1}{5}$ می باشد. مقدار \bar{S}_X مساوی جذر کدام کسر است؟

$$\frac{۳۳}{۴} (۲)$$

(۱) $\frac{۱۶/۵}{۴}$

$$\frac{۳۳}{۸} (۴)$$

(۳) $\frac{۱۶/۵}{۸}$

-۵۹ کدام کمیت میزان وابستگی دو متغیر را بررسی نمی کند؟

(۱) کواریانس

۲ واریانس

(۲) ضریب رگرسیون

۳ ضریب همبستگی

-۶۰ به چند طریق می توان یک کمیته از میان ۶ زن و ۳ مرد گزینش نمود به طوری که

در هر کمیته ۳ زن و ۲ مرد عضویت داشته باشند؟

(۱) ۴۰

۳۶ (۲)

(۳) ۶۴

۶۰

پی اچ دی تست ؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

محل انجام محاسبات	صفحه ۸	286F	مجموعه دروس تخصصی
			-۶۱
		در رگرسیون دو متغیره ضریب تبیین کدام است؟ b.x (۲)	X.y (۱)
		(۳) مجدور ضریب رگرسیون چهار مسافر برای توقف شبانه به هتلی مراجعه می‌کنند. در هتل دو اتاق دو تختی خالی موجود است. به چند صورت این چهار نفر را می‌توان در اتاق‌ها جای داد؟ ۶ (۱) ۱۲ (۴) میانه اعداد ۱۳، ۱۲، ۱۰، ۹، ۵، ۷، ۴ و ۳ کدام است؟ ۷ (۲) ۵ (۴) ۶ (۳)	-۶۲
		در حالیکه در یک طرح آزمایشی آزمون F_S معنی‌دار نباشد، چه روشی برای مقایسه میانگین‌ها می‌توان استفاده نمود؟ LSD (۲) (۱) t (۲) (۳) دانکن	-۶۳
		در یک آزمایش فاکتوریل 2^4 ، تعداد اثرات اصلی و اثرات متقابل دو عاملی به ترتیب چقدر است؟ ۶ و ۴ (۲) ۸ و ۴ (۴)	-۶۴
		کدام یک از طرح‌های آزمایشی زیر اثر واحد آزمایشی (حیوان) را بهتر در محاسبات اعمال می‌نماید؟ (۱) آشیانه‌ای (۲) چرخشی (۳) بلوک کامل تصادفی (۴) بلوک کامل با تکرار مشاهده بر روی واحد آزمایشی	-۶۵
		دانلود کلیه سوالات آزمون دکتری در وب سایت پی اچ دی تست	-۶۶

-۶۷	P mod S یک ترکیب است که در سلول های ساخته می شود و بر سلول های اثر می گذارد.
۱)	پروتئینی - لایدیگ - مایوبید
۲)	پروتئینی - مایوبید - سرتولی
۳)	استروپیدی - لایدیگ - سرتولی
۴)	پروتئینی - سرتولی - اسپرماتوگوتی
-۶۸	در گوسفندها گاو در رخ می دهد.
۱)	میانه آبستنی (۲) هفته دوم آبستنی (۳) دو هفته آخر آبستنی (۴) یک ماه پس از تولد
بروز ناهنجاری های تولید مثلی در گوسفندانی که روی شبدر قرمز چرا می کنند به علت وجود ترکیباتی در شبدر قرمز است	
مانند که در شکمبه به ترکیب تبدیل می شود که ویژگی هورمونی آن مانند است.	
۱)	Coumestan - Formononetin (۲) Coumestan - Biochanin - استروژن ها
۲)	Equal - Genistein (۴) Equal - Formononetin (۳) استروژن ها - پروژسترون
اگر "A" نشان دهنده یک کاتیون باشد، معادله نشان دهنده معادله Nernst خواهد بود.	
-۶۹	$-61 \log_{10} \frac{[A]_i}{[A]_o}$ (۴) $-61 \log_{10} \frac{[A]_0}{[A]_i}$ (۳) $-61 \log_n \frac{[A]_0}{[A]_i}$ (۲) $+61 \log_{10} \frac{[A]_i}{[A]_o}$ (۱)
میکروفیلامنت ها در پیوندهای بین سلولی بیشترین فراوانی را دارند.	
-۷۰	Zona occludens (۴) Tight junctions (۳) Zona adherens (۲) Gap junctions (۱)
..... مولکول حرکتی میکروتیوبول ها است.	
-۷۱	Actin (۴) Kinesin (۳) Myosin (۲) Tubulin (۱)
تمایز بین جارتخمدان به نیاز دارد که زن آن روی کروموزوم قرار دارد.	
X, Dax - ۱ (۴) Y, Dax - ۱ (۳) Y, H - y (۲) X, SRy (۱)	
در مایومتریوم پتانسیل های آهسته را به پتانسیل آستانه می کند.	
-۷۲	(۱) استروژن - نزدیکتر (۲) اپینفرین - نزدیکتر (۳) پروژسترون - نزدیکتر (۴) استروژن - دورتر
آنولوس (Annulus) در کدام مرحله از مراحل اسپرمیوژنسیز (spermiogenesis) تشکیل می گردد؟	
-۷۳	(۱) گلزاری (۲) کلاهک
(۴) بلوغ	
در مورد PCT، کدام گزینه نادرست است؟	
-۷۴	(۱) در قسمت قشری کلیه واقع شده اند.
(۴) سلول های آن دارای microvilli هستند.	
در عضلات Gap Junction یافت نمی شود.	
-۷۵	(۱) رحم (۲) راست کننده مو
کدام گزینه نادرست است؟	
-۷۶	(۱) در عضله اسکلتی ورود سدیم منجر به دیپلاریزاسیون و Ca^{++} منجر به انقباض می شود.
در عضلات صاف کمپلکس Ca^{++} کالmodولین عمل متقابل اکتین و میوزین را فعال می کند.	
-۷۷	(۲) در بافت های عضلانی کمپلکس Ca^{++} و تروپونین عمل متقابل اکتین و میوزین را فعال می کند.
در عضله صاف ورود Ca^{++} از خارج به داخل سلول سبب دیپلاریزاسیون و روشن شدن ماشین انقباض می شود.	
-۷۸	(۳) در عضلات Gap Junction یافت نمی شود.
کدام گزینه نادرست است؟	
-۷۹	(۱) حدود ۲/۵ DHT برابر قوی تر از تستوسترون است.
تستوسترون در برخی از بافت ها به وسیله آنزیم ۵ α - رودکتاز به DHT تبدیل می شود.	
-۸۰	(۲) در بعضی از بافت ها می تواند توسط آنزیم آروماتاز به استروژن تبدیل شود.
تستوسترون مسئول تبدیل مجاری ول夫 به اپیدیدیمس و واژودفران و DHT مسئول رشد و تبدیل دستگاه خارجی تناسلی به آلت و اسکروتوم است.	
کدام یک منجر به anemia نمی شود؟	
-۸۱	(۱) از بین رفتن مغز قرمز استخوان
(۲) اختلال در جذب ویتامین B ₁₂	
(۴) افزایش سلول های Oxytic	
۳) پاره شدن گلبول های قرمز نابالغ	