



دفترچه پاسخ

عمومی دوازدهم ریاضی

۱۳۹۷ آذر ماه ۳۰

طراحان

فاسنے احمدی - حنیف افخمی - محسن اصغری - علیرضا جعفری - مریم شمیرانی - کاظم کاظمی	فارسی
درویشعلی ابراهیمی - علی اکبر ایمان پرور - حسین رضایی - ولی الله نوروزی - مجید همایی	عربی زبان قرآن
محبوبه ابتسام - ابوالفضل احمدزاده - امین اسدیان پور - محمد رضایی بقا - سیدهادی سرکشیک زاده - محمد رضا فرهنگیان - وحیده کاغذی - مرتضی محسنی کبیر - سیداحسان هندی	دین و اندیشه
الهام آخوندی - شهاب اناری - حامد بابایی - میرحسین زاهدی - علی شکوهی - روزبه شهلا بی مقدم - سپیده عرب	زبان انگلیسی

گزینشگران و براستاران

نام درس	مسئول درس	گزینشگر	گروه و براستاری
فارسی	افسانه احمدی	افسانه احمدی	محسن اصغری - مریم شمیرانی - حسن و سکری
عربی زبان قرآن	فائزه کشاورزیان	فائزه کشاورزیان	درویشعلی ابراهیمی - علی اکبر ایمان پرور
دین و اندیشه	محمد رضایی بقا	امین اسدیان پور - سیداحسان هندی	صالح احصایی - سکینه گلشنی - محمد ابراهیم مازنی
زبان انگلیسی	سپیده عرب	سپیده عرب	حامد بابایی

گروه فنی و تولید

مدیران گروه	سید محمدعلی مرتضوی - حمید اصفهانی
مسئول دفترچه	معصومه شاعری
مستندسازی و مطابقت با مصوبات	مدیر: مریم صالحی، مسئول دفترچه: لیلا ایزدی
صفحه آرا	فاطمه علی باری
نظرارت چاپ	حمید عباسی

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب - بین صبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۰۶۴۶۳-۰۲۱



فارسی (۳)

(عنیف اغفمن)

-۵

«کار» در این گزینه «مضاف‌الیه» است، اما در سایر گزینه‌ها «کرد» به معنی «گردانید» است و «بیدار»، «بی‌خار» و «جوهردار» مستند هستند.

(فارسی ۳، ستور زبان، ترکیبی)

(مسن اصفری)

-۶

گزینه «۱»: این بی‌خردان - بی‌خردان سفله - مردم خردمند (۳ مورد)

گزینه «۲»: این اساس - این نژاد - این پیوند (۳ مورد)

گزینه «۳»: این معجر - سپید معجر - یکی (یک) اورند - کبود اورند (۴ مورد)

گزینه «۴»: مادر سرسپید - این پند - سیاه‌بخت فرزند (۳ مورد)

(فارسی ۳، ستور زبان، صفحه ۳۶)

(مسن اصفری)

-۷

حرف «را» در ابیات گزینه‌های «۱، ۳ و ۴» حرف اضافه و در بیت گزینه «۲» نشانه مفعول است: یکرنگی معشوق، عشق را یکدل می‌کند.

تشویح گزینه‌های دیگر

گزینه «۱»: دامن افشدند ز دنیا برای عشق مشکل نیست.

گزینه «۳»: دوست برای ما [باشد] و همه نعمت دنیا برای شما [باشد].

گزینه «۴»: ای ساقی، به رندان پارسا بشارت بد.

(فارسی ۳، ستور زبان، صفحه ۳۸)

(کاظم کاظمی)

-۸

گزینه «۱»: «هر» در «مرگ هر کس» ← صفتِ مضاف‌الیه / «زندگی» در «نقشی حال زندگی» ← مضاف‌الیه مضاف‌الیه (۲ مورد)

گزینه «۲»: «تو» در «شکنجه زلف تو» ← مضاف‌الیه مضاف‌الیه / «کدام» در «دست کدام دل» ← صفت مضاف‌الیه (۲ مورد)

گزینه «۳»: «دَم» در «مرغ دلم»، «ـت» در «داغ غمت» و «تو» در «دانه خال تو» ← مضاف‌الیه مضاف‌الیه (۳ مورد)

گزینه «۴»: «سیاه» در «پرده ابر سیاه»، «نیلی» در «حجاب پرده نیلی» ← صفت مضاف‌الیه (۲ مورد)

(فارسی ۳، ستور زبان، صفحه‌های ۶۵ و ۶۶ و ۷۴)

(عنیف اغفمن)

-۹

گزینه «۱»: این گزینه مثل بیت سؤال می‌گوید که شنونده گوینده را سر شوق می‌آورد.

تشویح گزینه‌های دیگر

گزینه «۲»: این قدر شعر من زیباست که شنونده بی هوش می‌شود.

گزینه «۳»: شنونده من بیش از من از سخنان من بهره می‌برد.

گزینه «۴»: ناسراگفتن، اول به خود گوینده آسیب می‌زنند.

(فارسی ۳، مفهوم، صفحه ۳۹)

(مسن اصفری)

-۱

موارد نادرست و معنای درست آن‌ها:

گزینه «۱»: غرفه: بالاخانه، هر یک از اناق‌های کوچکی که در بالای اطراف سالن یا یک محوطه می‌سازند که مشرف بر محظوظ است.

گزینه «۲»: عدله: دادگستری

گزینه «۴»: شرذه: خشمگین، غضبناک

(فارسی ۳، لغت، واژه‌نامه)

(مسن اصفری)

-۲

غلطهای املایی و شکل درست آن‌ها:

گزینه «۱»: نشعه ← نشه

گزینه «۳»: مباحات ← مبابات

گزینه «۴»: فراغ ← فراق

(فارسی ۳، املاء، ترکیبی)

(کاظم کاظمی)

-۳

بیت «ج» ← مجاز: «سینه» مجاز از «دل»

بیت «د» ← حسن تعییل: دلیل کوتاه شدن شمع (ذوب شدن شمع)، تلاش آن برای رسیدن به حاکستر پروانه است.

بیت «الف» ← تشییه: بحر رحمت / موجه دریا مانند صیقل است.

بیت «ب» ← اسلوب معادله: احسان دشمن خون خوار را از ستم باز می‌دارد، همان‌طوری که سیر داشتن شیر، موجب رام شدن آن می‌شود.

بیت «ه» ← کنایه: «زبان دراز شدن» کنایه از «گستاخ شدن» است. / «مهر» خاموشی بر لب کسی زدن» کنایه از «ساقت کردن» است.

(فارسی ۳، آرایه، ترکیبی)

(عنیف اغفمن)

-۴

اسلوب معادله دارد (چون در مصراج دوم مصدق و مثالی برای مفهوم مصراج اول ذکر شده است) / ایهام ندارد.

تشویح گزینه‌های دیگر

گزینه «۱»: کوه و عدس: تضاد/ کوه اندازه عدس هم سنگینی نداشته باشد: اغراق.

گزینه «۳»: این که آشیانه مانند دام شود: تشییه / «دام» و «کام»: جناس

گزینه «۴»: آبینه هستی: تشییه / واج آرایی «ر» و «س»

(فارسی ۳، آرایه، ترکیبی)



(احسانه احمدی)

-۱۶

کعبه نتوانست تلخی را (: مفعول) از زمزم جدا کند.

(فارسی ۳، دستور زبان، ترکیبی)

(ممسن اصغری)

-۱۷

مفهوم بیت نخست: بی حاصلی موجب شرمندگی است.

مفهوم بیت دوم: تأسف خوردن از نداشتن همدرد شایسته

تشريح گزینه‌های دیگر

گزینه «۱»: بیان ناپایداری دنیا و توصیه به دل نبستن به آن

گزینه «۳»: هر کسی محروم راز عشق نیست.

گزینه «۴»: تعلق داشتن روح آدمی به عالم بالا و بازگشت به اصل

(فارسی ۲، مفهوم، مشابه صفحه‌های ۲۹ تا ۳۲)

(مریم شمیرانی)

-۱۸

مفهوم بیت «ب»: روزی مقدار است؛ چه تلاش کنی، چه نکنی.

مفهوم بیت «ت»: برای کسب روزی باید سعی و تلاش کنی.

(فارسی ۲، مفهوم، مشابه صفحه‌های ۱۳ و ۱۴)

(مریم شمیرانی)

-۱۹

مفهوم مشترک گزینه‌های مرتبط این است که خداوند برای عقل و ادراک قابل

شناخت نیست، ولی در گزینه «۳» شاعر معتقد است که افکار دقیق به نور خدا منور

است و او شب را به روز روشن بدل می‌کند.

(فارسی ۲، مفهوم، مشابه صفحه ۱۰)

(علیرضا پهلوی)

-۲۰

مفهوم بیت صورت سؤال و گزینه «۳»: زندگی هم خوشی دارد و هم ناخوشی.

(فارسی ۲، مفهوم، صفحه‌های ۳۸ تا ۴۱)

(کاظم کاظمی)

-۱۰

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و ایات مرتبط: جاویدانگی عشق

مفهوم بیت گزینه «۲»: آرزوی بازگشت به اصل (تعلق داشتن روح آدمی به عالم

معنا)

(فارسی ۳، مفهوم، صفحه ۵۷)

فارسی (۲)

(احسانه احمدی)

-۱۱

رضوان در این بیت به معنای «فرشته نگهبان بهشت» است.

(فارسی ۲، لغت، واژه‌نامه)

(مریم شمیرانی)

-۱۲

خواست ← خاست (برخاست، بلند شد)

(فارسی ۲، املاء، ترکیبی)

(احسانه احمدی)

-۱۳

زندگانی جلال الدین محمد، مشهور به مولوی: بدیع الزمان فروزانفر

(فارسی ۲، تاریخ ادبیات، ترکیبی)

(هنیف افخمی)

-۱۴

دود و شرار: تناسب / «دوش شرار»: استعاره / نفس همچون بار می شود: تشبيه

(فارسی ۲، آرایه، ترکیبی)

(احسانه احمدی)

-۱۵

گزینه «۱»: دریغ ... دریغ: تکرار- زور و دل / گز و تبیغ: معطوف (۳ مورد)گزینه «۲»: ما خود بندایم: بدل (۱ مورد)گزینه «۳»: نقش تبعی ندارد. (تو و طوبی و ما و قامت: یاریم ← «واو» عطف نیست- «واو» بین دوتو همراه طوبی باش، اما ما همراه قامت یاریم ← «واو» عطف نیست- «واو» بین دو

جمله نیز حرف ربط است، نه حرف عطف.

گزینه «۴»: میان عاشق و مشوق هیچ حائل نیست: معطوف - تو خود حجاب

خودی: بدل (۲ مورد)

(فارسی ۲، دستور زبان، صفحه ۳۲)



عربی زبان قرآن (۳)

-۲۱

(رویشنل ابراهیمی)

«**رجلی نولمنی**»: «پایم درد می کند» / «لا استطیع»: «نمی توانم» / «أَنْ أَصْعُد»: «بِالا
بروم» / «**الجبل**»: «کوه» / «**يَوْمُ الْجَمْعَةِ**»: «روز جمعه، در روز جمعه»

(ترجمه)

-۲۲

(میدید همایی)

«**الغَارُ**»: «غار» / «كَانَ ... قَدْ وَقَعَ»: «واقع شده بود» / «جَبَلٌ مَرْتَفِعٌ»: «کوهی
بلند، کوه بلندی» / «مَا اسْتَطَاعَ إِلَى الشَّبَابِ»: « فقط جوانان توانسته بودند»

(ترجمه)

-۲۳

(میدید همایی)

«**أَتَحْبَيْنَ**»: «آیا دوست داری» / «أَنْ تَزَوَّرِي»: «که زیارت کنی» / «زمیلاتک
الصالحات»: «همکاران شایستهات، همکلاسی های شایستهات»

(ترجمه)

-۲۴

(رویشنل ابراهیمی)

«**الْفَخْرُ**»: «افتخار» / «عَقْلٌ ثَابِتٌ»: «خردی استوار» / «خَيَاءٌ»: «شرم» / «عَفَافٌ»:
«پاکدامنی» / «أَدَبٌ»: «ادب»

(ترجمه)

-۲۵

(رویشنل ابراهیمی)

برای نقطه چین اول، فعل «أَنْذَكَرْ» به یاد می آورم» و برای نقطه چین دوم، اسمی باید
باشد که به معنای «قله» و مضاف باشد: «قَمَّةٌ، قُلَّةٌ»

(مفهوم)

-۲۶

(میدید همایی)

مفهوم عبارت قرآنی **گزینه ۲** «چنین است: «و هر چه از نیکی انجام دهید، خداوند
آن را می داند!» که این مفهوم، با مفهوم بیت صورت سوال مطابقت دارد.

(مفهوم)

عربی زبان قرآن (۲)

-۲۷

(میدید همایی)

با توجه به مذکور بودن «المُسافِرَانِ»، «مُتَأْخِرِتِينِ» نادرست است.

(مال)

(رویشنل ابراهیمی)

-۲۸

گزینه «۳» دارای جمله حاليه است و بهترین علامت برای حال جمله (جمله حاليه)،
واو حاليه‌اي است که بعد از آن یک ضمير واقع شده است.

(مال)

(میدید همایی)

-۲۹

ترجمه: «انسان عاقل نباید به چیزی که به سرعت از بین می‌رود، افتخار کند»؛ «لا»
ناهیه است. (لا یفتخیر)

(أنواع بملات)

(میدید همایی)

-۳۰

در گزینه «۱»، عبارت «و هم يُساعِدونَ»، «جمله حاليه» است.

(مال)

عربی زبان قرآن (۲)

-۳۱

(علی‌اکبر ایمان پرور)

«**قَدْ حَرَمَ**»: «حرام کرده است» / «الإِسْتِهْزَاءُ»: «ریشخند کردن» / «تَسْمِيَةُ الْآخَرِينَ»:
«نامیدن دیگران» / «بِالْأَسْمَاءِ الْقَبِيْحَةِ»: «با نامهای زشت»

(ترجمه)

(ولی‌الله نوروزی)

-۳۲

«**مِنْ أَفْضَلِ**»: «از بهترین» / «أَعْمَالُ الطَّلَابِ»: «کارهای دانش آموزان» / «جُهْدُهُمْ»:
«تلاش کردن آنها» / «فِي الدَّرْسِ»: «در درس» / «حتى يَنْجُحُوا فِي الْامْتِحَانِ»: «تا
اینکه در امتحان قبول شوند» / «فِي نِهَايَةِ الْعَامِ الدَّرَاسِيِّ»: «در پایان سال تحصیلی»

(ترجمه)

(رویشنل ابراهیمی)

«الفخر»: «افتخار» / «عقل ثابت»: «خردی استوار» / «خياء»: «شرم» / «عفاف»:
«پاکدامنی» / «أدب»: «ادب»

(ترجمه)

(رویشنل ابراهیمی)

برای نقطه چین اول، فعل «أَنْذَكَرْ» به یاد می آورم» و برای نقطه چین دوم، اسمی باید
باشد که به معنای «قله» و مضاف باشد: «قَمَّةٌ، قُلَّةٌ»

(مفهوم)

(میدید همایی)

مفهوم عبارت قرآنی **گزینه ۲** «چنین است: «و هر چه از نیکی انجام دهید، خداوند
آن را می داند!» که این مفهوم، با مفهوم بیت صورت سوال مطابقت دارد.

(مفهوم)



(مسین، رضایی)

-۳۶

«به آنچه که گفت، نگاه (توجه) کن و به کسی که گفت، نگاه نکن!» ارتباطی به مفهوم متن ندارد.

در سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: جز اندکی از دانش چیزی داده نشده‌اید!

گزینه «۲»: نهایت دانش اعتراف به ندانستن است!

گزینه «۳»: گفتن (نمی‌دانم) نیمی از دانایی است!

(درک مطلب)

(علی‌کبر ایمان پرور)

-۳۳

ترجمه گزینه «۴»: «آلوده شدن به گناه چیست؟! آلوده شدن به گناه، همان مسخره کردن دیگران است!»

(مفهوم)

(مسین، رضایی)

-۳۷

از اخلاق ندانن ← گزینه «۳»: عدم داوری پیش از تحقیق است. (نادرست)

(درک مطلب)

(ولی‌الله نوروزی)

-۳۴

ترجمه عبارت صورت سؤال: «بهترین کارها، میانه‌ترین آن‌هاست!» که مفهوم آن «میانه روی» است و در گزینه «۲» به «اجام ندادن افراط و تفریط» اشاره می‌کند که با عبارت صورت سؤال، مطابقت مفهومی دارد.

(مفهوم)

(مسین، رضایی)

-۳۸

«اعتراف به جهل، علم است!» تنها گزینه صحیح مطابق متن است.

در سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: فقط انفاق کردن علم را کاهش می‌دهد!

گزینه «۳»: اعتراف به علم، فروتنی است!

گزینه «۴»: جهل انسان، قطره‌ای از دریای علم اوست!

(درک مطلب)

(ولی‌الله نوروزی)

-۳۵

تنها در گزینه «۴»، کلمه «خوبی» به معنای «خوبی» است و در سایر گزینه‌ها، به معنای «بهتر، بهترین» و اسم تفضیل است.

(قواعد اسم)

(مسین، رضایی)

-۳۹

عالیم ← بعد از این که می‌اندیشد، سخن می‌گوید!

(درک مطلب)

(مسین، رضایی)

-۴۰

موارد نادرست در سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: خبر (صحیح: فاعل) / گزینه «۲»: مُفرَّدة (صحیح: جمع تکسیپ و مفرَّده «المال») / گزینه «۳»: صفة (صحیح: خبر)

(درک مطلب)

ترجمه متن درک مطلب:

امام علی (ع) فرموده است: «ای کمیل، مال اندوزان هلاک شدند در حالی که زنده‌اند و دانشمندان ماندگارند تا روزگار باقی است، وجودشان (جسمشان) ناپیدا و داستان آن‌ها در قلب‌ها وجود دارد. علم بهتر از ثروت است، علم تو را نگه می‌دارد در حالی که تو مال را نگه می‌داری، مال با هزینه کردن کم می‌شود و علم با انفاق کردن افزایش می‌یابد.» در قرن‌های اخیر انسان در دانش‌ها و در هنرها به سرعت پیشرفت کرده است، با این وجود آنچه که انسان نمی‌داند بیشتر از چیزی است که می‌داند و دانش وی نسبت به جهلش مانند مقایسه قطره آبی با دریابی گسترده است.

فیلسوف بزرگ سقرات گفته است: من جز یک چیز را نمی‌دانم و آن «چیزی نمی‌دانم» است.

و این چنین دانشمندان فروتن هستند و به ندانستن خویش اعتراف می‌کنند. دانشمند پیش از داوری شک می‌کند و پیش از سخن گفتن می‌اندیشد، و ندان بدون اندیشیدن سخن می‌گوید، با قطع و یقین داوری می‌کند یا بدون زحمتی در پژوهشی مخالفت می‌کند!



این که نابود شوند؛ و اگر بخواهند نابود شوند، کسی نمی‌تواند آن‌ها را حفظ کند.
مگر خود خداوند.»

(دین و زندگی دوازدهم، درس ۵، صفحه ۵۸)

(ممدر، رضایی‌نقا)

-۴۶

آنگاه که زلیخا در برابر زنان دربار، رفتار حضرت یوسف (ع) را بیان کرد، گفت: «وَ لَئِنْ رَاوَدَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَالْسَّعْصَمَةِ مِنْ دَرِبِيْ کامجویی از او بودم او خوبشتن نگهداشت» و به عصمت و پاکدامنی حضرت یوسف (ع) اعتراض کرد.

حضرت یوسف (ع) به درگاه خدا عرضه داشت: «وَ إِنَّ تَصْرِيفَ غَنِيَّةِ كَيْدِهِنَّ أَصْبَحَ إِلَيْهِنَّ وَ أَكْنَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ» و اگر مکر این زنان را از من دور نگردانی، به آن‌ها می‌میل می‌کنم و از جاهلان می‌گردم.» یعنی گناه نکردن خود را مشروط به یاری از جانب خداوند می‌داند.

(دین و زندگی دوازدهم، درس ۴، صفحه ۵۰)

(ویدیو کاغذی)

-۴۷

ترک گناه و توجه به واجبات و اطاعت از خداوند، درخت اخلاص را آبیاری می‌کند و رشد می‌دهد. امام صادق (ع) درباره یکی از مراتب بالای اخلاص می‌فرماید: «عمل خالص عملی است که دوست نداری جز خدا کسی تو را به خاطر آن ستایش و تمجید کند.»

(دین و زندگی دوازدهم، درس ۴، صفحه‌های ۴۴ تا ۴۹)

(سیدرسان هنری)

-۴۸

بیت مذکور از حافظت به نفوذنایابی در برابر سوسوه‌های شیطان، از میوه‌های درخت اخلاص اشاره دارد و حضرت علی (ع) فرمود: «خداوند بدان جهت روزه را واجب کرد تا اخلاص مردم را بیازماید.»

(دین و زندگی دوازدهم، درس ۴، صفحه ۴۹)

(مرتضی مسینی‌کیبر)

-۴۹

روی‌آوردن دنیا و لذت‌های دنیوی به برخی انسان‌های گناهکار نشانه لطف خداوند به آنان نیست. قرآن کریم در این باره در آیات ۱۵ و ۱۶ سوره هود می‌فرماید: «کسانی که زندگی دنیا و تجملات آن را بخواهند، حاصل کارهایشان را در همین دنیا به آنان می‌دهیم و کم و کاستی نخواهند دید. اما اینان در آخرت جز آتش دوزخ ندارند و هرچه در دنیا کرده‌اند، بر باد رفته و آنچه را که انجام می‌دهند، باطل است.»

(دین و زندگی دوازدهم، درس ۶، صفحه ۷۴)

(سیدهادی سرکشیک‌زاده)

-۵۰

همه موارد مذکور، صحیح می‌باشد.

(دین و زندگی دوازدهم، درس ۵، صفحه‌های ۵۹، ۶۰ و ۶۳)

دین و زندگی (۳)

(سیدرسان هنری)

-۴۱

از ترجمه آیه ۱۸۲ سوره آل عمران: «إِنْ [عَقْبَتْ]، بِهِ خَاطِرٌ كَرْدَارٌ بِيَشِينٌ شَمَاسَتْ [وَ نَيْزَ] بِهِ خَاطِرٌ آنَّ اسْتَ كَهْ] خَداوند هرگز به بندگانش ستم نمی‌کند.» در می‌یابیم که پاداش و کیفر الهی بر طبق عدالت و براساس اعمال آزادانه و آگاهانه خود انسان است.

(دین و زندگی دوازدهم، درس ۵، صفحه ۵۷)

(امین اسرایان پور)

-۴۲

با توجه به آیه شریفه «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِثَةُ الْمَوْتِ» می‌توان دریافت، چشیدن طعم مرگ برای هر کس و بازگشت به سوی خدا پس از آزمایش به واسطه خبر و شر، به منزله یک سنت و قانون تعییرنایابی الهی و برای همه انسان‌ها است.

(دین و زندگی دوازدهم، درس ۶، صفحه ۶۹)

(ویدیو کاغذی)

-۴۳

در عبارت قرآنی «إِنَّمَا تُمْلِي لَهُمْ»، مرجع ضمیر «هُمْ»، کفار هستند. خداوند می‌فرماید: «أَنَّا كَافِرْ شَدِيدْنَ، تَصْوِيرٌ نَكْنِدَنَّ كَهْ بَرِّ گَنَاهَنَ خَودَ بِيَفْرَابِنَدْ.» آن‌هاست. ما به آن‌ها مهلت می‌دهیم تا بر گناهان خود بیفرابند. در عبارت قرآنی «الْفَتْحُنَا عَلَيْهِمْ»، ممنظور از «هُمْ»، مؤمنان باقی‌مانند. قرآن کریم می‌فرماید: «أَغْرِيَ مَرْدَمْ شَهْرَ اِيمَانَ أَوْرَدَهُ وَ تَقْوَى بِيَسِّهِ مَيْ كَرْدَنَدَنَ، قَطْعًا بِرَكَاتِيَّ اَزْ أَسْمَانَ وَ زَمِينَ بِرَايِشَانَ مَيْ گَشْوَدِيمْ.»

(دین و زندگی دوازدهم، درس ۶، صفحه‌های ۶۹ و ۷۰)

(امین اسرایان پور)

-۴۴

روی‌آوردن دنیا و لذت‌های دنیوی به برخی انسان‌های گناهکار نشانه لطف خداوند به آنان نیست. یعنی سنت خدا بر این است که هم به افراد خواهان دنیا و هم به افراد خواهان آخرت، مدد می‌رساند و امکانات رسیدن به خواسته‌هایشان را فراهم می‌کند. البته اینان عاقب زیانبار تصمیم خود را در آخرت مشاهده خواهند کرد. این مفهوم، بیانگر سنت امداد الهی است که در آیه «كُلًا نَمِدَهُ هُؤْلَاءِ وَ هُؤْلَاءِ مِنْ غَطَاءِ رِيْكَ» تجلی یافته است.

(دین و زندگی دوازدهم، درس ۶، صفحه‌های ۶۹ و ۷۰)

(ممدر، رضایی‌نقا)

-۴۵

اعتقاد به خدای حکیم، این اطمینان را به آدمی می‌بخشد که جهان خلقت، حافظ و نگهبانی دارد که در کار او اشتباه نیست. به عبارت دیگر، کشتی جهان ناخدایی دارد که به موجب علم و قدرت ناخدا، هیچ‌گاه غرق و نابود نخواهد شد. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ يَمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ أَنَّ تَرَوْلَا وَ لَئِنْ زَلَّتَا إِنَّمَّا كُلُّهُ مِنْ أَخْدِ مِنْ بَعْدِهِ.» همانا که خداوند نگه می‌دارد آسمان‌ها و زمین را از



(وهدۀ کاغذی)

این که انسان بتواند از همه سرمایه‌هایی که خدا به او داده، به خوبی بهره‌مند شود و به آن هدف برتری که خداوند در خلقت او قرار داده است، برسد، مؤید نیاز به «کشف راه درست زندگی» است و این که اگر هدف حقیقی خود را نشناخته باشد در شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از دست داده است، درباره «شناخت هدف زندگی» می‌باشد.

-۵۷

(محمد رضایی‌نقا)

پاسخ به سوالاتی اساسی و نیازهای برتر انسان، باید همه‌جانبه باشد؛ بهطوری که به نیازهای مختلف انسان به طور هماهنگ پاسخ دهد. زیرا ابعاد جسمی و روحی، فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی وی، پیوند و ارتباط کامل و تنگانگی با هم دارند و نمی‌توان برای هر یکی هر یکی جدایگانه برنامه‌ریزی کرد.

(دین و زندگی یازدهم، درس ۱، صفحه ۷)

-۵۸

(محمود ابتسام)

زیبایی لفظی قرآن سبب شد که بسیاری از مردم بهخصوص ادبیان و دانشمندان تاختایران، مسلمان شوند. برای این که مردم زمان پیامبر (ص) به معجزه بودن قرآن اعتراف کنند و آیندگان هم معجزه بودن آن را تأیید نمایند، از این رو خداوند معجزه اصلی پیامبر (ص) را قرآن کریم و از نوع کتاب قرار داد.

(دین و زندگی یازدهم، درس ۳، صفحه ۳۴)

-۵۹

(ابوالفضل امیرزاده)

تأثیرنازدیری قرآن از عقاید دوران جاهلیت: در هر دوره‌ای از زمان، مجموعه‌ای از افکار، عقاید و آداب و رسوم که از آن به فرهنگ تعبیر می‌شود، مردم را کم و بیش تحت تأثیر قرار می‌دهد. فرهنگ مردم حجار، آمیزه‌ای از عقاید نادرست و آداب و رسوم خرافی و شرک‌آلود بود. با وجود این، قرآن کریم نه تنها از این فرهنگ تأثیر نپذیرفت، بلکه به شدت با آداب جاهلی و رسوم خرافی آن مبارزه کرد و به اصلاح جامعه پرداخت و از موضوعاتی همچون عدالت‌خواهی، علم دوستی، معنویت و حقوق برابر انسان‌ها سخن گفته است. خداوند در قرآن می‌فرماید: «اگر قرآن از نزد غیرخدا بود قطعاً در آن اختلاف و ناسازگاری پیدا می‌کردد».

(دین و زندگی یازدهم، درس ۳، صفحه ۳۸)

-۶۰

(علی شکوهی)

ترجمه جمله: «برادر کوچک‌ترم در حال حاضر برای کار تجارتی در خارج است. من دقیقاً نمی‌دانم که کی برمی‌گردد، اما مطمئنم تا جمیعه برخواهد گشت.»

زبان انگلیسی (۳)

-۶۱

نکته مهم درسی
این سؤال به کاربرد کلمات ربط و حروف اضافه مربوط است از کلمه ربط "but" برای نشان دادن تقلیل و تضاد بین دو مفهوم استفاده می‌کنیم. ضمناً توجه داشته باشید که کلمه "by" دارای معانی و کاربردهای مختلفی است و یکی از معانی مهم آن «تا» است که قبل از قیدهای زمان به کار می‌رود.

ترجمه جمله: «او در حیرت بود که چرا دختری که او عاشقش بود و قصد داشت تابستان آینده با او ازدواج کند بدون هیچ دلیل موجبه ترکش کرد.»

-۶۲

نکته مهم درسی
تست در مورد کاربرد ضمایر موصولی است. با توجه به معنی جمله، اسم "the girl" "نسبت به فعل" "fell in love" نقش مفعولی دارد، پس ضمیر موصولی "whom" به کار می‌رود. از طرفی عبارت "fell in love" به معنی "fell in love" "عاشق شدن" با حرف اضافه "with" همراه است که می‌تواند قيل از "whom" به کار رود. غلط بودن گزینه «۲» به اين خاطر است که بعد از "who" "اسم یا ضمیر به کار نمی‌رود بلکه فعل قرار می‌گيرد. گزینه «۱» غلط است، زيرا که "that" با حرف اضافه به کار نمی‌رود.

(گرامر)

دین و زندگی (۲)

-۵۱

(محمد رضایی‌نقا)

قدرت الهی در برافراشتن آسمان، در آیه «وَ السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا يَأْيُدِ وَ أَنَا لَمَوْسِعُونَ وَ آسمان را با قدرت خود برافراشتم و همواره آن را وسعت می‌بخشم.» جلوه یافته است.

آنگاه که نهایت عجز و ناتوانی مخلوقات در آوردن یک سوره همانند قرآن اثبات شود، اوج اعجاز قرآن مفهوم می‌گردد. عبارت نورانی «فَلَمْ فَأَتُوا بِسُورَةِ مِّلَكٍ» «بگو اگر می‌توانید یک سوره همانند آن را بیاورید.» به ناتوانی انسان‌ها در آوردن یک سوره اشاره می‌کند.

(دین و زندگی یازدهم، درس ۳، صفحه‌های ۳۴ و ۳۹)

-۵۲

(مرتضی محسن‌کیم)

با توجه به ترجمه آیه ۸۵ سوره آل عمران که می‌فرماید: «هر کس که دینی جز اسلام اختیار کند، از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زبان کاران خواهد بود»، خسروان و زیان در آخرت، نصیب و بهره کسانی است که روش (دینی) غیر از آنچه که خدا نشده است و را می‌پذیرد، قبول کنند.

دقت شود: برخلاف گزینه «۱»، به نیازهای برتر انسان در آیه اشاره نشده است و برخلاف گزینه «۲»، از ناسپاسی افراد در آیه مطلبی نیامده است. در گزینه «۴» متبوع به معنای علت است و نمی‌تواند پاسخ صحیح باشد.

(دین و زندگی یازدهم، درس ۲، صفحه ۲۶)

-۵۳

(سیده‌هاری سرکشیک‌زاده)

قرآن کریم برای نیاز ثابتی مثل دادوستد، یک قاعده و اصل ثابت دارد: اینکه خداوند معامله را حلال کرده است، اما ربا را حرام اعلام کرده است. فقهاء و مجتهدان براساس اصول ثابت با تحقیق و مطالعه در کتاب و سنت شکل‌های خاص ربا و معامله را در زمان‌های مختلف اعلام می‌کنند.

(دین و زندگی یازدهم، درس ۲، صفحه ۲۶)

-۵۴

(مرتضی محسن‌کیم)

با توجه به مصرع اول این بیت: «از کجا آمدام آمدنم بہر چه بود»، نیاز برتر شناخت هدف زندگی» برداشت می‌گردد و در مصرع دوم: «به کجا می‌روم آخر ننمایی وطنم» نیاز برتر (افضل) «درک آینده خوبی» مفهوم می‌شود.

(دین و زندگی یازدهم، درس ۱، صفحه ۷)

-۵۵

(محمد رضایی‌نقا)

مطلوب فعالیت کتاب درسی در صفحه ۲۰، در صورت نازل شدن برنامه الهی (دین) بهطور کامل بر انسان نحسین و تکرار نشدن آن، انسان‌های همان عصر، آن را نمی‌فهمیدند و درک نمی‌کردند. زیرا این برنامه فراتر از عقل و درک آنان بود. پس «رشد تدریجی سطح فکر مردم» نادیده گرفته می‌شد. برای انسان‌های دیگر عصرها نیز دین دچار تحریف و یا نابودی کلی می‌شد و بدصورت دقیق و بدون تحریف به دست انسان‌های بعد نمی‌رسید. پس اصلاح تحریف‌های وارد شده در تعليمات پیامبر پیشین، دچار اختلال و چالش می‌گردد. دقیق تر کنید که «آمادگی جامعه شری برای دریافت برنامه کامل زندگی»، از عوامل ختم نبوت است، نه تجدید نبوت.

(دین و زندگی یازدهم، درس ۲، صفحه ۱۹ و ۲۰)

-۵۶

(محمد رضا فرهنگیان)

این که قرآن کریم تحریف نشده، یعنی به تکمیل و تصحیح نیازی ندارد و با تلاش مسلمانان و در پرتو عنایت الهی و اهتمامی که پیامبر (ص) در جمع‌آوری و تنظیم قرآن داشت، این کتاب دچار تحریف نشده است.

(دین و زندگی یازدهم، درس ۲، صفحه ۲۳)



(میرحسین زاهدی)
ترجمة جمله: «الف: قصد دارید برای سالن چقدر مبلمان بخرید؟»
«ب: فکر می کنم هشت تکه کافی خواهد بود. سالن به حد کافی (آنقدرها) بزرگ نیست.»
نکته مهم درسی
«furniture» به معنی «مبلمان، وسایل خانه» اسم غیرقابل شمارش است و قبل از آن «much» به کار می رود نه «many». در قسمت دوم تست، واحد شمارش اقلام مورد نظر است که برای شمارش «furniture» واحد شمارش «piece» به کار می رود.
(گرامر)

(هامد پایابی)
ترجمة جمله: «نخستین گام برای تکلم به یک زبان خارجی این است که به این باور بررسید که نیاز نیست بی عیب و نقش باشید. در حقیقت برای شما ضرورت ندارد که مانند یک بومی به نظر برسی؛ تمامی آنچه باید انجام دهید این است که تلاش کنید طبیعی صحبت کنید.»
(۱) خارجی
(۲) قاره
(۳) بومی
(۴) یادگیرنده

(هامد پایابی)
ترجمة جمله: «اسپانیایی زبان اصلی ۲۰ کشور در جای جای دنیاست. برآورد شده است مجموع افرادی که به زبان اسپانیایی صحبت می کنند حدوداً ۴۵۰ میلیون نفر باشد که پس از چینی، آن را دومین زبان پرکاربرد می سازد.»
(۱) خوشبختانه
(۲) اکثر، عمدتاً
(۳) حدوداً، تقریباً
(۴) به ندرت، ندرتاً

(میرحسین زاهدی)
ترجمة جمله: «در حیرتم که در آن شب اسرارآمیز چه اتفاقی برای او رخ داد. او دیگر قادر نیست خاطره آن رویداد را از ذهنش پاک کند و از بدترین کابوس هایش رهایی یابد.»
(۱) حکومت کردن
(۲) پاک کردن
(۳) متغیر بودن
(۴) اضاء کردن

(میرحسین زاهدی)
ترجمة جمله: «یکی از اهداف اصلی این دوره این است که دانش آموزان پایه اول در سطح ابتدایی را به مرحله ای برسانید که تا پایان سال جملات کوتاه را روان بخوانند.»
(۱) صادقانه
(۲) سریعاً
(۳) خوشبختانه
(۴) بهطور روان

(الهام آفونزی)
ترجمة جمله: «بهترین معنی برای واژه "decent" در خط آخر پاراگراف اول چیست؟»
(۱) مستقیم
(۲) مناسب
(۳) متفاوت
(۴) آخر

(الهام آفونزی)
ترجمة جمله: «نویسنده به تجربه مارکو آسانو اشاره می کند تا نشان دهد که دانشکده مطالعات خارجی کیوتو، ایده ساختن خانه یک شخص در خارج از کشور را بسیار هیجان انگیز ساخته بود.»
(درک مطلب)

(الهام آفونزی)
ترجمة جمله: «در کدام پاراگراف نویسنده برای نشان دادن مهمان نوازی مردم فیلیپین از مثال بیشتری استفاده کرده است؟»
«پاراگراف»
(درک مطلب)

(الهام آفونزی)
ترجمة جمله: «ضمیر "them" در پاراگراف ۳ به چه چیز اشاره دارد؟»
«اعضای تیم که قرار بود مسکن سازی کنند.»
(درک مطلب)

-۶۳
نکته مهم درسی
حرف ربط "but" برای بیان مغایرت به کار می رود.

-۶۴
نکته مهم درسی
توجه کنید ضمیر موصولی مناسب باید برای انسان "Jose" باید و چون پس از جای خالی فعل آمد، به ضمیر موصولی فعلی نیاز داریم. در ضمن بعد از ویرگول کاربرد "that" به عنوان موصول نادرست است.

-۶۵
(شواب اثماری)
(۱) گمان کردن
(۲) توصیه کردن
(۳) ارتباط برقرار کردن
(۴) نصیحت کردن

-۶۶
(شواب اثماری)
(۱) معرفی کردن
(۲) استخراج کردن
(۳) تولید کردن
(۴) حمایت کردن

-۶۷
نکته مهم درسی
ترجمة جمله: «بهترین تیتر برای این متن می تواند «توسعه و تکامل فیزیک» باشد.» درست است که خط اول بند اول درباره شکل قدیمی علم فیزیک است (موضوع گرینه ۳)، ولی بند آخر درباره فیزیک مدرن است، پس بهترین انتخاب گزینه ۲ است.

-۶۸
(درک مطلب)
(روزیه شهلا بی مقدم)
ترجمة جمله: «نویسنده چرا از واژه "surprisingly" در خط دوم استفاده کرده است؟»
برای تأکید بر اینکه دموکریتوس و لوسپیوس نظریه ای در باب اتم های نامرئی در قرن پنجم قبل از میلاد ارائه کرده بودند.»

-۶۹
(درک مطلب)
(روزیه شهلا بی مقدم)
ترجمة جمله: «لغت "them" که زیر آن خط کشیده شده به "حوادث" اشاره دارد.»

-۷۰
(درک مطلب)
(روزیه شهلا بی مقدم)
ترجمة جمله: «از متن می توان متوجه شد که گالیلیو گالیله به تکامل و رشد فیزیک تحریبی کمک کرد.»

-۷۱
زبان انگلیسی (۲)

ترجمة جمله: «الف: به نظر می رسد شما در ترافیک گیر نکردید.»
«ب: او! حق با شماست. در واقع امروز در خیابان ها ترافیک زیاد نیست.»
نکته مهم درسی
«traffic» اسم غیرقابل شمارش است و قبل از آن همه گرینه ها را می توان به کار برد، اما به دلیل اینکه جمله منفی است، گرینه های ۱، ۲ و ۴ به کار نمی روند.
(گرامر)



رقمی پاسخ

آزمون ۳۰ آذر ماه ۹۷

اختصاصی دوازدهم ریاضی

آنچه
آنچه

نام درس	نام طراحان
ریاضی پایه و حسابان ۲	محمدمصطفی ابراهیمی - کاظم اجلالی - سعید جعفری کافی آباد - سیدعادل حسینی - سعید خانجانی - طاهر دادستانی آرش رحیمی - یاسین سپهر - میلاد سجادی - حجت سردار - عارف سمیعی - کوروش شاهمنصوریان - علی شهرابی مرضیه گودرزی - محمدجواد محسنی - سعید مدیرخراسانی - میلاد منصوری - جهانبخش نیکنام
هندسه	امیرحسین ابومحبوب - عباس اسدی امیرآبادی - سیدعادل حسینی - محمد خندان - کیوان دارابی - یاسین سپهر شروین سیاح‌نیا - محمدطاهر شعاعی - محمد صحبت‌کار - رضا عباسی‌اصل - نوید مجبدی - محسن محمدکرمی
ریاضیات گستته	امیرحسین ابومحبوب - عباس اسدی امیرآبادی - علیرضا شریف‌خطیبی - عزیزالله علی‌اصغری - هومن نورائی
آمار و احتمال	امیرحسین ابومحبوب - روح‌انگیز جلیلیان - مسعود خندانی - آرش رحیمی - کیان کریمی خراسانی - محمد گودرزی میلاد منصوری
فیزیک	خسرو ارغوانی فرد - بابک اسلامی - عبدالرضا امینی‌نسب - محمد پورضا - سیدابوالفضل خالقی - بیتا خورشید - میثم دشتیان سعید شرق - مصطفی کیانی - سیدعلی میرنوری - میلاد نقوی
شیمی	علی افخاری - مریم اکبری - مهسا دوستی - مینا شرافتی‌پور - محمد کوهستانیان - جواد گتابی - حسن لشکری سعید محسن‌زاده - محمد حسن محمدزاده مقدم - کیارش مدیریان - سیدطها مصطفوی - سیدمحمد معروفی محمد امین معنوی - دانیال مهرعلی

گزینشکاران و ویراستاران

نام درس	ریاضی پایه و حسابان ۲	هندسه	ریاضیات گستته	آمار و احتمال	فیزیک	شیمی	گزینشگر	آنچه
گزینشگر	کاظم اجلالی	کیوان دارابی محمد خندان	سیدعادل حسینی	میلاد منصوری	مصطفی کیانی	سیدعلی میرنوری	سیدند راحمی‌پور	آنچه
گروه ویراستاری	علی ارجمند مرضیه گودرزی حیدر زرین‌کفش مهدی ملارممانی	علیرضا صابری زهره رامشینی	سیدعادل حسینی	علیرضا صابری زهره رامشینی	حیدر زرین‌کفش	امیرحسین ابومحبوب	علی حسنی صفت علی علمداری علی افخاری متین هوشیار ایمان حسین‌نژاد	آنچه
مسئول درس	سیدعادل حسینی	امیرحسین ابومحبوب	امیرحسین ابومحبوب	بابک اسلامی	مصطفی کیانی	مریم اکبری	نهند راحمی‌پور	آنچه

گروه فنی و تولید

محمد اکبری	مدیر گروه
نرگس غنی‌زاده	مسئول دفترچه
مسئول دفترچه: آته اسفندیاری	گروه مستندسازی
مدیر گروه: مریم صالحی	حسن خرم‌جو
سوران نعیمی	ناظر چاپ

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ - کانون فرهنگی آموزش - تلفن: ۰۱۱-۶۴۶۳

(سید عادل مسین)

-۸۴

$$\frac{3}{2} \cos x - \sin^2 x = \frac{3}{2} \cos x - (1 - \cos^2 x) = 0$$

$$\Rightarrow 2 \cos^2 x + 3 \cos x - 2 = 0$$

$$\Rightarrow \cos x = \frac{-3 \pm \sqrt{25}}{4} = \frac{-3 \pm 5}{4}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \cos x = -2 \\ \cos x = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \cos x = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3} \Rightarrow x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}$$

(مسابان ۲- مثالیات: صفحه‌های ۳۵ ۳۶ ۳۷)

(سید عادل مسین)

-۸۵

$$f(0) = a = 3 \Rightarrow f(x) = 3 + \sin(b\pi x)$$

$$= 3 + \frac{1 - \cos 2b\pi x}{2} = \frac{7}{2} - \frac{1}{2} \cos 2b\pi x$$

با توجه به شکل دوره تناوب تابع f ، برابر $T = 6 - 2 = 4$ است؛ بنابراین داریم:

$$T = \frac{2\pi}{2\pi|b|} = \frac{1}{|b|} = 4 \Rightarrow |b| = \frac{1}{4}$$

چون نمودار تابع $y = \cos x$ نسبت به محور y ها متقارن است، در علامت b تأثیری ندارد.

$$\Rightarrow f\left(\frac{5\pi}{3}\right) = 3 + \sin\frac{25\pi}{6} = 3 + \sin\frac{7\pi}{6}$$

$$= 3 + \frac{1}{4} = \frac{13}{4}$$

(مسابان ۲- مثالیات: صفحه‌های ۳۶ ۳۷)

(جوانب فصل پنجم)

-۸۶

$$\sin x \cos^3 x - \cos x \sin^3 x = \sin x \cos x (\cos^2 x - \sin^2 x)$$


$$= \frac{1}{2} \sin 2x \cos 2x = \frac{1}{4} \sin 4x$$

پس معادله به فرم $\sin 4x = \frac{1}{3}$ در می‌آید. نمودار $y = \sin 4x$ از انقباض

افقی نمودار $y = \sin x$ با ضریب ۴ به دست می‌آید. در این صورت مطابق

شکل زیر، نمودارهای $y = \sin 4x$ و $y = \sin x$ در ۴ نقطه تلاقی دارند، پس

معادله دارای ۴ ریشه است.



(مسابان ۲- مثالیات: صفحه‌های ۳۵ ۳۶)

حسابات ۲

-۸۱

(محمد مصطفی ابراهیمی)


ضابطه مورد نظر می‌تواند $y = -a \cos bx + c$ باشد که $a > 0$ است.

$$|a| = \frac{y_{\max} - y_{\min}}{2} = \frac{4 - 0}{2} = 2 \Rightarrow a = 2$$

$$c = \frac{y_{\max} + y_{\min}}{2} = \frac{4 + 0}{2} = 2$$

به علاوه با توجه به شکل، $T + \frac{T}{4} = 2\pi$ است، در نتیجه:

$$\frac{5T}{4} = 2\pi \Rightarrow T = \frac{4\pi}{5}$$



از طرفی می‌دانیم دوره تناوب برابر است با:

$$T = \frac{2\pi}{|b|} \Rightarrow \frac{4\pi}{5} = \frac{2\pi}{|b|} \Rightarrow |b| = \frac{3}{2}$$

چون نمودار تابع $y = \cos x$ نسبت به محور y ها متقارن است، هر دو مقدار قابل قبول‌اند.

$$\Rightarrow y = -2 \cos\left(\frac{3}{2}x\right) + 2$$

(مسابان ۲- مثالیات: صفحه‌های ۳۵ ۳۶)

(ظاهر (ستانی))

$$y_1 = -2 \sin(a^2 + 2)x + 3 : T_1 = \frac{2\pi}{|a^2 + 2|}$$

$$y_2 = -3 \cos 4ax - 2 : T_2 = \frac{2\pi}{|4a|}$$

$$\frac{T_1 = T_2}{|a^2 + 2| = |4a|}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a^2 + 2 = 4a \Rightarrow a^2 - 4a + 2 = 0 \\ a^2 + 2 = -4a \Rightarrow a^2 + 4a + 2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (a-1)(a-2) = 0 \Rightarrow a = -1, 1, -2, 2 \\ (a+1)(a+2) = 0 \end{cases}$$

(مسابان ۲- مثالیات: صفحه‌های ۳۵ ۳۶)

(سید عادل مسین)

-۸۲

$$\cos \Delta x = 2 \cos^2 x - 1 = \cos 2x \Rightarrow \Delta x = k\pi \pm \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 4x = 2k\pi \Rightarrow x = \frac{k\pi}{2} & ; k \in \mathbb{Z} \\ 4x = 2k\pi \Rightarrow x = \frac{k\pi}{4} & ; k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

با توجه به گزینه‌ها، فقط گزینه «۴» یعنی $\frac{4\pi}{7}$ ، در فرم جواب کلی معادله است.

(مسابان ۲- مثالیات: صفحه‌های ۳۵ ۳۶)

$$\Rightarrow \sqrt{3} = \frac{\tan 70^\circ - \tan 10^\circ}{1 + \tan 70^\circ \tan 10^\circ}$$

$$\Rightarrow \sqrt{3} + \sqrt{3} \tan 70^\circ \tan 10^\circ = \tan 70^\circ - \tan 10^\circ$$

$$\Rightarrow \tan 70^\circ - \tan 10^\circ - \sqrt{3} \tan 70^\circ \tan 10^\circ = \sqrt{3} \quad (2)$$

$$\xrightarrow{(1), (2)} \frac{\sqrt{3}}{3} + \sqrt{3} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

(مسابان ۲ - مثالات: صفحه ۴۲)

(یاسین سپهر)

(مرضیه کورزی)

-۸۷

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} = 2 \tan x$$

$$\Rightarrow \tan x \left(\frac{2}{1 - \tan^2 x} - 2 \right) = 0$$

$$\tan x = 0$$

یا

$$1 - \tan^2 x = \frac{2}{3} \Rightarrow \tan x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\tan x = 0 \xrightarrow{(0, \frac{5\pi}{2})} x = \pi, 2\pi$$

$$\tan x = \frac{\sqrt{3}}{3} \xrightarrow{(0, \frac{5\pi}{2})} x = \frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{13\pi}{6}$$

$$\tan x = -\frac{\sqrt{3}}{3} \xrightarrow{(0, \frac{5\pi}{2})} x = \frac{5\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$$

(مسابان ۲ - مثالات: صفحه های ۵ و ۱۵)

(کوچک شاهدمند پارس)

-۹۱

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{4x^2 - 8x + 4}{x^2 - 4x + 4} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(4x - 4)(x - 2)}{(x - 2)^2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{4(x - 1)}{x - 2} = \frac{1}{2}$$

(مسابان ۲ - مدهای نامتناهی - مر در بینها: صفحه های ۵ و ۱۵)

(یاسین سپهر)

-۹۲

با توجه به قضایای مربوط به حد در بینها: می توانیم بنویسیم:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-x^k}{4x^k} = -\frac{1}{4} & ; \quad k \leq 1 \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^k}{6x^k} = \frac{1}{3} & ; \quad k = 2 \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x^k}{4x^k} = \frac{3}{4} & ; \quad k \geq 3 \end{cases}$$

(مسابان ۲ - مدهای نامتناهی - مر در بینها: صفحه های ۵ و ۱۵)

(علی شهرابی)

-۹۳

برای آن که $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$ باشد، باید حد چپ و راست f ، وقتی $x \rightarrow 2$ هر دو برابر با $+\infty$ باشند، پس:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{[x+2]+k}{x-2} = \frac{[4^+]+k}{2^+-2}$$

$$= \frac{4+k}{2} = +\infty \xrightarrow{\text{باید صورت کسر مثبت باشد.}} k+4 > 0 \Rightarrow k > -4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{[x+2]+k}{x-2} = \frac{[4^-]+k}{2^--2}$$

$$= \frac{3+k}{2} = +\infty \xrightarrow{\text{باید صورت کسر منفی باشد.}} 3+k < 0 \Rightarrow k < -3$$

از اشتراک دو شرط بالا، داریم: $-4 < k < -3$.

(مسابان ۲ - مدهای نامتناهی - مر در بینها: صفحه های ۵ و ۱۵)


(کاظم اجلالی)

-۸۸

$$\alpha + \beta + \theta = 180^\circ \Rightarrow \alpha = 180^\circ - (\beta + \theta)$$

$$\tan \alpha = \tan(180^\circ - (\beta + \theta)) \Rightarrow \tan \alpha = -\tan(\beta + \theta)$$

$$-\frac{4}{3} = -\frac{\tan \beta + \tan \theta}{1 - \tan \beta \tan \theta}$$

از طرف دیگر با توجه به شکل $\tan \beta = \frac{2}{3}$ و $\tan \theta = \frac{x}{4}$ است.

$$\Rightarrow -\frac{4}{3} = -\frac{\frac{2}{3} + \frac{x}{4}}{1 - \left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{x}{4}\right)} \Rightarrow \frac{4}{3} = \frac{8+3x}{12-2x} \Rightarrow x = \frac{24}{12}$$

(مسابان ۲ - مثالات: صفحه ۴۲)

(سعید مدیرفر اسانی)

-۸۹

$$(1 - \sqrt{3} \tan 10^\circ) \left(\frac{\sqrt{3}}{3} + \tan 70^\circ \right)$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{3} + \tan 70^\circ - \tan 10^\circ - \sqrt{3} \tan 10^\circ \tan 70^\circ \quad (1)$$

از طرفی داریم:

$$\tan 60^\circ = \tan(70^\circ - 10^\circ) = \frac{\tan 70^\circ - \tan 10^\circ}{1 + \tan 70^\circ \tan 10^\circ}$$



(علی شهرابی)

-۹۸

ابتدا دامنه تعریف عبارت زیر را مشخص می کنیم:

$$16 - x^2 \geq 0 \Rightarrow -4 \leq x \leq 4$$

مجانب های قائم از بین ریشه های مخرج انتخاب می شوند. بنابراین باید

ریشه های مخرج را حساب کنیم.

$$\sin x = 0 \Rightarrow x = k\pi \xrightarrow{-4 \leq x \leq 4} x = -\pi, 0, \pi$$

 $x = 0$ ریشه ساده صورت نیز است، پس مجانب قائم تابع f نمی باشد؛ زیرا

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 4$$

پس تابع دو مجانب قائم $x = \pm\pi$ را دارد.

(حسابان ۲- مدهای نامتناهی - مدر در بین نهایت: صفحه های ۵۵ تا ۵۸)

(ظاهر (استانی))

-۹۹

$$y = \frac{(x^3 - 4) - 5x + \lambda}{x^3 - 4} = 1 + \frac{\lambda - 5x}{x^3 - 4}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = 1$$

اما وقتی $x \rightarrow -\infty$ ، $y > 1$ و وقتی $x \rightarrow +\infty$ ، $y < 1$ است که تنها شکل

نمودار گزینه «۲» این ویژگی را دارد.

(حسابان ۲- مدهای نامتناهی - مدر در بین نهایت: صفحه های ۶۷ تا ۶۹)

(جعبه سفر (ار))

-۱۰۰

$$\lim_{x \rightarrow -} g \circ f(x) = \lim_{x \rightarrow -} g\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} g(x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{5x+1}{4x^2-1} = \frac{-\frac{3}{2}}{0^-} = +\infty$$

(حسابان ۲- مدهای نامتناهی - مدر در بین نهایت: صفحه های ۴۶ تا ۵۵)

(یاسین سپهر)

-۹۴

چون محل تلاقی مجانب های تابع $y = \frac{1+ax^2}{1+bx^2}$ ، نقطه $(-1, -2)$ می باشد،تابع دارای مجانب های -1 و -2 است.عنی $-1 = x$ ریشه مخرج می باشد.

$$1+b(-1)^2 = 0 \Rightarrow b = -1$$

از طرفی حد تابع در بین نهایت $\frac{a}{b} = y$ می باشد.

بنابراین:

$$\frac{a}{b} = -2 \xrightarrow{b=-1} a = 2 \Rightarrow a+b = 1$$

(حسابان ۲- مدهای نامتناهی - مدر در بین نهایت: صفحه های ۵۵ تا ۵۸ تا ۶۷)

(ظاهر (استانی))

-۹۵

حد صورت -2 است، پس باید حد مخرج $+0$ شود. این در معادله درجه۲ هنگامی امکان پذیر است که مخرج، ریشه مضاعف -4 داشته باشد. یعنی

$$x^2 + ax + b = (x+4)^2$$

$$\Rightarrow x^2 + ax + b = x^2 + 8x + 16 \Rightarrow a = 8, b = 16$$

$$\Rightarrow a - b = -8$$

(حسابان ۲- مدهای نامتناهی - مدر در بین نهایت: صفحه های ۴۶ تا ۴۹)

(آرش ریاضی)

-۹۶

مخرج کسر باید ریشه مضاعف $-3 = x$ داشته باشد، یعنی به فرم

$$(x+3)^2$$

$$\Rightarrow x^2 + 2ax + b = (x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2a = 6 \Rightarrow a = 3 \\ b = 9 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^3 + 2x + 5}{9x^3 + x^2 + 7} = \frac{1}{3}$$

(حسابان ۲- مدهای نامتناهی - مدر در بین نهایت: صفحه های ۴۶ تا ۵۹ و ۵۴ تا ۴۶)

(عارف سمعی)

-۹۷

$$y = \frac{(x-1)(x+1)}{x^3 - x} = \frac{(x-1)(x+1)}{x(x^2 - 1)} = \frac{(x-1)(x+1)}{x(x-1)(x+1)} = \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -} f(x) = \lim_{x \rightarrow -} \frac{1}{x} = \frac{1}{0^-} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +} f(x) = \lim_{x \rightarrow +} \frac{1}{x} = \frac{1}{0^+} = +\infty \end{cases}$$

شکل نمودار گزینه «۳» این ویژگی را دارد.

(حسابان ۲- مدهای نامتناهی - مدر در بین نهایت: صفحه های ۵۵ تا ۵۸)



(طاهر دادستانی)

-۱۰۴

$$p^2(x) - 2p(x) - 4 = 0 \Rightarrow (p(x) - 4)(p(x) + 2) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} p(x) = 4 \\ p(x) = -2 \end{cases}$$

با توجه به شکل سهمی (x, p) ، مشاهده می‌شود که این سهمی خط افقی $y = 4$ را در ۲ نقطه قطع می‌کند، پس معادله $y = 4$ جواب دارد.

همچنین خط افقی $y = -2$ بر سهمی مماس است. بنابراین معادله $p(x) = -2$ یک جواب دارد.

در نتیجه این معادله ۳ جواب دارد.

(ریاضی ۱- معادله ها و نامعادله ها؛ صفحه های ۷۷ تا ۸۱)

(یاسین سپهر)

-۱۰۵

فرض کنیم α و β ریشه های معادله $4x^2 - mx - 7 = 0$ باشند. مجموع مربعات ریشه های این معادله به صورت زیر به دست می آید.

$$\alpha^2 + \beta^2 = S^2 - 2P = \left(\frac{m}{4}\right)^2 + \frac{7}{4} = \frac{65}{16}$$

$$\Rightarrow \frac{m^2}{16} = \frac{9}{16} \Rightarrow m^2 = 9$$

(مسابان ۱- ببر و معادله؛ صفحه های ۷ تا ۹)

(طاهر دادستانی)

-۱۰۶

فرض کنیم α و β ریشه های معادله $x_2 - ax + a - 4 = 0$ و $x_1 - bx - 2x - b = 0$ باشند. پس $\alpha = \frac{x_1}{2}$ و

$$\beta = \frac{x_2}{2}$$

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= \frac{x_1 + x_2}{2} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{b+4}{2} \\ a - 4 = -\frac{b}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4a - b = 4 \\ 4a + b = 16 \end{cases} \\ \alpha\beta &= \frac{x_1 x_2}{4} \Rightarrow b - a = 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = 4 \end{cases} \Rightarrow b - a = 1$$

(مسابان ۱- ببر و معادله؛ صفحه های ۷ تا ۹)

ریاضی پایه

-۱۰۱

(سید عارف حسینی)

$$\Delta = 16 - 12m^2; \Delta > 0 \rightarrow 16 - 12m^2 > 0 \rightarrow m^2 < \frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow -\frac{2}{\sqrt{3}} < m < \frac{2}{\sqrt{3}} \Rightarrow \text{اعداد صحیح این بازه } m = \pm 1, 0$$

(ریاضی ۱- معادله ها و نامعادله ها؛ صفحه های ۷۷ تا ۷۸)

(سعید مجذوبی کاخی آبار)

-۱۰۲

$$(m+2)x^2 - 2mx + 1 > 0 \Rightarrow \begin{cases} a > 0 \Rightarrow m+2 > 0 \Rightarrow m > -2 \\ \Delta < 0 \Rightarrow 4m^2 - 4(m+2) < 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$\Rightarrow 4(m^2 - m - 2) < 0 \Rightarrow 4(m+1)(m-2) < 0$$

$$\Rightarrow -1 < m < 2 \quad (2)$$

$$\xrightarrow{(1)\cap(2)} -1 < m < 2$$

(ریاضی ۱- معادله ها و نامعادله ها؛ صفحه های ۸۱ تا ۸۲)

(سعید قانجانی)

-۱۰۳

معادله باید دو جواب داشته باشد، یعنی $\Delta > 0$ باشد:

$$\Delta = k^2 - 8k > 0 \Rightarrow k < 0 \text{ یا } k > 8 \quad (1)$$

حال برای اینکه $x = 1$ ، بین دو ریشه قرار بگیرد، علامت عبارت موردنظر بهازای $x = 1$ ، مخالف علامت ضریب x^2 باشد؛ یعنی:

$$(1)^2 + k(1) + 2k < 0 \Rightarrow 3k + 1 < 0 \Rightarrow k < -\frac{1}{3} \quad (2)$$

$$\xrightarrow{(1)\cap(2)} k \in (-\infty, -\frac{1}{3})$$

(ریاضی ۱- معادله ها و نامعادله ها؛ صفحه های ۸۶ تا ۸۸)

(میلار منصوری)

-۱۰۹

نمودار $y = ax^3 + bx + c$ وقتی از سه ناحیه عبور می‌کند که دو ریشه همعلامت داشته باشد یا یکی از ریشه‌ها صفر باشد؛ یعنی $\Delta > 0$ و $\frac{c}{a} \geq 0$. در

این مسئله داریم:

$$\frac{c}{a} \geq 0 \Rightarrow \frac{2-m}{m} \geq 0 \Rightarrow 0 < m \leq 2 \quad (1)$$

$$\Delta > 0 \Rightarrow (m+4)^2 - 4m(2-m) > 0 \Rightarrow 5m^2 + 16 > 0 \Rightarrow m \in \mathbb{R} \quad (2)$$

$$\Rightarrow m \in \mathbb{R} - \{0\} \quad (3)$$

$$\xrightarrow{(1) \cap (2) \cap (3)} m \in (0, 2]$$

(مسابان ا- ببر و معادله: صفحه‌های ۷ تا ۱۳)

(مقدمه‌وارد محسن)

-۱۱۰

$$\alpha + \beta = 6, \quad \alpha\beta = 4$$

$$A = \alpha\sqrt{\alpha} + \beta\sqrt{\beta} \rightarrow A^2 = \alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha\beta\sqrt{\alpha\beta}$$

$$\Rightarrow A^2 = (\alpha + \beta)(\alpha^2 + \beta^2 - \alpha\beta) + 2\alpha\beta\sqrt{\alpha\beta}$$

$$= (\alpha + \beta)((\alpha + \beta)^2 - 3\alpha\beta) + 2\alpha\beta\sqrt{\alpha\beta} = 6(36 - 12) + 16$$

$$= 160 \Rightarrow A = \sqrt{160} = 4\sqrt{10}$$

(ریاضی ا- ببر و معادله: صفحه‌های ۷ تا ۱۳)

(میلار سپاری)

-۱۰۷

کافی است نقطه $(-4, 3)$ را دو واحد در راستای افقی به سمت چپ انتقالدهیم تا رأس سهمی $y = x^3 + ax + b$ به دست آید؛ بنابراین نقطه $(-4, 3)$ رأس اولیه سهمی بوده است. حال چون طول رأس سهمی، میانگینصفرهای آن است، مجموع جواب‌های معادله $= 0$ به سادگی به دست

می‌آید:

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = 1 \Rightarrow x_1 + x_2 = 2$$

(ریاضی ا- معادله‌ها و نامعادله‌ها: صفحه‌های ۷ تا ۱۳)

و مسابان ا- ببر و معادله: صفحه‌های ۷ تا ۱۳)

(میلار منصوری)

-۱۰۸

می‌دانیم مختصات رأس یک سهمی به صورت $(-\frac{b}{2a}, \frac{-\Delta}{4a})$ است، پس:

$$\Rightarrow \lambda = \frac{-\Delta}{4a} \xrightarrow{a=-2} \lambda = \frac{-\Delta}{-\lambda} \rightarrow \Delta = 64$$

از طرفی $|AB| = |x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$ یعنی؛


$$\Rightarrow |AB| = \frac{\sqrt{64}}{2} = \frac{\lambda}{2} = 4$$

(ریاضی ا- معادله‌ها و نامعادله‌ها: صفحه‌های ۷ تا ۱۳)

مسابان ا- ببر و معادله: صفحه‌های ۷ تا ۱۳)

(یاسین سپهر)

-۱۱۴

شعاع دایره ۲ و مرکز آن $O' = (2, -1)$ می‌باشد.

با توجه به شکل، دایره از نواحی اول و چهارم عبور می‌کند.

(هنرسه ۳- آشنایی با مقاطع مفروطی؛ صفحه‌های ۱۴۰ تا ۱۴۲)

(یاسین سپهر)

-۱۱۵

 محل تلاقی دو خط $3x - y = 3$ و $2x + y = 3$ ، مرکز دایره می‌باشد.

$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + y = 3 \end{cases} \Rightarrow x = 2, y = 1 \Rightarrow O = (2, 1)$$

از طرفی فاصله مرکز دایره تا خط مماس بر دایره، برابر شعاع دایره است.

$$r = \frac{|3(2) + 4(1) + 5|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{15}{5} = 3$$

پس معادله دایره عبارت است از:

$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 3^2 \Rightarrow x^2 + y^2 - 4x - 2y = 4$$

(هنرسه ۳- آشنایی با مقاطع مفروطی؛ مشابه تمرين ۱ (ت) صفحه ۱۴۶)

(عباس اسدی امیرآبادی)

-۱۱۶

فرض کنید $C(x, y) = ۰$ ، معادله یک دایره باشد. در این صورت اگر $M = (x_0, y_0)$ نقطه‌ای خارج این دایره باشد، آنگاه $C(x_0, y_0) > ۰$ است.

در نتیجه داریم:

$$(2-t)^2 + t^2 - 3^2 > 0 \Rightarrow 4 + t^2 - 4t + t^2 - 9 > 0$$

$$\Rightarrow 2t^2 - 4t - 30 > 0 \Rightarrow t^2 - 2t - 15 > 0 \Rightarrow (t-5)(t+3) > 0$$

$$\Rightarrow t > 5 \text{ یا } t < -3$$

(هنرسه ۳- آشنایی با مقاطع مفروطی؛ مشابه تمرين ۳ صفحه ۱۴۶)

هندسه ۳

-۱۱۱

(محمد صفت‌کار)

$$|A^2| = |A|^2 \geq 0$$

بنابراین ماتریس‌هایی که دترمینان آنها منفی است، نمی‌توانند ماتریس A^2 باشند.

دترمینان ماتریس‌های داده شده برابر است با:

$$-(8)(-8) = -(-8)(-8) = -49$$

$$-(5)(-3) - (-8)(-8) = -5 \times 3 - (-8)(-8) = -49$$

$$-(5)(-3) - 8 \times 8 = -5 \times 3 - 8 \times 8 = -49$$

$$5(-3) - 8(-8) = 5(-3) - 8(-8) = 49$$

بنابراین تنها ماتریس گزینه «۴» می‌تواند مربع یک ماتریس باشد.

$$\text{ذکر: اگر } A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}, \text{ آنگاه داریم:}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ -8 & -3 \end{bmatrix}$$

(هنرسه ۳- ماتریس و کاربردها؛ صفحه‌های ۲۷ تا ۳۱)

(کیوان دارابی)

-۱۱۲

$$A = \begin{bmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & k \end{bmatrix} \Rightarrow A - I = \begin{bmatrix} k-1 & 0 & 0 \\ 0 & k-1 & 0 \\ 0 & 0 & k-1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow |A - I| = |A| - ۱ \Rightarrow (k-1)^3 = k^3 - ۱$$

$$\Rightarrow k^3 - 3k^2 + 3k - 1 = k^3 - ۱ \Rightarrow 3k^2 - 3k - ۶ = ۰$$

$$\Rightarrow k^2 - k - ۲ = ۰ \Rightarrow (k-2)(k+1) = ۰ \Rightarrow k = 2 \text{ یا } k = -1$$

$$|A| = k^3 \Rightarrow |A| = 2^3 = 8 \text{ یا } |A| = (-1)^3 = -1$$

(هنرسه ۳- ماتریس و کاربردها؛ صفحه‌های ۲۷ تا ۳۱)

(کیوان دارابی)

-۱۱۳

اگر ابتدا a را از سطر اول فاکتور گرفته و سپس در ستون اول ضرب کنیم، داریم:

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & b & b^2 \\ c & 0 & c^2 \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & b & b^2 \\ c & 0 & c^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & b & b^2 \\ ac & 0 & c^2 \end{vmatrix}$$

(هنرسه ۳- ماتریس و کاربردها؛ صفحه‌های ۲۷ تا ۳۱)

(شروعین سیاح‌نیا)

-۱۱۹

معادله دایره‌ها را به صورت استاندارد می‌نویسیم:

$$C_1: x^2 + y^2 - 4x - 2y + 1 = 0 \Rightarrow (x-2)^2 + (y-1)^2 = 4$$


$$R_1 = 2, O_1 = (2, 1)$$

$$C_2: x^2 + y^2 - 12x - 2y + 36 = 0 \Rightarrow (x-6)^2 + (y-1)^2 = 1$$

$$R_2 = 1, O_2 = (6, 1)$$

با توجه به شکل، شعاع دایره مطلوب برابر با $\frac{1}{2}$ و مرکز آن نقطه $(\frac{9}{2}, 1)$ می‌باشد. لذا معادله این دایره عبارت است از:

$$(x - \frac{9}{2})^2 + (y - 1)^2 = \frac{1}{4}$$



(هنرسه ۳- آشناي با مقاطع مفروطی؛ صفحه‌های ۳۶ تا ۴۰)


(رضا عباسی اصل)

-۱۲۰

در مثلث $\hat{F} = 60^\circ$, $BOF = 60^\circ$ است و داریم:

$$\tan \hat{F} = \frac{OB}{OF} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{b}{c} \Rightarrow b = \sqrt{3}c$$


$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow a^2 = 3c^2 + c^2 = 4c^2 \Rightarrow \frac{c^2}{a^2} = \frac{1}{4} \Rightarrow e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$$



(هنرسه ۳- آشناي با مقاطع مفروطی؛ صفحه‌های ۴۰ تا ۴۷)

(یاسین سپهر)

-۱۱۷



ابتدا فاصله مرکز دایره تا خط را به دست می‌آوریم:

$$OH = \sqrt{\frac{10+4+11}{4+4}} = \sqrt{\frac{25}{8}} = \frac{5}{2} = 2.5$$

از طرفی عمودی که از مرکز دایره بر یک وتر رسم می‌شود، آن وتر را نصف می‌کند، پس چون طول $AB = 6$ برابر ۶ می‌باشد، $HB = 3$ است.

$$(OB)^2 = (OH)^2 + (HB)^2 \Rightarrow (OB)^2 = 3^2 + 3^2$$

$$\Rightarrow OB = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

(هنرسه ۳- آشناي با مقاطع مفروطی؛ مشابه کار در کلاس صفحه ۳۳)

(کیوان درایی)

-۱۱۸

مرکز یک دایره، محل همسی عمودمنصف‌های همه وترهای آن دایره است.

پس کافی است معادله عمودمنصف‌های دو وتر از میان سه وتر AC , AB و BC را پیدا کرده و با هم تلاقی دهیم تا مرکز دایره پیدا شود. نقاط A و B طول یکسانی دارند، پس معادله عمودمنصف آنها به سادگی پیدا می‌شود.

از طرفی نقاط A و C عرض یکسانی دارند، پس معادله عمودمنصف آنها نیز به سادگی پیدا می‌شود.

$$\begin{cases} A = (1, 2) \\ B = (1, -4) \end{cases} \Rightarrow \text{معادله عمودمنصف} : y = \frac{2 + (-4)}{2} \Rightarrow y = -1$$

$$\begin{cases} A = (1, 2) \\ C = (3, 2) \end{cases} \Rightarrow \text{معادله عمودمنصف} : x = \frac{1+3}{2} \Rightarrow x = 2$$

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases} \xrightarrow{\text{محل تلاقی}} \text{مرکز دایره} : O = (2, -1)$$

$$R = |OA| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{10}$$

بنابراین معادله دایره به صورت زیر است:

$$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 10$$

از بین نقاط داده شده، تنها مختصات نقطه $(5, 0)$ در معادله این دایره صدق می‌کند.

(هنرسه ۳- آشناي با مقاطع مفروطی؛ مشابه تمرين ۵ صفحه ۴۶)



ریاضیات گستره

-۱۲۱

با توجه به آن که $44 = 11 \times 4$ می باشد، پس لزوماً عدد $7a^{32}b$ هم مضرب ۴ و هم مضرب ۱۱ است. داریم:

$$\begin{aligned} 7a^{32}b &= 7a^3 \times 100 + 2b \equiv b \equiv 0 \\ \Rightarrow b &= \{0, 4, 8\} \\ 7a^{32}b &\equiv 0 \Rightarrow b - 2 + 3 - a + 7 \equiv 0 \Rightarrow b - a \equiv -8 \equiv 3 \\ \left\{ \begin{array}{l} b = 0 \Rightarrow -a \equiv -8 \Rightarrow a \equiv 8 \Rightarrow a = 8 \Rightarrow a + b = 8 \\ b = 4 \Rightarrow 4 - a \equiv -8 \Rightarrow a \equiv 12 \equiv 1 \Rightarrow a = 1 \Rightarrow a + b = 5 \\ b = 8 \Rightarrow 8 - a \equiv -8 \Rightarrow a \equiv 16 \equiv 5 \Rightarrow a = 5 \Rightarrow a + b = 13 \end{array} \right. \end{aligned}$$

(ریاضیات گستره - آشنایی با نظریه اعداد؛ صفحه های ۲۲ و ۲۵)

-۱۲۲

شبه را مبدأ و متناظر با صفر در نظر می گیریم. از طرفی از ۱۲ روز قبل تا ۲۳ روز بعد، ۴۰ روز فاصله وجود دارد و باقی مانده ۴ برابر با ۵ است. در نتیجه داریم:

شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سه شنبه	چهارشنبه	پنجشنبه	جمعه
۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶

بنابراین ۲۳ روز بعد، پنجشنبه خواهد بود.

(ریاضیات گستره - آشنایی با نظریه اعداد؛ صفحه ۲۴)

-۱۲۳

اگر عدد مورد نظر را x در نظر بگیریم، آنگاه داریم:

$$\begin{aligned} 11 &+ 11 + 11 + 11 = 4x + 4 \times 11 \Rightarrow 4x \equiv 38 \\ \frac{11}{4} &\Rightarrow x \equiv 11 \Rightarrow x = 11k + 1 \quad (k \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

بزرگترین عدد طبیعی دو رقمی با انتخاب $k = 8$ حاصل می شود. در این صورت داریم:

$$x = 11 \times 8 + 1 = 95$$

(ریاضیات گستره - آشنایی با نظریه اعداد؛ مشابه تمرین ۱۷ صفحه ۳۰)

-۱۲۴

(عباس اسری امیرآبادی)

$$12x + 7y = 1379 \Rightarrow 12x \equiv 1379 \equiv 0 \Rightarrow x = 7k$$

$$\Rightarrow 12 \times 7k + 7y = 1379 \Rightarrow y = 197 - 12k$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 7k > 0 \Rightarrow k \geq 1 \\ 197 - 12k > 0 \Rightarrow k \leq 16 \end{cases}$$

بنابراین $1 \leq k \leq 16$ است، یعنی ۱۶ نقطه با مختصات طبیعی روی این خط وجود دارد.

(ریاضیات گستره - آشنایی با نظریه اعداد؛ صفحه های ۲۶ تا ۳۰)

-۱۲۵

(عزمیله علی‌اصغری)

می توانیم این گراف را گراف کامل (K_9) در نظر بگیریم که ۹ یال آن را برداشته ایم. در گراف K_9 درجه تمام رؤوس برابر ۸ است. اگر این ۹ یال را از یک رأس برداریم، حداقل مقدار ۸ به دست می آید که برابر با ۴ = ۸ - ۴ است. اما اگر این ۴ یال را از ۸ رأس مختلف برداریم،

حداکثر مقدار ۸ به دست می آید که برابر $7 - 8 = -1$ است. پس ۸ مقداری ۷، ۶، ۵ و ۴ را می تواند داشته باشد.

(ریاضیات گستره - گراف و مدل سازی؛ صفحه های ۳۵ و ۳۷)

(امیرحسین ابومهوب) -۱۲۶

هر مسیر از رأس a به رأس b که از یال cd عبور کند، از ۳ بخش (از رأس a به رأس c ، یال cd و از رأس d به رأس b) تشکیل شده است. از رأس a به رأس c ، ۳ مسیر موجود است که در صورت انتخاب هر یک از رأس a به رأس c ، aec مسیرهای ace یا aec است، بنابراین تعداد مسیرهای موجود از رأس a به رأس b شامل یال cd باشند، برابر است با:

$$2 \times 3 + 1 \times 2 = 8$$

(ریاضیات گستره - گراف و مدل سازی؛ صفحه ۳۸)


(همون نوار ائم) -۱۲۷

$$\begin{aligned} q(G) + q(\bar{G}) &= q(K_p) \Rightarrow \frac{4p}{2} + 25 = \frac{p(p-1)}{2} \\ \Rightarrow \frac{p(p-1)}{2} - \frac{4p}{2} &= 25 \Rightarrow p(p-1) - 4p = 50 \\ \Rightarrow p(p-5) &= 50 = 10 \times 5 \Rightarrow p = 10 \end{aligned}$$

(ریاضیات گستره - گراف و مدل سازی؛ صفحه های ۳۵ و ۳۷)

(علیرضا شریف‌فتحی) -۱۲۸

تعداد یال های گراف P_n ، برابر $n - 1$ است، پس مطابق شکل زیر، گراف P_7 دارای ۶ یال است.



تعداد یال های گراف K_7 ، برابر $\frac{7 \times 6}{2} = 21$ است، بنابراین باید ۲۱ - ۶ = ۱۵ یال به این گراف اضافه کرد تا به گراف کامل تبدیل شود.

(ریاضیات گستره - گراف و مدل سازی؛ صفحه های ۳۸ و ۳۹)

(علیرضا شریف‌فتحی) -۱۲۹

مطابق تعریف مجموعه همسایه های باز یک رأس، نمودار گراف مطابق شکل رویه را دارد:

این گراف ۳ دور به طول ۳ دارد که عبارت اند از:

abca, abda, abea

(ریاضیات گستره - گراف و مدل سازی؛ صفحه های ۳۶ و ۳۸)

(علیرضا شریف‌فتحی) -۱۳۰

چون درجه رأس a مساوی ۴ است، پس در هر یک از زیر گراف های موردنظر، رأس a با ۴ یال به رأس b ، c ، d و e متصل است (تمام این زیر گراف ها لزوماً از مرتبه ۵ هستند). در این صورت از ۶ یال باقی مانده در گراف صورت سوال، یکی باید به دلخواه انتخاب شود که در نتیجه ۶ زیر گراف با مشخصات داده شده قابل رسم است.

(ریاضیات گستره - گراف و مدل سازی؛ صفحه های ۳۷ و ۳۸)

$$\begin{cases} \hat{A} = 70^\circ \\ \hat{B} = 50^\circ \end{cases} \Rightarrow \hat{C} = 60^\circ$$

می‌دانیم در یک مثلث، ضلع رویه را به بزرگ‌ترین زاویه، بزرگ‌ترین ضلع است و ضلع رویه را به کوچک‌ترین زاویه، کوچک‌ترین ضلع است. داریم:

$$\hat{B} < \hat{C} < \hat{A} \Rightarrow AC < AB < BC$$

می‌دانیم هر چه وتر بزرگ‌تر باشد، به مرکز دایره نزدیک‌تر است. پس:

$$OQ > OP > OR$$

(هنرسه -۲ - دایره: صفحه ۱۷)

(ممدر فنران)

-۱۳۴

با توجه به روابط طولی در دایره داریم:

$$\begin{cases} MN^2 = MB \times MA \Rightarrow \left(\frac{MN}{PQ}\right)^2 = \frac{3(x+3)}{1(x+1)} \\ PQ^2 = PA \times PB \end{cases}$$

$$\frac{MN^2}{PQ^2} = \frac{3x+9}{x+1} \Rightarrow 4x+4 = 3x+9 \Rightarrow x=5$$

(هنرسه -۲ - دایره: صفحه‌های ۱۸ و ۱۹)

(ممدن مهدکریم)

-۱۳۵

پاره خط AM را رسم می‌کنیم. چون زاویه AMC محاطی رویه را به قطر است، قائمه می‌باشد و چون در مثلث متساوی الساقین، ارتفاع وارد بر قاعده، میانه نظیر قاعده است، پس $BM = MC$ می‌باشد. بنا به روابط طولی داریم:

$$BM \times BC = BN \times BA \Rightarrow x \times (2x) = 2 \times 9 \Rightarrow x = 3 \Rightarrow BC = 6$$

(هنرسه -۲ - دایره: صفحه‌های ۱۸ و ۱۹)


(نویر میدری)

-۱۳۶

از O به C و D وصل می‌کنیم، در این صورت مثلث CD متساوی‌الاضلاع است (طول CD نصف قطر دایره است، پس طول CD = OC = OD است). در نتیجه برابر شعاع دایره می‌باشد، یعنی $CD = OC = OD$ است.

$$\widehat{AC} = \widehat{BD} = \frac{120^\circ}{3} = 60^\circ \quad \text{و} \quad \widehat{C\hat{O}\hat{D}} = 60^\circ$$

نتیجه $\widehat{OAC} = 60^\circ$ است. از طرفی $OA = OC$ است، پس مثلث OAC متساوی‌الاضلاع است و $\widehat{OAC} = 60^\circ$ می‌باشد.



از آنجا که شعاع دایره، بر مماس رسم شده از یک نقطه واقع بر دایره، در

آن نقطه عمود است، پس $\widehat{OBE} = 90^\circ$ و در نتیجه در مثلث ABE،

$$\widehat{E} = 30^\circ$$


است که همان زاویه میان امتداد AC و BE می‌باشد.

(هنرسه -۲ - دایره: صفحه‌های ۱۸، ۱۵ و ۱۶)

۲ هندسه

-۱۳۱

مطابق شکل اگر اندازه دو کمان مشخص را x و y بگیریم، داریم:



$$\begin{cases} \hat{A} = \frac{x+y}{2} = 90^\circ \\ \hat{B} = \frac{x-y}{2} = 3^\circ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x+y = 180^\circ \\ x-y = 60^\circ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 120^\circ \\ y = 60^\circ \end{cases}$$

زاویه α ، زاویه محاطی رویه را به کمان y است، بنابراین:

$$\alpha = \frac{y}{2} = \frac{60^\circ}{2} = 30^\circ$$


(هنرسه -۲ - دایره: صفحه‌های ۱۳ تا ۱۶)

(ممدر فنران)

-۱۳۲

اگر زاویه مرکزی قطاعی از دایرة C(O,R) بر حسب درجه مساوی

$$\text{باشد، طول کمان } AB \text{ برابر } L = \frac{\pi R \alpha}{180^\circ} \text{ و مساحت قطاع برابر } S = \frac{\pi R^2 \alpha}{360^\circ} \text{ است.}$$



بنابراین با توجه به فرض سؤال داریم:

$$\begin{cases} S = \frac{\pi R^2 \times 80^\circ}{360^\circ} \\ S' = \frac{\pi R'^2 \times 20^\circ}{360^\circ} \end{cases} \xrightarrow{S=S'} R^2 \times 80^\circ = R'^2 \times 20^\circ \Rightarrow \frac{R^2}{R'^2} = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{R}{R'} = \frac{1}{2}$$

حال نسبت طول کمان AB به $A'B'$ را بدست می‌آوریم:

$$\frac{L_{AB}}{L_{A'B'}} = \frac{\frac{\pi R \times 80^\circ}{180^\circ}}{\frac{\pi R' \times 20^\circ}{180^\circ}} = \frac{R}{R'} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$$

(هنرسه -۲ - دایره: صفحه ۱۲)

(سید عارف حسینی)

-۱۳۳



$$\Rightarrow \hat{D}\hat{B}C = \hat{B}\hat{D}C = \frac{180^\circ - \alpha}{2}$$

$$\left. \begin{array}{l} \Delta ABD : \hat{A} + \hat{ABD} = \hat{B}\hat{D}C \text{ زاویه خارجی} \\ AB = \frac{\widehat{BD}}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{180^\circ - \alpha}{2} = 39^\circ + \frac{\widehat{BD}}{2}$$

$$\text{از طرفی } \hat{B}\hat{CD} = \frac{\widehat{BD}}{2} \text{ (زاویه محاطی) پس } \alpha = \frac{\widehat{BD}}{2} \text{ در نتیجه:}$$


$$90^\circ - \frac{\alpha}{2} = 39^\circ + \alpha \Rightarrow \frac{3\alpha}{2} = 51^\circ$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{2 \times 51^\circ}{3} = 2 \times 17^\circ = 34^\circ$$

(هنرسه ۲ - دایره: صفحه‌های ۱۳ تا ۱۶)

(امیرحسین ابومیوب)

-۱۴۰



مطابق شکل از مرکز دایره بر دو وتر AB و CD , عمود رسم می‌کنیم.

می‌دانیم قطر عمود بر یک وتر، آن وتر را نصف می‌کند، پس اگر از مرکز

دایره به نقاط A و C وصل کنیم، با فرض $x = OH'$ و $y = OH$ داریم:

$$\Delta OHA : OA^2 = AH^2 + OH^2 \Rightarrow R^2 = x^2 + 25y^2 \quad (1)$$

$$\Delta OH'C : OC^2 = CH'^2 + OH'^2 \Rightarrow R^2 = 9x^2 + y^2 \quad (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow x^2 + 25y^2 = 9x^2 + y^2$$

$$\Rightarrow 8x^2 = 24y^2 \Rightarrow x^2 = 3y^2 \quad (*)$$

با توجه به این که $R = 4\sqrt{7}$ است، داریم:

$$R^2 = x^2 + 25y^2 \xrightarrow{(*)} 112 = 3y^2 + 25y^2 = 28y^2$$

$$\Rightarrow y^2 = 4 \Rightarrow y = 2$$

$$x^2 = 3y^2 = 3 \times 4 \Rightarrow x = 2\sqrt{3} \Rightarrow AB = 4\sqrt{3} \text{ طول وتر}$$

(هنرسه ۲ - دایره: صفحه ۱۳)

(نوید مهیدی)

-۱۳۷

با توجه به شکل، طول OH مورد نظر است، داریم:

$$MT^2 = MA \cdot MB \Rightarrow (4\sqrt{6})^2 = \lambda(\lambda + AB)$$

$$\Rightarrow 192 = \lambda(\lambda + AB) \Rightarrow AB = 4$$


اکنون با توجه به اینکه شعاع عمود بر وتر، آن وتر را نصف می‌کند، می‌توانیم

بنویسیم:

$$OA^2 = OH^2 + (\frac{AB}{2})^2$$

$$\Rightarrow OH = \sqrt{36 - 4} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

(هنرسه ۲ - دایره: صفحه‌های ۱۸ و ۱۹)



(امیرحسین ابومیوب)

-۱۳۸

اگر $AB \parallel CD$ باشد، آنگاه $\hat{AB} = 2x$ است. از طرفی چون $\hat{CD} = x$

پس $\hat{AD} = \hat{BC} = y$ است و داریم:

$$\hat{E} = \hat{BDC} \Rightarrow \frac{\hat{AB} - \hat{CD}}{2} = \frac{\hat{BC}}{2} \Rightarrow \frac{2x - x}{2} = \frac{y}{2} \Rightarrow x = y$$

$$\hat{AB} + \hat{BC} + \hat{CD} + \hat{AD} = 360^\circ \Rightarrow 2x + y + x + y = 360^\circ$$

$$\xrightarrow{x=y} 5x = 360^\circ \Rightarrow x = 72^\circ \Rightarrow y = 72^\circ$$

$$\hat{BCD} = \frac{\hat{AB} + \hat{AD}}{2} = \frac{144^\circ + 72^\circ}{2} = \frac{216^\circ}{2} = 108^\circ$$


(هنرسه ۲ - دایره: صفحه‌های ۱۳ تا ۱۶)

(محمدظاهر شعاعی)

-۱۳۹

می‌دانیم اگر فاصله مرکز دایره از دو وتر برابر باشد، آن‌گاه آن دو وتر

مساوی یکدیگرند.



: شعاع دایره کوچک‌تر $OE = OF \Rightarrow BC = CD$


آمار و احتمال

-۱۴۱

(کیان کریمی فراسانی)

$$\frac{x}{x+2x} = \frac{1}{10} \Rightarrow x = 1$$

$$\frac{2}{10} = 0.2$$

مجموع فراوانی‌های نسبی دو دسته، برابر 0.2 است.

(آمار و احتمال - آمار توصیفی؛ صفحه‌های ۷۱ تا ۷۴)

(ممدر کورزی)

-۱۴۲

$$\frac{f_1}{10} = 0.3 \Rightarrow f_1 = 3$$

با افزودن x_1 و x_2 ، فراوانی جدید داده x_1 برابر 5 می‌شود.


به همین ترتیب:

$$\frac{f_2}{10} = 0.5 \Rightarrow f_2 = 5 \quad \text{با افزودن } x_2 \rightarrow f'_2 = 6$$

$$\frac{f_3}{10} = 0.2 \Rightarrow f_3 = 2 \quad \text{با افزودن } x_2 \text{ و } x_3 \rightarrow f'_3 = 4$$

تعداد داده‌های جدید برابر $10 + 2 + 1 + 2 = 15$ است. پس داریم:

$$\frac{f'_1}{15} = \frac{1}{3}, \frac{f'_2}{15} = \frac{6}{15} = 0.4, \frac{f'_3}{15} = \frac{4}{15}$$



(آمار و احتمال - آمار توصیفی؛ صفحه‌های ۷۱ تا ۷۴)

(روح اکنیزی بلبلیان)

-۱۴۵

ابتدا میانگین را محاسبه می‌کنیم:

$$\bar{x} = 0 / 25 \times 2 + 0 / 4 \times 3 + 4 \times 0 / 2 + 5 \times 0 / 15 = 3 / 25$$

مد نیز داده‌ای است که بیشترین فراوانی را دارد. بنابراین 3 ، مد داده‌ها است. $25 / 0$ داده‌ها یعنی 5 داده برابر 2 و $0 / 0$. آنها یعنی 8 داده برابر 3 است.بنابراین داده‌های دهم و یازدهم، هر دو برابر 3 هستند و در نتیجه میانگینآنها که همان عدد 3 است، میانه داده‌ها می‌باشد.

(آمار و احتمال - آمار توصیفی؛ صفحه‌های ۷۱ تا ۷۴)

آمار و احتمال

(کیان کریمی فراسانی)

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_{11}}{11} = 21 \xrightarrow{x_1=18, x_2=20} 38 + x_3 + \dots + x_{11}$$

$$= 21 \times 11 = 231 \Rightarrow x_3 + \dots + x_{11} = 193$$

میانگین سن دو فرد جدید را \bar{y} می‌گیریم. در این صورت حاصل جمع سنآنها $2\bar{y}$ است. پس:

$$\bar{x} = 23 \Rightarrow \frac{2\bar{y} + x_3 + \dots + x_{11}}{11} = \frac{2\bar{y} + 193}{11} = 23$$

$$\Rightarrow 2\bar{y} + 193 = 253 \Rightarrow 2\bar{y} = 60 \Rightarrow \bar{y} = 30$$

(آمار و احتمال - آمار توصیفی؛ صفحه‌های ۷۱ تا ۷۴)

-۱۴۲

(روح اکنیزی بلبلیان)

$$\bar{x} = 10 \Rightarrow \frac{2 \times 5 + 3(x+3) + 11x + 2 \times 1}{2+3+x+1} = 10$$

$$\Rightarrow \frac{14x + 44}{6+x} = 10 \Rightarrow 4x = 16 \Rightarrow x = 4$$

$$\frac{x}{6+x} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} \quad \text{بنابراین داریم:}$$

(آمار و احتمال - آمار توصیفی؛ صفحه‌های ۷۱ تا ۷۴)

-۱۴۳

(کیان کریمی فراسانی)

بزرگ‌ترین زاویه مرکزی، مربوط به داده با فراوانی 1 یا با فراوانی 3

است. پس داریم:

حالت اول: بیشترین فراوانی برابر 1 باشد.

$$\frac{x+1}{8+2x} = \frac{108^\circ}{360^\circ} = \frac{3}{10} \Rightarrow 24 + 6x = 10x + 10 \Rightarrow x = 3 / 5$$

که قابل قبول نیست زیرا فراوانی‌ها اعدادی طبیعی‌اند.

حالت دوم: بیشترین فراوانی برابر 3 باشد.

$$\frac{3}{8+2x} = \frac{3}{10} \Rightarrow x = 1$$

بنابراین مجموع فراوانی‌ها برابر 10 است و داریم:

(مسعود فردانی)

-۱۴۹

ابتدا میانگین داده‌های $x_1 + 1 + 2x_2 + \dots + 2x_{14}$ که برابر $2\bar{x} + 1$ است را از جدول به دست

$$2\bar{x} + 1 = \frac{6 + 5 + 21 + 54 + 22}{14} = \frac{54}{7} \Rightarrow \bar{x} = \frac{47}{14} \quad \text{می‌آوریم:}$$

از طرفی در داده‌های $x_1 + 1, 2x_2, \dots, 2x_{14}$ مد برابر ۹ است. پس در داده‌های x_i ، مد

برابر است با:

$$2x + 1 = 9 \Rightarrow x = 4$$

پس اختلاف مد و میانگین برابر است با:

$$4 - \frac{47}{14} = \frac{56}{14} - \frac{47}{14} = \frac{9}{14}$$

(آمار و احتمال - آمار توصیفی: صفحه‌های ۸۴ تا ۹۱)

(امیرحسین ابومحبوب)

-۱۵۰

داده‌ها یک دنباله حسابی تشکیل می‌دهند. داریم:

$$a_n = a_1 + (n-1)d \Rightarrow a + 3a = a + 1 + (n-1) \times 3$$

$$\Rightarrow 3a = 3(n-1) \Rightarrow n-1 = 10 \Rightarrow n = 11$$

تعداد داده‌ها برابر ۱۱ است (عددی فرد است)، بنابراین داده ششم (داده

وسط) میانه داده‌ها است. میانه ۵ داده اول یعنی داده سوم، چارک اول و میانه

۵ داده آخر یعنی داده نهم، چارک سوم است. بنابراین $a + 7 = Q_1$ و

$$Q_3 = a + 25 \quad \text{است و داریم:}$$

$$a + 25 = 3(a + 7) \Rightarrow a + 25 = 3a + 21 \Rightarrow 2a = 4 \Rightarrow a = 2$$

در نتیجه میانه داده‌ها برابر است با:

$$Q_2 = a + 16 \xrightarrow{a=2} Q_2 = 18$$

(آمار و احتمال - آمار توصیفی: صفحه‌های ۸۷ و ۸۸)

(آرش رضیمی)

-۱۴۶

اگر از داده‌های آماری مقداری کم کنیم، از مدنیز آن عدد کم می‌شود.

(آمار و احتمال - آمار توصیفی: صفحه‌های ۸۴ تا ۹۱)

(محمد کوثری)

-۱۴۷

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = 26 \Rightarrow x_1 + x_2 + \dots + x_n = 26n$$

فرض کنیم x_1 کوچک‌ترین و x_n بزرگ‌ترین داده باشد. در این صورت:

$$\frac{(x_n - x_1) + x_2 + \dots + x_{n-1}}{n-1} = 24 \Rightarrow \frac{26n - 2x_1}{n-1} = 24$$

$$\Rightarrow 26n - 2x_1 = 24n - 24 \Rightarrow 2x_1 = 2n + 24 \Rightarrow x_1 = n + 12$$

$$x_1 = \frac{x_1}{2} + 12 \Rightarrow \frac{x_1}{2} = 12 \Rightarrow x_1 = 24 \quad \text{از طرفی } n = \frac{x_1}{2} \text{ . بنابراین:}$$

(آمار و احتمال - آمار توصیفی: صفحه‌های ۸۴ تا ۹۱)

(میلاد منصوری)

-۱۴۸

$$\frac{3a + 3a + 3b + 3b}{4} = \frac{3(2a + 2b)}{4} = \frac{3(a+b)}{2} = 18 \quad \text{میانگین محیطها}$$

$$\Rightarrow a + b = 12$$

$$\frac{1}{4} \left(\sqrt{3} a^2 + \sqrt{3} a^2 + \sqrt{3} b^2 + \sqrt{3} b^2 \right) = 10\sqrt{3} \quad \text{میانگین مساحتها}$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 = 80$$

$$\begin{cases} a + b = 12 \\ a^2 + b^2 = 80 \end{cases} \xrightarrow{b=12-a} a^2 + (12-a)^2 = 80 \quad \text{بنابراین:}$$

$$\Rightarrow a^2 - 12a + 144 = 80 \Rightarrow (a-12)(a-4) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 12 \Rightarrow b = 4 \\ a = 4 \Rightarrow b = 12 \end{cases}$$

چون $a > b$ است، پس مقدار $a = 12$ قابل قبول می‌باشد.

(آمار و احتمال - آمار توصیفی: صفحه‌های ۸۴ تا ۹۱)



(بینا فوشید)

-۱۵۳

از طرف آب به وزنه نیروی شناوری رو به بالا وارد می‌شود. در هر حالت

قانون دوم نیوتون را برای مجموعه می‌نویسیم. داریم:

حالت اول:

$$F_{\text{net}} = 0 \Rightarrow mg = kx_0 \Rightarrow mg = kx_0 / \Delta x_0.$$

حالت دوم:

$$F_{\text{net}} = 0 \Rightarrow mg - F_b = kx' \Rightarrow mg - F_b = kx_0 / \Delta x_0.$$

بنابراین:

$$\frac{mg}{mg - F_b} = \frac{kx_0 / \Delta x_0}{kx_0 / \Delta x_0}$$

$$\Rightarrow 2mg = \Delta mg - \Delta F_b \Rightarrow \frac{F_b}{mg} = \frac{2}{5} = 40\%$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای: صفحه‌های ۳۴ و ۳۵)

(میثم (شتیان))

-۱۵۴

در حالت اول که آسانسور از حال سکون و به طرف بالا شروع به حرکت می‌کند، داریم:

$$\begin{aligned} \Delta x_1 &= \frac{1}{2} a_1 t^2 + v_{01} t \Rightarrow 16 = \frac{1}{2} a_1 \times 4^2 + 0 \Rightarrow a_1 = 2 \frac{m}{s^2} \\ (F_{\text{net}})_1 &= ma_1 \Rightarrow T_1 - mg = ma_1 \\ \Rightarrow T_1 &= m(10 + 2) \Rightarrow T_1 = 12m \quad (\text{N}) \end{aligned}$$

در حالت دوم که آسانسور به سمت بالا و حرکت کنندشونده دارد، شتاب به طرف پایین است و داریم:

$$\begin{aligned} v_{02} &= a_1 t + v_{01} = 2 \times 4 + 0 \Rightarrow v_{02} = 8 \frac{m}{s} \\ v_2 - v_{02} &= 2a_2 \Delta x_2 \Rightarrow 0 - 8 = 2a_2 \times 4 \Rightarrow a_2 = -4 \frac{m}{s^2} \\ (F_{\text{net}})_2 &= ma_2 \Rightarrow T_2 - mg = ma_2 \\ \Rightarrow T_2 &= m(10 - 4) \Rightarrow T_2 = 6m \quad (\text{N}) \end{aligned}$$

از رابطه‌های (۱) و (۲) داریم:


$$T_1 - T_2 = 30 \Rightarrow 12m - 6m = 30 \Rightarrow m = 5\text{kg}$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای: صفحه‌های ۳۴ و ۳۵)

فیزیک ۳

(عبدالرضا امینی نسب)

-۱۵۱



با استفاده از قانون دوم نیوتون داریم:

$$(F_{\text{net}})_y = ma_y = 0 \Rightarrow F_N = mg$$

$$(F_{\text{net}})_x = ma_x \Rightarrow -f_k = ma_x \Rightarrow -\mu_k F_N = ma_x$$

$$\Rightarrow -\mu_k mg = ma_x \Rightarrow a_x = -\mu_k g$$

از طرفی با استفاده از معادله سرعت - جایه‌جایی، مسافتی که جسم طی

می‌کند تا بایستد، برابر است با:

$$v^2 - v_0^2 = 2a_x \Delta x \Rightarrow 0 - v_0^2 = 2(-\mu_k g) \Delta x \Rightarrow \Delta x = \frac{v_0^2}{2\mu_k g}$$

بنابراین داریم:

$$\frac{\Delta x_B}{\Delta x_A} = \left(\frac{v_{0B}}{v_{0A}} \right)^2 \times \frac{(\mu_k)_A}{(\mu_k)_B}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta x_A}{\Delta x_B} = \left(\frac{10}{20} \right)^2 \times \frac{(\mu_k)_B}{(\mu_k)_A} = \frac{(\mu_k)_B}{(\mu_k)_A} = 2$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای: صفحه‌های ۳۴ تا ۳۷)

(عبدالرضا امینی نسب)

-۱۵۲

وقتی جسم در آستانه حرکت رو به پایین قرار دارد، نیروی اصطکاک ایستایی

بیشینه به طرف بالا بر جسم وارد می‌شود و داریم:

$$(F_{\text{net}})_x = 0 \Rightarrow F_N = F \quad (*)$$

$$(F_{\text{net}})_y = 0 \Rightarrow F + f_{s,\text{max}} = W$$

$$\Rightarrow F + \mu_s F_N = mg$$

$$\stackrel{(*)}{\Rightarrow} F + \mu_s F = mg \Rightarrow F = \frac{mg}{1 + \mu_s}$$

$$\Rightarrow F = \frac{2 \times 10}{1 + 0.5} \Rightarrow F = \frac{40}{3} \text{N}$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای، صفحه‌های ۳۷ تا ۳۹)



(سید ابوالفضل قالقی)

-۱۵۷

با دوران میله حول نقطه O به طور یکنواخت، دوران جرم‌های m_1 و m_2 یکسان است. با استفاده از رابطه قانون دوم نیوتون در حرکت دایره‌ای یکنواخت، داریم:

$$F_{net} = m \frac{v^2}{r} \xrightarrow{v=\frac{\pi r}{T}} F_{net} = 4\pi^2 \frac{mr}{T^2}$$

$$\Rightarrow \frac{(F_{net})_2}{(F_{net})_1} = \frac{m_2}{m_1} \times \frac{r_2}{r_1} \times \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 = 1$$

$$\xrightarrow{T_1=T_2} \frac{(F_{net})_2}{(F_{net})_1} = \frac{m_2}{m_1} \times \frac{L}{L} \times 1^2 = 1$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای: صفحه‌های ۳۶ تا ۴۱) (۵۳)


(مفهوم کیانی)

-۱۵۸

بنابراین $p = mv$ برای محاسبه اندازه تکانه در لحظه $t = 6s$ باید سرعت در این لحظه را بدست آوریم. چون شتاب حرکت ثابت نیست، کافیست مساحت سطح محصور بین نمودار شتاب - زمان و محور زمان که برابر با Δv است را محاسبه کرده و سپس از رابطه $\Delta v = v - v_0$ سرعت را حساب کنیم.

$$\Delta v = S_1 + S_2 = \frac{-2 \times 2}{2} + \frac{(6-2) \times 2}{2} \Rightarrow \Delta v = -2 + 4 = 2 \frac{m}{s}$$

$$\Delta v = v - v_0 \xrightarrow{\frac{v_0=4 \frac{m}{s}}{\Delta v=2 \frac{m}{s}}} 2 = v - 4 \Rightarrow v = 6 \frac{m}{s}$$



حال اندازه تکانه را حساب می‌کنیم.

$$p = mv \xrightarrow{\frac{m=1kg}{v=6 \frac{m}{s}}} p = 2 \times 6 = 12 \frac{kg.m}{s}$$


(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای: صفحه‌های ۳۶ تا ۴۱) (۵۳)

(مفهوم کیانی)

-۱۵۸

با توجه به شکل، چون جسم در آستانه لغزش قرار دارد، $f_{s,max} = mg$ است. از طرف دیگر، $f_{s,max} = \mu_s F_N$ است. با توجه به این که در اینجا F_N برابر با نیروی مرکزگراست، ابتدا تندی را حساب می‌کنیم.

$$v = \frac{2\pi r}{T} \xrightarrow{r=2m, \pi=3, T=4s} v = \frac{2 \times 3 \times 2}{4} = 3 \frac{m}{s}$$



برای محاسبه ضریب اصطکاک ایستایی می‌توان گفت:

$$f_{s,max} = mg \xrightarrow{f_{s,max}=\mu_s F_N} \mu_s \times m \frac{v^2}{r} = mg \Rightarrow \mu_s \times \frac{25}{2} = 10 \xrightarrow{F_N=m \frac{v^2}{r}} \mu_s = 0.8$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای، صفحه‌های ۳۷ تا ۴۶ و ۵۳) (۵۳)

(پیتا فورشیر)

-۱۵۹

نیروی مرکزگرای وارد بر هر ماهواره توسط نیروی گرانشی تأمین می‌شود. داریم:

$$F_{net} = m \frac{v^2}{r} \Rightarrow G \frac{M_e m}{r^2} = m \frac{v^2}{r} \Rightarrow rv^2 = GM_e = \text{ثابت}$$

$$\Rightarrow r_A v_A^2 = r_B v_B^2 \xrightarrow{r_A=r_B} v_A = v_B$$

$$\Rightarrow \frac{v_B}{v_A} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

از طرفی با توجه به برابر بودن اندازه تکانه دو ماهواره داریم:

$$p_A = p_B \Rightarrow m_A v_A = m_B v_B \Rightarrow \frac{m_B}{m_A} = \frac{v_A}{v_B} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$


(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای، صفحه‌های ۳۷ تا ۴۶ و ۵۳) (۵۳)

(سعید شرق)

-۱۵۶

در حالت اول سرعت ثابت است و بنابراین طبق قانون دوم نیوتون داریم:


$$F_{net} = 0 \Rightarrow F - f_k = 0 \Rightarrow F = \mu_k mg = 0 / 2 \times 2 \times 10 = 4N$$



در حالت دوم که جسم در حال دوران یکنواخت است، نیروی کشش فرنر،

نیروی مرکزگرای لازم را تأمین می‌کند. بنابراین داریم:

$$F_{net} = m \frac{v^2}{r} \Rightarrow 4 = 2 \frac{v^2}{2} \Rightarrow v = 2 \frac{m}{s}$$



(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای، صفحه‌های ۳۷ تا ۴۶ و ۵۳) (۵۳)



$$\Rightarrow \cos\left(0 / 4\omega\right) = -\frac{1}{2} \Rightarrow 0 / 4\omega = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow \omega = \frac{5\pi}{3} \text{ rad/s}$$

حال بیشینه تندی نوسانگر را محاسبه می‌کنیم. داریم:

$$v_{\max} = A\omega = 2 \times 10^{-2} \times \frac{5\pi}{3} \Rightarrow v_{\max} = \frac{\pi}{30} \text{ m/s}$$

در حرکت هماهنگ ساده، تندی زمانی بیشینه می‌شود که نوسانگر از مبدأ نوسان عبور کند و این اتفاق برای دومین بار در لحظه $t = \frac{3}{4}T$ رخ می‌دهد.

داریم:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \frac{5\pi}{3} = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = 1/2s$$

$$t = \frac{3}{4}T \xrightarrow{T=1/2s} t = \frac{3}{4} \times 1/2 = 0.75s$$

(فیزیک ۳- نوسان و موج: صفحه‌های ۶۲ تا ۶۷)

(میثم (شتیان))

-۱۶۳


کمترین طول فنر هنگامی است که نوسانگر در $x = -A$ و بیشترین طول فنر هنگامی است که نوسانگر در $x = +A$ قرار می‌گیرد. اختلاف این دو مقدار معادل $2A$ است، پس:

$$2A = 55 - 15 = 40 \Rightarrow A = 20\text{cm}$$

همچنین وسط این دو حالت، نقطه تعادل (طول آزاد فنر با مبدأ مختصات) است، پس:

$$\frac{55 + 15}{2} = 35\text{cm}$$

هنگامی که طول فنر 45cm است، یعنی نسبت به حالت آزاد خود (مبدأ مختصات) 10cm کشیده‌تر شده (حالت (A)) و همچنین هنگامی که طول فنر 25cm است، یعنی نسبت به حالت آزاد خود 10cm فشرده‌تر شده است (حالت (B)).



اگر معادله مکان - زمان وزنه را بنویسیم، داریم:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{320}{2}} = \sqrt{160} = \sqrt{16\pi^2} \Rightarrow \omega = 4\pi \text{ rad/s}$$

$$x = A \cos(\omega t)$$

$$\xrightarrow{x_1=0/1m} 0 / 1 = 0 / 2 \cos(4\pi t) \Rightarrow \cos(4\pi t) = \frac{1}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$\Rightarrow t_1 = \frac{1}{12}s$$

$$\xrightarrow{x_2=-0/1m} -0 / 1 = 0 / 2 \cos(4\pi t)$$

$$\Rightarrow \cos(4\pi t) = -\frac{1}{2} = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) \Rightarrow t_2 = \frac{1}{6}s$$

کمترین زمان حرکت از نقطه $x_1 = 10\text{cm}$ تا $x_2 = -10\text{cm}$ معادل با

$$\frac{1}{12}s - \frac{1}{6}s$$

(فیزیک ۳- نوسان و موج: صفحه‌های ۶۲ تا ۶۷)

(میثم (شتیان))

-۱۶۴

چون ماهواره در حال تعادل است، اندازه نیروهای گرانشی وارد بر آن از طرف سیاره‌های A و B با هم برابر است. داریم:

$$F_A = F_B \Rightarrow G \frac{mM_A}{R_A^2} = G \frac{mM_B}{R_B^2}$$

$$\frac{M_A = 1/69 M_B}{R_A^2} \xrightarrow{1/69 M_B = M_B} \frac{1/69 M_B}{R_B^2} = \frac{M_B}{R_B^2} \Rightarrow R_A = 1/3 R_B \quad (1)$$

از طرفی داریم:

$$R_A + R_B = 4600 \quad (2)$$

با حل هم‌زمان دو معادله (1) و (2) داریم:

$$1/3 R_B + R_B = 4600 \Rightarrow R_B = 2000\text{km}$$

$$R_A = 1/3 R_B = 2600\text{km}$$

در نتیجه:


$$|R_A - R_B| = 2600 - 2000 = 600\text{km}$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت (ایرها): صفحه‌های ۵۳ تا ۵۶)

(بیتا فورریش)

-۱۶۵

مسافت طی شده توسط نوسانگر در بازه زمانی t_1 تا t_2 برابر است با:



$$d = |\Delta x_1| + |\Delta x_2|$$

$$d = |-20 - 10| + |10 + 20| = 30 + 10 = 40\text{cm} = 0.4\text{m}$$

حال با استفاده از نمودار، معادله مکان - زمان نوسانگر را محاسبه می‌کنیم.

$$\frac{3T}{4} = 0 / 3 \Rightarrow T = 0 / 4s \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{0 / 4} = 5\pi \text{ rad/s}$$

$$x = A \cos(\omega t) \Rightarrow x = 0 / 2 \cos(5\pi t)$$

سپس زمان‌های t_1 و t_2 را محاسبه می‌کنیم:

$$10 = 0 \cos 5\pi t_1 \Rightarrow 5\pi t_1 = \frac{\pi}{3} \Rightarrow t_1 = \frac{1}{15}s$$

$$-20 = 0 \cos 5\pi t_2 \Rightarrow 5\pi t_2 = \frac{4\pi}{3} \Rightarrow t_2 = \frac{4}{15}s$$

در نهایت با استفاده از تعریف تندی متوسط، داریم:

$$s = \frac{d}{\Delta t} = \frac{0 / 4}{\frac{4}{15} - \frac{1}{15}} = 2 \frac{m}{s}$$

(فیزیک ۳- نوسان و موج: صفحه‌های ۶۲ تا ۶۷)

(ممدر پورنیا)

-۱۶۶

ابتدا با استفاده از معادله مکان - زمان، بسامد زاویه‌ای را محاسبه می‌کنیم.

$$x = A \cos(\omega t) \xrightarrow{A=2cm, t=0/4s, x=-1cm} -1 = 2 \cos(0 / 4\omega)$$



حساب می کنیم.

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} T_1 = 3s \Rightarrow 3 = 2\pi \sqrt{\frac{L_1}{g}} \Rightarrow 9 = 4\pi^2 \times \frac{L_1}{g} \Rightarrow L_1 = 2 / 25m \\ T_2 = 4s \Rightarrow 4 = 2\pi \sqrt{\frac{L_2}{g}} \Rightarrow 16 = 4\pi^2 \times \frac{L_2}{g} \Rightarrow L_2 = 4m \end{cases}$$

مجموع طول دو آونگ را به دست آورده و دوره آونگ جدید را حساب می کنیم.

$$L = L_1 + L_2 = 2 / 25 + 4 \Rightarrow L = 6 / 25m$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{6 / 25}{g}} \Rightarrow T^2 = 4\pi^2 \times \frac{6 / 25}{g}$$

$$\Rightarrow T^2 = 25 \Rightarrow T = 5s$$

روش دوم: اگر دو آونگ به طول های L_1 و L_2 و دوره های تناوب T_1 و T_2 داشته باشیم و آونگی به طول $(L_1 + L_2)$ درست کنیم، دوره تناوب آن از رابطه زیر به دست می آید:

$$T = \sqrt{T_1^2 + T_2^2} = \frac{T_1 = 3s}{T_2 = 4s} \Rightarrow T = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} \Rightarrow T = 5s$$

سعی کنید رابطه فوق را اثبات کنید و آن را به خاطر بسپارید.

(فیزیک ۳- نوسان و موج: صفحه های ۶۷ و ۶۸)

(بینا فورشید)

-۱۶۷

ابتدا با استفاده از نقش موج، طول موج و سپس دوره تناوب آن را محاسبه می کنیم:


$$\frac{3\lambda}{2} = 6 \Rightarrow \lambda = 4m$$

$$v = \frac{\lambda}{T} \Rightarrow 2 = \frac{4}{T} \Rightarrow T = 2s$$

مسافت طی شده توسط موج در بازه زمانی صفر تا ۱/۵s برابر است با:

$$L = v\Delta t = 2 \times 1 / 5 \Rightarrow L = 3m$$

با توجه به جهت حرکت موج و دوره آن، در مدت ۱/۵ ثانیه، نقطه M ابتداء به $-8cm$ رفته، سپس به نقطه تعادل بر می گردد و در نهایت به نقطه ابتداء $+8cm$ رسید. بنابراین جایه جایی آن برابر با $\Delta x = A$ است.



$$\Delta x = A = 8cm = 8 \times 10^{-2} m$$

در نتیجه:

$$\frac{\Delta x}{L} = \frac{8 \times 10^{-2}}{3} = \frac{2}{75}$$


(فیزیک ۳- نوسان و موج: صفحه های ۶۷ تا ۶۸)

(مختصی کیانی)

-۱۶۴

برای محاسبه معادله حرکت باید در رابطه $x = A \cos(\omega t)$ به جای A و ω مقدار هر یک را قرار دهیم. بنابراین ابتدا از رابطه $E = U + K$ انرژی مکانیکی را به دست می آوریم:

$$E = U + K = \frac{U = ۰ / ۰.۸ J}{K = ۰ / ۲۴ J} \Rightarrow E = ۰ / ۰.۸ + ۰ / ۲۴ \Rightarrow E = ۰ / ۳۲ J$$



سپس با استفاده از رابطه $E = ۲\pi^2 m f^2 A^2$ دامنه نوسان را حساب می کنیم.

$$E = ۲\pi^2 m f^2 A^2$$

$$\frac{m = ۱۰ g = ۱ / ۱ kg}{\pi^2 = ۱, f = ۲ Hz} \Rightarrow ۳۲ \times ۱ \times ۱0^{-۲} = ۲ \times ۱0 \times ۰ / ۱ \times ۴ \times A^2$$

$$\Rightarrow A^2 = ۴ \times ۱0^{-۲} m \Rightarrow A = ۲ \times ۱0^{-۱} m \Rightarrow A = ۰ / ۲ m$$

در نهایت ω را حساب می کنیم و معادله حرکت را می نویسیم:

$$\omega = ۲\pi f = ۲\pi \times ۲ \Rightarrow \omega = ۴\pi \frac{rad}{s}$$

$$x = A \cos(\omega t) \Rightarrow x = ۰ / ۲ \cos(4\pi t)$$

(فیزیک ۳- نوسان و موج: صفحه های ۶۶ و ۶۷)

(میثم شتیان)

-۱۶۵

$$U_{max} = E = ۳ / ۴ J$$

با توجه به نمودار می توان نوشت: هنگامی که جسم در مکان $x = +2cm$ قرار دارد، انرژی پتانسیل آن $۰ / ۲ J$ می باشد، پس:

$$E = K + U \Rightarrow ۳ / ۴ = K + ۰ / ۲ \Rightarrow K = ۳ / ۲ J$$

$$K = \frac{1}{2} mv^2 \Rightarrow ۳۲ \times ۱ \times ۱0^{-۱} = \frac{1}{2} \times ۴ \times ۱0^{-۱} v^2 \Rightarrow v^2 = ۱۶ \Rightarrow |v| = ۴ \frac{m}{s}$$

طبق نمودار در این لحظه، نوسانگر در مکان های مثبت قرار دارد و چون بزرگی سرعت آن در این لحظه در حال کاهش است، پس حرکت آن کند شونده بوده و نوسانگر در حال دور شدن از مبدأ مختصات می باشد، پس حرکت آن در جهت محور بوده > ۰ است. بنابراین سرعت نوسانگر


معادل $\frac{m}{s} + ۴$ است.

(فیزیک ۳- نوسان و موج: صفحه های ۶۷ تا ۶۸)

(مختصی کیانی)

-۱۶۶

روش اول: با استفاده از رابطه دوره تناوب آونگ ساده، طول های L_1 و L_2 را



(فیزیک ۳- نوسان و موج: صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴)

(سیدعلی میرنوری)

-۱۶۹

با استفاده از رابطه تندی انتشار امواج عرضی در تار مرتعش داریم:

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \Rightarrow \frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{F_2}{F_1}} - \frac{F_2 = 144 F_1}{v_1} \Rightarrow \frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{144}{100}} = 1/2$$

$$\frac{v_1 = 100 \text{ m}}{\text{s}} \Rightarrow v_2 = 120 \text{ m/s}$$

$$\Delta v = v_2 - v_1 = 120 - 100 = 20 \text{ m/s}$$

(فیزیک ۳- نوسان و موج: صفحه ۷۳)

(بینا فورشید)

-۱۷۰

با استفاده از رابطه تندی امواج عرضی در ریسمان کشیده، داریم:

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \Rightarrow \frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{\mu_1}{\mu_2}} \Rightarrow \frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{1}{4}} \Rightarrow \frac{v_2}{v_1} = \frac{1}{2}$$

از طرفی امواج عرضی با تندی ثابت در طول هر ریسمان منتشر می‌شوند.

بنابراین داریم:

$$v = \frac{L}{t} \Rightarrow \frac{v_2}{v_1} = \frac{L_2}{L_1} \times \frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}$$

$$\frac{\Delta t_1 = \Delta t_2}{\Delta t_1} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{L_2}{L_1} \Rightarrow L_2 = \frac{1}{2} L_1 \quad (*)$$

از طرفی داریم:

$$L_1 + L_2 = 6 \xrightarrow{(*)} L_1 + \frac{1}{2} L_1 = 6 \Rightarrow L_1 = 4 \text{ m}$$

(فیزیک ۳- نوسان و موج: صفحه ۷۳)

(مختصات کیانی)

-۱۶۸

دوره تناوب را به دست می‌آوریم، با توجه به شکل $\frac{\lambda}{2} = 5 \text{ cm}$ است. چونتندی موج $\frac{m}{s}$ است، می‌توان گفت:

$$\frac{\lambda}{2} = 5 \text{ cm} \Rightarrow \lambda = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$$

$$\lambda = vT \xrightarrow{v=20 \frac{\text{m}}{\text{s}}} 0.1 = 20T \Rightarrow T = \frac{1}{200} \text{ s}$$

چون دوره تناوب $\frac{1}{200} \text{ s}$ است، $\frac{1}{400} \text{ s}$ بعد از این لحظه (یعنی بعد از $\frac{T}{2}$)

ذره M که در نقطه تعادل قرار دارد، مجدداً به نقطه تعادل می‌رسد. بنابراین

در این لحظه تندی آن بیشینه است و از رابطه $v_{\max} = A\omega$ به دست می‌آید.

$$v_{\max} = A\omega \xrightarrow{\omega = \frac{2\pi}{T}} v_{\max} = A \times \frac{2\pi}{T} \xrightarrow{A=0.05 \text{ m}, T=\frac{1}{200} \text{ s}} v_{\max} = 0.05 \times \frac{2\pi}{\frac{1}{200}} \text{ m/s}$$



$$v_{\max} = 0.05 \times 0.05 \times \frac{2\pi}{\frac{1}{200}} \text{ m/s}$$

با توجه به جهت حرکت موج در لحظه نشان داده شده، ذره M از نقطه

تعادل در جهت +y حرکت می‌کند. بعد از نصف دوره تناوب، این ذره

دوباره به نقطه تعادل می‌رسد و در جهت -y حرکت می‌کند، این موضوع را

بهوضوح در شکل‌های زیر مشاهده می‌کنید.






(میلاد نقوی)

-۱۷۳

با توجه به شکل، طول ضلع سوم مثلث را بدست می‌آوریم:

$$r_{23} = \sqrt{(1/5)^2 - (0/9)^2} = 1/2\text{m}$$

$$\begin{cases} \cos \alpha_1 = \frac{h}{0/9} \\ \cos \alpha_2 = \frac{h}{1/2} \end{cases}, \quad \begin{cases} \cos \alpha_1 = \frac{F_{13}}{F} \\ \cos \alpha_2 = \frac{F_{23}}{F} \end{cases}$$



$$\Rightarrow \frac{h}{0/9} = \frac{F_{13}}{F} \Rightarrow \frac{1/2}{0/9} = \frac{F_{13}}{F_{23}} \Rightarrow \frac{F_{13}}{F_{23}} = \frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{F_{13}}{12} = \frac{4}{3} \Rightarrow F_{13} = 16\text{N}$$

$$\Rightarrow F = \sqrt{(F_{13})^2 + (F_{23})^2} = \sqrt{(16)^2 + (12)^2} = 20\text{N}$$

(فیزیک ۲ - الکتریسیته ساکن: صفحه‌های ۵ تا ۱۰)

(مصطفی کیانی)

-۱۷۴

ابتدا نیروهای وارد بر گلوله A را رسم و اندازه هر یک را محاسبه می‌کنیم.
بر گلوله A نیروی دافعه الکتریکی رو به بالا و نیروی وزن رو به پایین وارد
می‌شود.

$$F = k \frac{|q_A||q_B|}{r^2} \quad r = 3\text{cm} = 3 \times 10^{-2}\text{m}$$

$$F = \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^{-6}}{9 \times 10^{-4}} \Rightarrow F = 0/4\text{N}$$

سپس با استفاده از قانون دوم نیوتون به صورت زیر جرم گلوله A را حساب

$$\begin{aligned} & \text{می‌کنیم.} \\ & \text{F}_{\text{net}} = ma \Rightarrow F - mg = ma \quad F = 0/4\text{N} \\ & 0/4 - m \times 10 = m \times 30 \Rightarrow 0/4 = 30m \\ & \Rightarrow m = \frac{0/4}{30} = 0/01\text{kg} = 10\text{g} \end{aligned}$$

(فیزیک ۲ - الکتریسیته ساکن: صفحه‌های ۵ تا ۱۰)

(میثم (شیان))

-۱۷۵

در شکل، مؤلفه‌های میدان الکتریکی برایند رسم شده است. اگر فرض کنیم
بار q_3 در نقطه A قرار داشته باشد، با توجه به محل قرارگیری سه بار و
هم چنین با توجه به اینکه بردار برایند همواره بین دو بردار قرار دارد،
می‌توان نتیجه گرفت مؤلفه E_y ناشی از برایند میدان‌های \bar{E}_1 و \bar{E}_2 و
مؤلفه E_x ناشی از میدان \bar{E}_3 بوده است. چون E_y باید بین \bar{E}_1 و \bar{E}_2 باشد،
جهت این دو میدان به صورت نسبایش داده شده در شکل خواهد بود. در
نتیجه بار q_1 منفی و بار q_2 مثبت و این دو بار ناهمان بوده‌اند.

فیزیک ۲

-۱۷۱

(مصطفی کیانی)

چون کره‌ها رسانا و مشابه‌اند، بعد از هر اتصال، بار دو کره‌ای که به هم متصل
می‌شوند همان‌اندازه، هم نوع و برابر با میانگین بارهایی است که قبل از تماس با
هم داشته‌اند. یعنی $q'_1 + q'_2 = q'_1 = q'_2 = \frac{q_1 + q_2}{2}$ است. در این رابطه بارها را با قید
علمات جایگذاری می‌کنیم.

گام اول: وقتی کلید k_1 را می‌بندیم، کره A را با کره B تماس می‌دهیم. در
این حالت داریم:

$$q'_A = q'_B = \frac{q_A + q_B}{2} \quad \frac{q_A = -4\mu\text{C}}{q_B = 24\mu\text{C}}$$

$$q'_A = q'_B = \frac{-4 + 24}{2} = +10\mu\text{C}$$

گام دوم: با باز کردن کلید k_2 و بستن کلید k_3 ، کره C را با کره B که
اکنون بار آن C است، تماس می‌دهیم. در این حالت داریم:

$$q'_C = q''_B = \frac{q_C + q_B}{2} \quad \frac{q_C = +50\mu\text{C}}{q_B = +10\mu\text{C}}$$

$$q'_C = q''_B = \frac{50 + 10}{2} = +30\mu\text{C}$$

گام سوم: با باز کردن کلید k_2 و بستن کلید k_3 ، کره‌های A و C را که
اکنون بارهای آن‌ها $A' = +10\mu\text{C}$ و $C' = +30\mu\text{C}$ است، تماس
می‌دهیم. در این حالت داریم:

$$q''_A = q''_C = \frac{q'_A + q'_C}{2} = \frac{10 + 30}{2} = 20\mu\text{C}$$

گام چهارم: نسبت $\frac{q''_A}{q_B}$ را پیدا می‌کنیم:

$$\frac{q''_A}{q_B} = \frac{20}{24} = \frac{5}{6}$$

(فیزیک ۲ - الکتریسیته ساکن: صفحه‌های ۲ تا ۵)

(فسرو ارغوانی فر)

-۱۷۲

در راستای افقی به هر یک از گلوله‌ها دو نیرو وارد می‌شود، نیروی دافعه
کولنی و نیروی فنر. چون گلوله‌ها در حال تعادل‌اند، اندازه این دو نیرو با هم
برابر است. اندازه نیرویی که از طرف فنر فشرده به هر گلوله وارد می‌شود،

برابر است با:

$$x = \frac{30 - 10}{2} = 10\text{cm}$$

$$F_{\text{فنر}} = kx = 100 \times 10 \Rightarrow F_{\text{فنر}} = 10\text{N}$$

حال با استفاده از قانون کولن، می‌توان نوشت:

$$F = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2} \Rightarrow 10 = 9 \times 10^9 \times \frac{q^2}{(3 \times 10^{-1})^2}$$

$$\Rightarrow q^2 = 10^{-10} \Rightarrow |q| = 10\mu\text{C}$$

(فیزیک ۲ - الکتریسیته ساکن: صفحه‌های ۵ تا ۱۰)



$$m_{\text{pos}} < m_{\text{pro}} \xrightarrow{\frac{v^r \propto}{m}} v_{\text{pos}} > v_{\text{pro}}$$

(فیزیک ۲ - الکتریسیته ساکن: صفحه‌های ۱۹ تا ۲۱)

است، پس:

(بابک اسلامی)

-۱۷۸

دقت کنید چون بار الکتریکی از پایانه مثبت تا پایانه منفی با تری جایه شده

$$\Delta V = V_- - V_+ = -12V$$

است، خواهیم داشت:

$$\Delta V = \frac{\Delta U}{q} \Rightarrow -12 = \frac{\Delta U}{1/5} \Rightarrow \Delta U = -18J$$

بنابراین داریم:

(فیزیک ۲ - الکتریسیته ساکن: صفحه‌های ۲۳ تا ۲۶)

(عبدالرضا امین نسب)

-۱۷۹

از قضیه کار- انرژی جنبشی استفاده می‌کنیم. دقت کنید فاصله نقطه A تا صفحه منفی ($10cm = 0 / 1m$) را باید در رابطه زیر جایگذاری کنیم، داریم:

$$W_t = K_2 - K_1 \xrightarrow{W_t = W_E} W_E = \frac{1}{2} m(v^2 - v_0^2)$$

$$\Rightarrow |q| Ed \cos \theta = \frac{1}{2} m(v^2 - v_0^2)$$

$$\Rightarrow 1/6 \times 10^{-19} \times 2 \times 10^3 \times 0/1 = \frac{1}{2} \times 1/6 \times 10^{-27} \times (9 \times 10^{10} - v_0^2)$$


$$\Rightarrow (9 \times 10^{10} - v_0^2) = 4 \times 10^{10}$$

$$\Rightarrow v_0^2 = 5 \times 10^{10} \Rightarrow v_0 = \sqrt{5} \times 10^5 \frac{m}{s}$$

(فیزیک ۲ - الکتریسیته ساکن: صفحه‌های ۱۹ تا ۲۳)

(سعید شرق)

-۱۸۰




$$|\Delta V| = Ed$$

در میدان الکتریکی یکنواخت، داریم:
دقت کنید اگر جایه‌جایی در جهت خط‌های میدان الکتریکی باشد، پتانسیل الکتریکی کاهش می‌یابد و بر عکس.

$$\Delta V = -210 \times (50 - 20) \times 10^{-2} = -63V$$

(فیزیک ۲ - الکتریسیته ساکن: صفحه‌های ۲۳ تا ۲۶)



$$E_1 = E_2 = \frac{k|q_1|}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 5 \times 10^{-6}}{(3\sqrt{2} \times 10^{-2})^2} = 3 \times 10^7 \frac{N}{C}$$

$$E_3 = E_4 = \sqrt{E_1^2 + E_2^2} = \sqrt{(3 \times 10^7)^2 + (3 \times 10^7)^2} = 3\sqrt{2} \times 10^7 \frac{N}{C}$$

$$E_t = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} \Rightarrow 5\sqrt{2} \times 10^7 = \sqrt{E_x^2 + (3\sqrt{2} \times 10^7)^2}$$

$$\Rightarrow E_x = 4\sqrt{2} \times 10^7 \frac{N}{C}$$

$$E_x = E_3 = \frac{k|q_3|}{r^2} \Rightarrow 4\sqrt{2} \times 10^7 = \frac{9 \times 10^9 \times |q_3|}{(3 \times 10^{-2})^2}$$

$$\Rightarrow |q_3| = 4\sqrt{2} \times 10^{-9} C = 4\sqrt{2} \mu C$$

دقت کنید اگر بار q_3 در مکان C نیز قرار داشت، فقط علامت آن عوض می‌شد.

(فیزیک ۲ - الکتریسیته ساکن: صفحه‌های ۱۷ تا ۲۰)

(عبدالرضا امین نسب)

-۱۷۶

می‌دانیم خطوط میدان الکتریکی همواره از بار مثبت خارج و به بار منفی وارد می‌شوند، بنابراین بار الکتریکی q_1 مثبت و بار الکتریکی q_2 منفی خواهد بود.

از طرفی تراکم خطوط میدان الکتریکی در هر ناحیه از فضای بیانگر بزرگی میدان الکتریکی است. با توجه به شکل، چون تراکم در اطراف بار الکتریکی q_1 بیشتر است، بنابراین $|q_1| > |q_2|$


(فیزیک ۲ - الکتریسیته ساکن: صفحه‌های ۱۷ تا ۱۹)

(مینم شیان)

-۱۷۷

با استفاده از قانون دوم نیوتون و در نظر گرفتن این نکته که فقط تیروی الکتریکی به پروتون و پوزیترون وارد می‌شود، داریم:

$$F_{\text{net}} = ma \Rightarrow a = \frac{F_{\text{net}}}{m} \xrightarrow{F_{\text{net}} = |q|E} a = \frac{E|q|}{m}$$



از طرفی با استفاده از معادله سرعت - جایه‌جایی داریم:

$$v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x \Rightarrow v^2 = 2\left(\frac{E|q|}{m}\right)d$$

هر دو ذره در یک میدان الکتریکی هستند (E برابر)، هر دو یک مسافت طی می‌کنند (d برابر) و هر دو دارای یک بار الکتریکی یکسان هستند (|q| برابر) اما جرم پوزیترون (که هم جرم الکترون هست) کمتر از جرم پروتون



فیزیک ۱

-۱۸۱

(میلار نقوی)

ابتدا یکای هر واحد را بر حسب واحدهای SI می‌نویسیم.

$$1\mu\text{g} = 10^{-6}\text{ g} = 10^{-9}\text{ kg}$$

$$1\text{Hz}^2 = 1 \left(\frac{1}{\text{s}} \right)^2 = 1 \frac{1}{\text{s}^2}$$

$$1\text{cm}^2 = 10^{-4}\text{ m}^2$$

$$1\text{ms} = 10^{-3}\text{ s}$$

بنابراین:

$$\frac{4 \times 10^{11} \mu\text{g} \cdot \text{Hz}^2 \cdot \text{cm}^2}{\text{ms}} = 4 \times 10^{11} \times \frac{10^{-9} \text{kg} \times \left(\frac{1}{\text{s}^2} \right) \times 10^{-4} \text{m}^2}{10^{-3} \text{s}}$$

$$= 4 \times 10^1 \frac{\text{kgm}^2}{\text{s}^3} = 4 \times 10^1 \text{W}$$

(فیزیک - فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۷ تا ۱۳)

-۱۸۲

(بابک اسلامی)

هر تن معادل ۱۰۰۰kg و هر کیلوگرم معادل ۱۰۰۰g است. داریم:

$$0/0000282\text{ton} = 0/0000282\text{ton} \times \frac{10^3 \text{kg}}{1\text{ton}} \times \frac{10^3 \text{g}}{1\text{kg}} = 28/2\text{g}$$

در نمادگذاری علمی، هر عدد را به صورت حاصل ضرب عددی بین ۱ و ۵۰ و توان صحیحی از عدد ده می‌نویسیم. داریم:

$$28/2\text{g} = 2/82 \times 10^1\text{g}$$

(فیزیک - فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۷ تا ۱۳)

-۱۸۳

(محمدعلی کیانی)

نتیجه اندازه‌گیری برابر با میانگین اندازه‌گیری‌ها به وسیله این خط کش است.

دقت کنید چون نتیجه اندازه‌گیری ۲۸/۲mm اختلاف زیادی با بقیه اندازه‌گیری‌ها دارد، آنرا در محاسبه میانگین در نظر نمی‌گیریم.

$$\frac{22/6 + 20/3 + 21/9}{3} = 21/6\text{mm}$$

(فیزیک - فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه ۱۵)

-۱۸۴

(بیتا فورشید)

ابتدا ابعاد استخر را بر حسب متر می‌نویسیم. داریم:

$$8\text{inch} \times \frac{2/5\text{cm}}{1\text{inch}} = 20.0\text{cm} = 2\text{m}$$

$$2.0\text{ft} \times \frac{12\text{inch}}{1\text{ft}} \times \frac{2/5\text{cm}}{1\text{inch}} = 60.0\text{cm} = 6\text{m}$$

$$2.0\text{yard} \times \frac{3\text{ft}}{1\text{yard}} \times \frac{12\text{inch}}{1\text{ft}} \times \frac{2/5\text{cm}}{1\text{inch}} = 180.0\text{cm} = 18\text{m}$$

بنابراین حجم استخر برابر است با:

$$V = 2 \times 6 \times 18 = 216\text{m}^3$$

آهنگ ورود آب به استخر برابر با $2/0\text{m}^3/\text{min}$ و آهنگ خروج آب از استخربرابر با $5/0\text{m}^3/\text{min}$ است. بنابراین در هر دقیقه $3\text{m}^3 = 0/2 = 0/5 - 0/0$ آباز استخر خارج می‌شود. در نتیجه مدت زمانی که طول می‌کشد تا 216m^3

آب استخر خالی شود برابر است با:

$$t = \frac{216}{0/2} = 720\text{min} = 12\text{h}$$

(فیزیک - فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۶ تا ۱۳)

(مینم (شنبان)) -۱۸۵

هنگامی که از دماسنجد مدرج A عدد دما را C° ($28/73 \pm 0/05$) گزارش

کردہایم، رقم ۳، رقم حدسی بوده است و به این ترتیب کوچکترین

درجه‌بندی وسیله برابر با 1°C بوده است. پس دقت دماسنجد A معادل با 1°C می‌باشد. از آنجا که دقت اندازه‌گیری دو دماسنجد برابر است.بنابراین دقت اندازه‌گیری دماسنجد رقمی B نیز معادل با 1°C خواهد بود

و در نتیجه عددی که این دماسنجد گزارش می‌کند باید به گونه‌ای باشد که رقم سمت راست، هم مرتبه با دقت باشد. پس عدد گزارش شده توسط این

دماسنجد به صورت C° ($28/0/02$) خواهد بود.

(فیزیک - فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱۴ تا ۱۶)

(مینم (شنبان)) -۱۸۶

ابتدا تخمین مرتبه بزرگی تعداد صفحات کتاب و نیز مساحت هر صفحه را

به دست می‌آوریم:

$$\text{صفحه}^2 = 10^2 \sim 1 \times 10^2 = 1/4 \times 10^2 = 140 = 1\text{میلیمتر}^2$$

چون هر صفحه از هر طرف ۱cm حاشیه خالی دارد، پس ابعاد قسمتی از هر

صفحه که شامل کلمات است، معادل $20\text{cm} \times 27\text{cm}$ می‌شود و می‌توان

نوشت:

$$20\text{cm} \times 27\text{cm} = 540\text{cm}^2 = \text{مساحت قسمت مفید صفحه}$$

$$= 5/4 \times 10^2 \sim 10^1 \times 10^2 = 10^3\text{cm}^2$$

هم چنین تخمین مرتبه بزرگی مساحت متوسط هر کلمه چنین می‌شود:

$$10^1 \times 10^{-1}\text{cm}^2 = 5/0 \times 10^{-1}\text{cm}^2 = 0/5\text{cm}^2 = 0/5\text{ مساحت هر کلمه}$$

اکنون تعداد کلمات این کتاب را به صورت زیر تخمین می‌زنیم:

$$\text{کلمه}^{10^5} \times \frac{10^3\text{cm}^2}{1\text{cm}^2} \times \frac{1\text{کلمه}}{10^2\text{صفحه}} = 10^5\text{صفحه}$$

(فیزیک - فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱۹ تا ۲۱)



با حل این دستگاه دو معادله و دو مجهول می‌توان حجم طلا را بدست آورد:

$$\begin{cases} V_1 = \frac{m_1}{\rho_1} = \frac{100}{10} = 10 \text{ cm}^3 \\ V_2 = \frac{m_2}{\rho_2} = \frac{50}{5} = 10 \text{ cm}^3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 10 + 10 = 20 \text{ cm}^3$$

$$m = \rho V \Rightarrow 10 \times 20 = 200 \text{ g}$$

(فیزیک - فیزیک و اندازه‌گیری: صفحه‌های ۲۳ تا ۲۴)

(سعید شرق)

-۱۸۹

ابتدا حجم الكل بیرون ریخته شده از ظرف را محاسبه می‌کنیم.

$$\rho = \frac{m_{\text{كل}}}{V_{\text{كل}}} \Rightarrow \frac{100}{V_{\text{كل}}} = \frac{10}{10} \Rightarrow V_{\text{كل}} = 100 \text{ cm}^3$$

حجم الكل بیرون ریخته شده همان حجم جسم فلزی است.

از طرفی حجم فلز به کار رفته در جسم فلزی برابر است با:

$$V_{\text{فلز}} = \frac{m_{\text{فلز}}}{\rho_{\text{فلز}}} = \frac{70}{8} = 8.75 \text{ cm}^3$$

$$V' = V_{\text{كل}} - V_{\text{فلز}} : \text{حجم حفره}$$

$$\Rightarrow V' = 100 - 8.75 = 91.25 \text{ cm}^3$$

(فیزیک - فیزیک و اندازه‌گیری: صفحه‌های ۲۳ تا ۲۴)

(میلاد تقی)

-۱۹۰

با استفاده از تعریف چگالی داریم:

$$\begin{cases} V_1 = \frac{m_1}{\rho_1} = \frac{100}{10} = 10 \text{ cm}^3 \\ V_2 = \frac{m_2}{\rho_2} = \frac{50}{5} = 10 \text{ cm}^3 \end{cases} \Rightarrow V_{\text{كل}} = 10 + 10 = 20 \text{ cm}^3$$

حال با استفاده از تعریف چگالی مخلوط داریم:

$$V = \frac{m_{\text{آبیار}}}{\rho_{\text{آبیار}}} = \frac{100 + 50}{10 + 5} = 18 / 7.5 \text{ cm}^3$$

$$V_{\text{آبیار}} = 18 / 7.5 - 20 = -1 / 2.5 \text{ cm}^3$$

بنابراین حجم آبیار $1 / 2.5$ سانتی‌متر مکعب کاهش یافته است.

(فیزیک - فیزیک و اندازه‌گیری: صفحه‌های ۲۳ تا ۲۴)

(مصطفی کیانی)

-۱۸۷

چون جرم دو کره یکسان است و چگالی کره B بیشتر است، طبق

رابطه $\rho = \frac{m}{V}$ ، حجم واقعی کره B کمتر می‌باشد. یعنی درون کره B

حفره‌ای وجود دارد و کره A توبُر است و در نتیجه حجم واقعی و حجم

ظاهری آن یکسان می‌باشد. ابتدا حجم ظاهری کره‌ها را حساب می‌کنیم.

$$V'_A = V'_B = \frac{4}{3}\pi r^3 \xrightarrow{r=8\text{ cm}} V'_A = V'_B = \frac{4}{3} \times 3 \times 8 = 32 \text{ cm}^3$$

حجم واقعی کره B را بدست می‌آوریم. دقت کنید حجم واقعی را از

$$\rho = \frac{m}{V} \text{ بدست می‌آوریم.}$$

$$m_A = m_B \xrightarrow{m=\rho V} \rho_A V_A = \rho_B V_B$$

$$\frac{V_A = V'_A = 32 \text{ cm}^3}{\rho_A = \frac{g}{cm^3}, \rho_B = \frac{g}{cm^3}} \xrightarrow{3 \times 32 = 8 \times V_B} V_B = 12 \text{ cm}^3$$

می‌بینیم حجم واقعی کره B برابر با 12 cm^3 و حجم ظاهری آن 32 cm^3

است. بنابراین اختلاف این دو حجم برابر با حجم حفره می‌باشد.

$$\Delta V'_B = V'_B - V_B = 32 - 12 \Rightarrow \Delta V'_B = 20 \text{ cm}^3$$

(فیزیک - فیزیک و اندازه‌گیری: صفحه‌های ۲۳ تا ۲۴)

(میثم (شتیان)

-۱۸۸

اگر رابطه چگالی را برای این آبیار بنویسیم، داریم:

$$\rho_{\text{آبیار}} = \frac{m_{\text{آبیار}}}{V_{\text{آبیار}}}$$

$$\Rightarrow \frac{92}{18} = \frac{m_{\text{آبیار}}}{V_{\text{آبیار}}} = \frac{8}{1} \text{ cm}^3$$

$$\Rightarrow V_{\text{آبیار}} = 8 \text{ cm}^3 \quad (1)$$

از طرفی با استفاده از اصل پایستگی جرم داریم:

$$m_{\text{آبیار}} = m_{\text{ناخالصی}} + m_{\text{طلاء}}$$

$$\xrightarrow{m=\rho V} (\rho V) + (\rho V) = 92 \text{ g}$$

$$\Rightarrow 19V + 7V = 92 \text{ g} \quad (2)$$

$$\frac{0 / \text{mol Cu}}{\text{mol Cu}} = \frac{x \text{g}}{2 \times 10 \text{g Ag}} \Rightarrow x = 21 / 6 \text{g Ag}$$

شیمی ۳

پ) یون‌های مثبت از آند به کاتد و یون‌های منفی از کاتد به آند می‌روند

بنابراین Ag^+ به سمت آند نمی‌رود.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۱۴۵ تا ۱۴۹)

(مسن لشکری)

-۱۹۴

بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینه «۱»: آند سلول D از سایر آندها قوی‌تر است ولی کاتد این سلول

قوی‌ترین اکسنده نیست زیرا Ag^+ در بین این کاتدها قوی‌ترین اکسنده است.

گزینه «۲»: Ag^+ اکسنده است و Ag نقش کاهنده را دارد. بنابراین این

جمله از نظر مفهومی نادرست است.

گزینه «۴»: یک عدد منفی به دست می‌آید در حالی که نیروی

الکتروموتوری سلول $\text{Cu} - \text{Ag}$ عددی مثبت است.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۱۴۵ تا ۱۴۹)

(مسن لشکری)

-۱۹۵

در غشای مبادله کننده پروتون، H^+ یا پروتون از آند به کاتد حرکت

می‌کند و جهت حرکت آن هم جهت با حرکت الکترون‌ها در مدار بیرونی

است.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۱۴۵ تا ۱۴۹)

(مینیا شرافت پور)

-۱۹۱

شکل داده شده، بیانگر کاربرد الکتروشیمی در اندازه‌گیری و کنترل کیفی

(اطمینان از کیفیت فراورده) می‌باشد.

(شیمی ۳، صفحه ۱۴۸)

(مسن لشکری)

-۱۹۲

بررسی گزینه‌ها:

گزینه‌های «۱» و «۲»: از آن جایی که محلول مس (II) سولفات با طلا

واکنش نمی‌دهد می‌توان دریافت که طلا کاهنده ضعیف‌تری است و قدرت

اکسندگی بیشتری دارد.

گزینه «۳»: هیچ فلزی با نمکی از جنس خودش واکنش نمی‌دهد.

گزینه «۴»: با توجه به جرم مولی مس، آهن و روی معلوم می‌شود که به جرم

تیغه آهن افزوده می‌شود.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۱۴۰ تا ۱۴۳)

(مسن لشکری)

-۱۹۳

بررسی عبارات نادرست:

ب) بهازای واکنش mol تیغه مس آندی mol نقره به جرم تیغه کاتدی

افزوده می‌شود. پس داریم:

$$E^\circ = +2 / 24V - E^\circ = -0 / 14 - (-2 / 38) = -0^\circ \text{ آند}$$

موارد سوم و چهارم: با توجه به این که E° منیزیم کمتر از E° قلع می‌باشد،

پس در جدول پتانسیل کاهاشی، منیزیم پایین‌تر از قلع جای دارد و قدرت

اکسیدگی بون آن کمتر از Sn^{2+} می‌باشد.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۳۷ تا ۴۹)


(کتاب آن)

-۲۰۵

در آند مولکول هیدروژن اکسایش می‌یابد که طبق سری

الکتروشیمیایی، E° اکسایش و کاهش هیدروژن صفر است، پس E° سلول،


همان E° کاند است.



بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: واکنش کلی رخ داده در سلول سوختی عکس واکنش کلی

برقکافت آب و به صورت زیر است:



گزینه «۲»: هیدروژن به عنوان سوخت سلول وارد الکترود گرافیتی آند

می‌شود و به آرامی اکسید می‌شود.

گزینه «۴»: پروتون‌ها (H^+) در عرض غشا به سمت کاتد (قطب مثبت) در

حرکتند.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۵۱ تا ۵۳)

شیمی ۳ (آزمون گواه)

(سراسری تهری ۹۷)

-۲۰۱

معادله موازن شده واکنش به صورت زیر است:



(شیمی ۳، صفحه‌های ۴۰، ۵۲ و ۵۳)

(سراسری تهری ۹۷)

-۲۰۲


منیزیم کاهنده‌تر از آهن است و در جدول پتانسیل کاهاشی استاندارد، منیزیم

پایین‌تر از آهن جای دارد.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۴۶ تا ۴۸)

(سراسری فارج از کشور ریاضی ۹۵)

-۲۰۳



$$\Rightarrow 2 / 416 = 2x \times 108 - x \times 65 \Rightarrow 2 / 416 = 151x$$

$$\Rightarrow x = 0 / 016 \Rightarrow \text{مصرفی mol AgNO}_3 = 0 / 032$$

$$\frac{\text{مقدار نقره نیترات مصرف شده}}{\text{مقدار کل نقره نیترات}} = \frac{0 / 032}{0 / 04} \times 100 = 80\%$$

(شیمی ۳، صفحه‌های ۴۶ تا ۴۸)

(سراسری تهری ۹۷)

-۲۰۴

فقط مورد اول صحیح است. بررسی سایر موارد:

مورد دوم:



ب) درست است.

(سراسری فارج از کشور تهریب ۹۳)

-۲۰۶

پ) درست - زیرا در سری الکتروشیمیایی آهن (Fe) پایین تر از قلع

عدد اکسایش اتم فسفر در P_4O_{10} برابر (+۵) و در H_3PO_4 برابر (+۳)

است.

(Sn) قرار داشته و هرگاه در سطح حلبی خراشی ایجاد شود، آهن اکسایش

(شیمی ۳، صفحه‌های ۵۳ و ۵۴)

می‌یابد و قلع محافظت می‌شود. برخلاف حلبی از آهن سفید برای ساختن

ظروف بسته‌بندی مواد غذایی استفاده نمی‌شود.


ت) درست - نیم واکنش کاتدی مربوط به خوردگی آهن سفید (آهن

(سراسری ریاضی ۹۵)

-۲۰۷

گالوانیزه) به صورت زیر می‌باشد و مجموع ضرایب آن برابر ۱۱ است.

فقط مورد سوم درست است.



(شیمی ۳، صفحه‌های ۵۸ و ۵۹)

در زنگ زدن آهن در بخش کاتدی طبق معادله زیر با کاهش هر مول گاز

اکسیژن در آب، ۴ مول یون هیدروکسید تولید می‌شود.

(کتاب آن)

-۲۰۹

بررسی سایر موارد:

آلومینیم فلز فعالی است که به سرعت در هوای اکسید می‌شود.

مورود اول: پایگاه آندی در نقطه A قرار دارد.

(شیمی ۳، صفحه ۶)

مورود دوم: نیم واکنش کاتدی (نه آندی) در جایی که غلظت اکسیژن زیاد

است، انجام می‌شود.

(سراسری فارج کشور تهریب ۹۷)

-۲۱۰

مورود چهارم: کاتیون‌های $\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$ به سمتی حرکت می‌کنند که غلظت



واکنش آندی:

گاز اکسیژن در آنجا زیاد باشد.



واکنش کاتدی:

(شیمی ۳، صفحه‌های ۵۶ و ۵۷)

$$\Delta \text{LO}_2 = 10 / 4\text{g Cr} \times \frac{1\text{mol Cr}}{\Delta 2\text{g Cr}} \times \frac{12\text{mol e}^-}{1\text{mol Cr}}$$

$$\times \frac{1\text{mol O}_2}{4\text{mol e}^-} \times \frac{\Delta \text{LO}_2}{1\text{mol O}_2} = 7 / 5 \text{LO}_2$$

(شیمی ۳، صفحه‌های ۶۲ و ۶۳)

(سوال ۱۰۰ کتاب آن شیمی ۳ (وایزه))

-۲۰۸

آ) نادرست - یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین روش‌های محافظت فلزها

محافظت کاتدی است.

ساخته می‌شوند.

شیمی ۲

-۲۱۱

ب) میزان استخراج: مواد معدنی $>$ سوخت‌های فسیلی $>$ فلزها


(ممدر کوهستانیان)

پ) همه مواد ساختگی به صورت غیر مستقیم از کره زمین به دست می‌آیند.

(شیمی ۲، صفحه‌های ۲ تا ۴ و ۷ تا ۱۱)

(مبینا شرافتی پور)

-۲۱۴



$$\frac{n}{12} = 0 / 25 \Rightarrow n = 2 \Rightarrow X^{+} : [_{18}Ar] 3d^2$$


(شیمی ۲، صفحه ۱۶)

(ممدر کوهستانیان)

-۲۱۵

بر طبق نمودار صفحه ۱۳ کتاب درسی تغییر شعاع اتمی در دوره سوم جدول

تناوبی به صورت زیر است:



بیشترین اختلاف شعاع اتمی: $Na - Si$

کمترین اختلاف شعاع اتمی: $S - Cl$

(شیمی ۲، صفحه ۱۱)

(شیمی ۲، صفحه‌های ۲ تا ۵)

(مریم آکبری)

-۲۱۲

بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینه «۱»: عناصری که الکترون‌های ظرفیت برابر دارند غالب در یک گروه از جدول تناوبی قرار دارند.

گزینه «۲»: شبیه فلزها نیز می‌توانند الکترون به اشتراک بگذارند و در اثر ضربه خرد شوند.

گزینه «۳»: رفتار شیمیابی شبیه فلزها مانند نافلزها و خواص فیزیکی آنها بیشتر شبیه به فلزها است.

(شیمی ۲، صفحه‌های ۶ تا ۱۰)

(مریم آکبری)

-۲۱۳

عبارات «ت» و «ث» درست هستند.

بررسی عبارت‌های نادرست:

الف) پیشرفت صنعت الکترونیک بر اجزایی مبتنی است که از مواد نیمه رسانا



پ) امروزه مزارع زیادی را برای تهیه سوخت سبز، روغن و خوراک دام به کشت ذرت اختصاص می‌دهند.

ت) فراورده عنصری واکنش ترمیت (Fe(l) می‌باشد در حالی که سوخت سبز حاصل از تخمیر بی‌هوایی گلوکز، اتانول (C₂H₅OH(aq)) است.

(شیمی ۲، صفحه‌های ۲۳۰ تا ۲۵۰)

(مسن لشکری)

-۲۱۹



فرض می‌کنیم جرم کل گلوکز A g و بازده درصدی واکنش R % می‌باشد.

$$\begin{aligned} ?\text{gCO}_2 &= \text{AgC}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \times \frac{1\text{mol}}{180\text{g}} \times \frac{2\text{molCO}_2}{1\text{molC}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} \times \frac{44\text{g}}{1\text{mol}} \times \frac{\text{R}}{100} \\ &= \frac{2 \times 44 \times \text{A} \times \text{R}}{180 \times 100} \end{aligned}$$

$$\text{? g} = \text{A} - \frac{\text{A} \times \text{R}}{100} = \text{A} \left(1 - \frac{\text{R}}{100}\right) \text{g}$$

$$\Rightarrow \frac{2 \times 44 \times \text{R} \times \text{A}}{100 \times 180} = \text{A} \left(1 - \frac{\text{R}}{100}\right) \Rightarrow \text{R} = 67\%$$

(شیمی ۲، صفحه‌های ۲۳۰ تا ۲۴۰)

(مسن لشکری)

-۲۲۰

چون به جز CO₂ همه مواد شرکت کننده در واکنش جامد هستند، می‌توان

نتیجه گرفت ۴۴ kg CO₂ تولید شده است.

$$\text{? LCO}_2 = 44\text{kgCO}_2 \times \frac{1000\text{g}}{1\text{kg}} \times \frac{1\text{molCO}_2}{44\text{gCO}_2} \times \frac{22 / 4 \text{LCO}_2}{1\text{molCO}_2}$$

$$= 22400 \text{LCO}_2$$

$$\text{? kgFe} = 44\text{kgCO}_2 \times \frac{1000\text{g}}{1\text{kg}} \times \frac{1\text{molCO}_2}{44\text{gCO}_2} \times \frac{1\text{molFe}}{1\text{molCO}_2}$$



$$\times \frac{56\text{gFe}}{1\text{molFe}} \times \frac{1\text{kg}}{1000\text{g}} = 74 / 67\text{kgFe}$$

(شیمی ۲، صفحه‌های ۲۳۰ تا ۲۴۰)

(پیوار/کتابی)

-۲۱۶

آرایش الکترونی عنصر مورد نظر می‌تواند به صورت‌های زیر باشد:




بنابراین عبارت داده شده درست است.

گزینه «۱»: به دلیل واکنش ندادن طلا با مواد درون بدن از آن برای ساخت قطعات پزشکی استفاده می‌شود.

گزینه «۲»: در میان عناصر واسطه دوره چهارم، تنها ۲ عنصر (Zn, Cu)، دارای زیر لایه ۳d پر می‌باشند.

گزینه «۴»: در یون آهن (III) دو الکترون از ۴s و ۱ الکترون از زیر لایه ۳d کم می‌شود.



(شیمی ۲، صفحه‌های ۱۱۰، ۱۱۱ و ۱۷۰ تا ۱۷۱)

(محمد کوهستانیان)

-۲۱۷

به طور کلی زمانی که واکنش پذیری فراورده‌ها از واکنش پذیری واکنش دهنده‌ها کمتر باشد واکنش به صورت خودبه‌خودی انجام می‌گیرد.

در گزینه «۲» واکنش پذیری Fe بیشتر از واکنش پذیری Cu است.

(شیمی ۲، صفحه‌های ۲۰ و ۲۱)

(مینا شرائطی پور)

-۲۱۸

بررسی عبارت‌ها:

الف) Fe₂O₃ به عنوان رنگ قرمز در نقاشی به کار می‌رود. (Fe یک فلز واسطه است).

ب) استفاده از گیاهان به منظور استخراج نیکل و روی به صرفه نیست.



شیمی ۱

(علی اختصاری)

-۲۲۴

اغلب هسته‌هایی که نسبت شمار نوترون‌ها به پروتون‌های آن‌ها بزرگ‌تر یا مساوی ۱/۵ باشد ناپایدار هستند.

(شیمی ا، صفحه‌های ۶ و ۷)

(مریم کبری)

-۲۲۵

اورانیم شناخته شده ترین فلز پرتوزایی است که از ایزوتوب $^{235}_{\text{U}}$ آن که فراوانی اش در مخلوط طبیعی کمتر از ۷٪ درصد است، به عنوان سوخت در راکتورهای اتمی استفاده می‌شود.

(شیمی ا، صفحه‌های ۷ و ۸)

(دایال مهر علن)

-۲۲۶

بررسی عبارات نادرست:

(الف) شکل داده شده مربوط به مولد رادیوایزوتوپ مس است.
 (ب) اندازه اتم $^{99}_{\text{Tc}}$ با ییدید کاملاً برابر نیست و غده تیروئید هنگام جذب،

 $^{99}_{\text{Tc}}$ را نیز جذب می‌کند.

(شیمی ا، صفحه ۷)

(دایال مهر علن)

-۲۲۷

$$\begin{aligned} ? \text{mol P}_4 &= \frac{۳}{۰} \times ۱ \times ۱۰^{-۴} \text{P}_4 \times \frac{\text{۱ mol P}_4}{۶ \times ۰۲ \times ۱۰^{-۳} \text{P}_4} \times \frac{\text{۱ mol P}_4}{۴ \text{mol P}_4} \\ &= ۱/۲۵ \text{mol P}_4 \end{aligned}$$

(شیمی ا، صفحه‌های ۱۷ و ۱۹)

(محمدامین معنوی)

-۲۲۱

با بررسی نوع و مقدار عنصرهای سازنده برخی سیاره‌های سامانه خورشیدی و مقایسه آن با عنصرهای سازنده خورشید می‌توان به درک بهتری از چگونگی تشکیل عنصرها دست یافت.

فراوان‌ترین عنصر در سیاره مشتری هیدروژن است در حالی که آهن فراوان‌ترین عنصر زمین است. هیدروژن در یک گروه تنها قرار دارد و در گروه فلزات قلیابی نیست.

(شیمی ا، صفحه‌های ۳ و ۴)

-۲۲۲

(محمدحسن محمدزاده مقدم)

بررسی عبارت‌های نادرست:

پ) هر عنصر را با نماد یک یا دو حرفی نشان داده‌اند.
 ت) در دوره اول جدول تناوبی تنها دو عنصر وجود دارد.

(شیمی ا، صفحه‌های ۹ تا ۱۲)

-۲۲۳

$$E = mc^2 = ۱۱۱ \times ۱0^{-۳} \times ۱0^{-۳} \times (۳ \times ۱0^8)^2 = ۹۹۹ \times ۱0^۴ \text{J}$$

$$? m^3 = ۹۹۹ \times ۱0^۴ \text{J} \times \frac{۱\text{g}}{۳۳۳\text{J}} \times \frac{۱0^{-۳}\text{L}}{۰/۹۶\text{g}}$$

$$\times \frac{۱\text{m}^3}{۱۰۰\text{L}} = ۰/۰۳۱۲۵\text{m}^3$$

(شیمی ا، صفحه‌های ۳ و ۵)

گزینه «۳»: دمای ستاره را هم می‌توان تعیین کرد.

-۲۲۸

(شیوه ا، صفحه‌های ۱۹ و ۲۰)

(سیرطاهای مبسطه‌ی)

$$\frac{A+2}{A} X = \frac{A+2}{A} \Rightarrow (1) \quad A X = \frac{A+2}{A} X$$

(سعید مفسر، زاده)

-۲۳۰

$$\frac{A+4}{A+2} X = \frac{A+4}{A+2} \Rightarrow (2) \quad A X = \frac{A+4}{A+4} X$$

بررسی عبارات نادرست:

عبارت الف: ترتیب داده شده برای انرژی امواج الکترومغناطیسی صادق است.

عبارت پ: بسیاری از نمک‌ها (نه همه آن‌ها) شعله‌رنگی ایجاد می‌کنند.

(شیوه ا، صفحه‌های ۱۹ تا ۲۳)

$$A X = \frac{A+4}{A+4} X$$

$$A X = \frac{A+4}{A+4} X$$

با جایگذاری رابطه (۲) در رابطه (۱) خواهیم داشت:

$$\frac{\text{فراآنی ایزوتوپ موردنظر}}{\text{فراآنی کل ایزوتوپ‌ها}} \times 100 = \text{درصد فراآنی ایزوتوپ}$$

$$= \frac{A+4}{A+2 + A+4 + A+4} \times 100$$

$$= \frac{A+4}{6(A+4) + 2(A+4) + A+4} \times 100 \Rightarrow A+4 = 10\%$$

$$A X = \frac{A+4}{A+4} X \Rightarrow A X = 60\%$$

(شیوه ا، صفحه‌های ۱۴ و ۱۵)

(علی اختصاری)

-۲۲۹

گزینه «۱»: طیف‌سنج نه طیف‌سنج جرمی

گزینه «۲»: به دلیل این که خورشید و دیگر اجرام آسمانی از ما دورند،

ویژگی‌های آن‌ها را نمی‌توان به طور مستقیم اندازه‌گیری کرد.