

ریاضی  
مهندسی  
پیشرفته

جلد اول

Advanced  
Engineering  
Mathematics

پوپول مرجع دانشگاه و مدرسه  
[www.pupuol.com](http://www.pupuol.com)

# جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته - قسمت اول

دانشگاه دانشکده فنی دانشگاه تهران

مهندسی برق

استاد درس: دکتر راشد محصل

کیفیت جزوه : خوب



[www.univertext.com](http://www.univertext.com)

Subject:

Year:

Month:

Date:

ریاضیات مهندسی پیشرفته: دکتر ابوشامه محمد علی جلیلی

« ۱۹ / ۷ / ۱۴ »

مباحث این درس: حساب تغییرات، به مباحث بهینه‌سازی، روش‌ها عددی، تئوری توزیع و مسئله اشتراک لیوویل مربوط می‌شود.

$$I(y) = \int_{x_1}^{x_2} F(y, y', x) dx$$

Functional

اشتراک لیوویل  
تولید تغییر یافته

(Generalized Function): « تابعی » فانتکشنال

تابع دیراک یک توزیع است و خواص تابعی ندارد.  
یافتن تابع گرین برای عملگرهای مختلف مثل عملگر هلمهولتز وینر - هاپف تکنیک برای حل مسائل با شرایط مرزی ترکیبی در فضا و دیراک مسئله سایر فلد: مسئله دینم هم‌بافت سطح زمین کالفا تی



### Calculus of Variations

حساب تغییرات: ماکزیمم کردن یک فانتکشنال

هدف این بحث است.

(۱) ماکزیمم کردن یک تابع به صورت  $f(x_1, x_2, \dots)$  به صورت زیر است:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \dots$$

(۲) ماکزیمم کردن یک تابع به صورت  $f(x_1, x_2, \dots)$  با شرایط

$$\phi_1(x_1, x_2, \dots) = 0 \text{ و } \phi_2(x_1, x_2, \dots) = 0 \text{ از راه یافتن ضرایب لاگرانژ}$$


مقر قرار دادن آن‌ها چیست می‌آید.

Subject: \_\_\_\_\_

Year: \_\_\_\_\_ Month: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_




مساثل این فصل ،  
 دریافتن منحنی مسیری که توپ باطلی کمترین  
 زمان از نقطه A به B می رود



در یافتن کوتاه ترین مسیر روی رویه بین نقاط  
 A و B

در نخی به طول l که بیشترین سطح مقطع  
 را ایجاد کند



یک فانکشنال S

طول منحنی بین دو  
 نقطه  $x_1$  و  $x_2$  را بیان  
 می کند

$$I(y) = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

فانکشنال عبارتی است  
 که به یک تابع وابسته است و  
 هدف حساب تغییرات یافتن آن تابع است  
 گونه ای که آن فانکشنال اکستریم شود

در اولی روشی را بیان کرده است که اساس حساب تغییرات است  
 در یک کابل که بین دو نقطه بسته شده است همواره در وضعیتی قرار می گیرد  
 حداقل پتانسیل یا پایین ترین محله مرکز جرم را ایجاد کند



انواع فانکشنال ها :

ساده ترین نوع فانکشنال  
 در این فانکشنال یک تابع با متغیر  
 مستقلش حضور دارند

$$I(y) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y, y') dx$$

$$I(y) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y_1, y_2, \dots, y_n, y_1', y_2', \dots, y_n') dx$$


۱۳

Subject:

Year: Month: Date: ( )

$$I(y) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) dx$$

$$I = \iiint F(x, y, z, U(x, y, z), V(x, y, z), \frac{\partial U}{\partial x}, \dots) dx dy dz$$




مثال:  $y(x)$  و  $y_1(x)$  این طول را می‌بینیم که

$$\delta y = y(x) - y_1(x) \quad \text{تعاریف:}$$

حساسیتی از مرتبه صفر

(zero order proximity):



در هر دو شکل بالا هر دو در همسایگی  $y$  قرار دارند ولی منحنی سمت راست مشتقاتش نیز با  $y$  در همسایگی است.

$$\delta y = |y(x) - y_1(x)| = \text{کوچک}$$

حساسیتی از مرتبه  $k$ :

تفاضل دومینجی و تفاضل مشتقات آن‌ها تا مرتبه  $k$  هم کوچک است.

فانکشنال پیوسته: به از آن هر  $\epsilon > 0$  کوچک (بمفهوم همسایگی از مرتبه  $k$ ) بتوان عددی مانند  $\delta$  پیدا کرد به طوری که برای

$$|y - y_0| < \delta$$

$$|y^{(k)} - y_0^{(k)}| < \delta$$

Subject:

Year:      Month:      Date:      ( )

داشتیم باقیمانده به صورتیکه:  $|I(y) - I(y_0)| < \epsilon$

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad |y - y_0| < \delta \Rightarrow |I(y) - I(y_0)| < \epsilon$$

$$|y' - y_0'| < \delta$$

$$|y^{(k)} - y_0^{(k)}| < \delta$$

شرط لازم برای اکسترموم کردن  $I(y)$ : ضریب تغییرات

$$y(x) + \epsilon \eta(x)$$

تفاضل  $y(x) - y_1(x)$

$\eta(x)$  تابع دلخواه است که در

$$F_\epsilon: F(x, y + \epsilon \eta, y' + \epsilon \eta')$$

مرزها صفر است:

$$\eta(x_1) = \eta(x_2) = 0$$

شرط لازم برای اکسترموم شدن  $I(y)$  در  $y(x)$

$$\frac{dI(\epsilon)}{d\epsilon} \Big|_{\epsilon=0} = 0$$

$$\frac{dI}{d\epsilon} \Big|_{\epsilon=0} = \int_{x_1}^{x_2} \left( \frac{\partial F}{\partial y} \eta + \frac{\partial F}{\partial y'} \eta' \right) dx = 0$$

برای این قسمت اجزای  $\eta$  و  $\eta'$  را از هم جدا کنیم

$$(*) \quad \frac{dF}{d\epsilon} = \frac{\partial F}{\partial x} \frac{dx}{d\epsilon} + \frac{\partial F}{\partial (y + \epsilon \eta)} \frac{d(y + \epsilon \eta)}{d\epsilon} + \frac{\partial F}{\partial (y' + \epsilon \eta')} \frac{d(y' + \epsilon \eta')}{d\epsilon}$$

چون تغییر از  $x$  مستقل است پس  $dx = 0$

$$\frac{\partial F}{\partial y} \Big|_{\epsilon=0} \quad \frac{\partial F}{\partial y'} \Big|_{\epsilon=0}$$

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial F}{\partial y'} \eta' dx = \frac{\partial F}{\partial y'} \Big|_{x_1}^{x_2} \eta - \int_{x_1}^{x_2} \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial F}{\partial y'} \right) \eta dx$$

جزء به جزء

PAPCO

$\eta(x)$  در مرزها صفر است.

Subject: م  
 Year: ... Month: ... Date: ...

$$\rightarrow \int_{x_1}^{x_2} \left[ F_y \eta - \frac{d}{dx} (F_{y'}) \eta \right] dx = 0 \quad \frac{\partial F}{\partial y} = F_y \text{ حرفه‌ها کنیم}$$

$$\int_{x_1}^{x_2} \left( F_y - \frac{dF_{y'}}{dx} \right) \eta(x) dx = 0 \quad \frac{\partial F}{\partial y'} = F_{y'}$$

تفصیلاً بنیاداً در حساب تغییرات، برای هر  $\eta(x)$  دلخواه رابطه

در نتیجه:  $\phi(x) = 0$  زمانی برابر صفر است  $\int_{x_1}^{x_2} \phi(x) \eta(x) dx = 0$

$$F_y - \frac{dF_{y'}}{dx} = 0$$

مثال: تابعی بیابید که این فونکشنال را مینیمم کند

$$V(y) = \int_0^{\pi/4} (y' - y^2) dx, \quad y(0) = 0, \quad y(\pi/4) = 1$$

$$\rightarrow F_y - \frac{dF_{y'}}{dx} = 0, \quad F = y' - y^2 \rightarrow -2y - \frac{d}{dx} (y') = 0$$

$$\rightarrow y + y'' = 0 \rightarrow y = \sin x$$

فانکشنال  $V$

مثال:  $I(y) = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + y'^2} dx$   $(1) F$  فقط به  $y'$  وابسته باشد  $\rightarrow \frac{d}{dx} F_{y'} = 0$

$$\rightarrow F_{y'} y'' = 0 \xrightarrow{\text{س}} y'' = 0 \rightarrow y = ax + b \text{ خط راست}$$


$$F_{yy'} = 0 \rightarrow F = ay' + b$$

خط مستقیم

Subject: \_\_\_\_\_

Year: \_\_\_\_\_ Month: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

مثال



(۱۱)  $F : F(y, y')$  فقط به  $y$  و  $y'$  وابسته باشد.

در مینویس سطح رویه رویه را بینیم که

$$I(y) = \int_{x_0}^{x_1} P(x, y) \sqrt{1 + y'^2} dx$$

جمع کردن این رابطه می آید :  $F_y - F_{y'y'} y' - F_{y'y''} y'' = 0$  <sup>سه</sup>

$$\frac{d}{dx} (F - y' F_{y'}) = 0 = m = y' (\downarrow)$$

→ برای حالت خاص  $F(y, y')$  شرط اولی در برابر مقابله ساده می شود

→  $F - y' F_{y'} = c$




Subject:

Year:      Month:      Date: ( )

« 19 / 7 / 97 »

۲ سبک

ریاضیات مهندسی:



$$S(y) = \int_{x_0}^{x_1} \rho xy \sqrt{1+y'^2} dx$$

$$I(y) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y, y') dx \quad \text{انرژی}$$

شرط اولی:  $F_y - \frac{dF_{y'}}{dx} = 0$  و در حالت خاص  $F(x, y, y')$  داریم:  $F_y F_y' = c$


$$\rightarrow y \sqrt{1+y'^2} - y' \frac{yy'}{\sqrt{1+y'^2}} = c \rightarrow \frac{y}{\sqrt{1+y'^2}} = c$$

حده پارامتری  $\rightarrow y' = \sinh t \rightarrow y = c \cosh t$

$$\rightarrow \frac{dy}{dx} = \sinh t \rightarrow dx = \frac{dy}{\sinh t} = \frac{c \sinh t dt}{\sinh t} = c dt$$

$$\rightarrow x = ct + a \rightarrow y = c \cosh \rho(x-a)$$

$a$  و  $c$  نیز از روابط شرط مرزی  $y(x_0)$  و  $y(x_1)$  معلوم می‌شوند.



مثال: منحنی را بیابید که از دو نقطه A و B عبور کند و زمان نزول جسم را حداقل کند.

$$\frac{1}{2} m v^2 = mgy$$

$$\rightarrow v = \sqrt{2gy} = \frac{ds}{dt} = \frac{\sqrt{1+y'^2} dx}{dt}$$

Subject: \_\_\_\_\_

Year. \_\_\_\_\_ Month. \_\_\_\_\_ Date. \_\_\_\_\_ ( )


$$\rightarrow dt = \frac{\sqrt{1+y'^2}}{\sqrt{rgy}} dx \rightarrow t = \int_A^B \frac{1}{\sqrt{rg}} \cdot \frac{\sqrt{1+y'^2}}{\sqrt{y}} dx$$

رابطه اولی:  $F_y F_{y'} = c \rightarrow y(1+y'^2) = c_1 \rightarrow y' = \cot t$

$$\rightarrow y = \frac{c_1}{1+\cot^2 t} = c_1 \sin^2 t = \frac{c_1}{2} (1 - \cos 2t)$$

$$\frac{dy}{dx} = \cot t \rightarrow x = \frac{c_1}{2} (t - \frac{1}{2} \sin 2t) = \frac{c_1}{2} (2t - \sin 2t)$$

$$2t = \theta \rightarrow \begin{cases} x = \frac{c_1}{2} (\theta - \sin \theta) & \text{سیکلوئید} \\ y = \frac{c_1}{2} (1 - \cos \theta) & \text{سیکلوئید} \end{cases}$$



\* Variation تابع =

$$\delta y = y \rightarrow y + \delta y(x) \quad * \frac{d}{dx} \delta y = \delta \left( \frac{dy}{dx} \right) \quad \text{جابجایی بین مشتق و دلتا}$$

$(\delta y)' = \delta(y)$  سه

$$dF = \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy + \dots \quad * F(x, y, y')$$

$$\Delta F = F(x, y + \delta y, y' + \delta y') - F(x, y, y')$$

9

Subject:

Year: Month: Date: ( )

$$\rightarrow \Delta F \approx \frac{\partial F}{\partial y} \delta y + \frac{\partial F}{\partial y'} \delta y'$$

$\underbrace{\hspace{2cm}}_{\Delta y}$ 
 $\underbrace{\hspace{2cm}}_{\Delta y'}$

مربط بالتر

شرط این یک فانکشنال استریم شود این است که variation آن صفر شود

$$\rightarrow \delta F = \frac{\partial F}{\partial y} \delta y + \frac{\partial F}{\partial y'} \delta y'$$

تابع variation تابع


$$\delta(F_1 F_2) = F_1 \delta F_2 + F_2 \delta F_1$$

تقسیم تابع اولیاً فانکشنال ها دو تفسیر:

$$F(x, y, u(x, y), v(x, y), u_x, u_y, v_x, v_y)$$

بررسی تابعی از دو تفسیر دو تابع:

$$I = \iint_R F(x, y, u, v, u_x, u_y, v_x, v_y) dx dy$$



$\delta u$  و  $\delta v$  در مرزها صفر هستند

شرط استریم شدن:  $\delta I = 0$

$$\delta I = \iint_R \left( \frac{\partial F}{\partial u} \delta u + \frac{\partial F}{\partial u_x} \delta u_x + \frac{\partial F}{\partial u_y} \delta u_y \right) + \left( \frac{\partial F}{\partial v} \delta v + \frac{\partial F}{\partial v_x} \delta v_x + \frac{\partial F}{\partial v_y} \delta v_y \right) dx dy = 0$$

$\frac{\partial}{\partial x} (\delta u)$ 
 $\frac{\partial}{\partial y} (\delta u)$

$$\left( \frac{\partial F}{\partial v_x} \delta v_x + \frac{\partial F}{\partial v_y} \delta v_y \right) dx dy = 0$$

$\frac{\partial}{\partial x} (\delta v)$ 
 $\frac{\partial}{\partial y} (\delta v)$

Subject: \_\_\_\_\_  
 Year: \_\_\_\_\_ Month: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

با استفاده از تکنیک جز به جز انتقال بالا را ساده می کنیم:

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial F}{\partial u} \frac{\partial}{\partial x} (\delta u) dx = \frac{\partial F}{\partial x} \delta u \Big|_{x_1}^{x_2} - \int_{x_1}^{x_2} \left( \frac{\partial F_{ux}}{\partial x} \right) (\delta u) dx$$

همین کار را به طور مشابه برای  $v_x$  و  $v_y$  تکرار می کنیم

$$\delta I = \iint \left( \left[ \frac{\partial F}{\partial u} - \frac{\partial}{\partial x} F_{ux} - \frac{\partial}{\partial y} F_{uy} \right] \delta u + \left[ \frac{\partial F}{\partial v} - \frac{\partial}{\partial x} F_{vx} - \frac{\partial}{\partial y} F_{vy} \right] \delta v \right) dx dy = 0$$

$\delta u$  و  $\delta v$  از هم مستقل هستند پس شرط لازم اینست:

$$\begin{cases} F_u - \frac{\partial}{\partial x} F_{ux} - \frac{\partial}{\partial y} F_{uy} = 0 \\ F_v - \frac{\partial}{\partial x} F_{vx} - \frac{\partial}{\partial y} F_{vy} = 0 \end{cases} \leftarrow \text{قویاً اولی را تعمیم یافته}$$

(تا) تعداد متغیرها زیاد می شود →  
 (تا) تعداد توابع زیاد می شود ↓

مثال:

$$I(\phi_x, \phi_y) = \iint_R [\phi_x^2 + \phi_y^2] dx dy$$

این جا باید تابع و دو متغیر داریم پس:

$$F_\phi - \frac{\partial}{\partial x} F_{\phi_x} - \frac{\partial}{\partial y} F_{\phi_y} = -\frac{\partial}{\partial x} (\phi_x) - \frac{\partial}{\partial y} (\phi_y) = 0$$

Subject: \_\_\_\_\_  
 Year: \_\_\_\_\_ Month: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

$$\rightarrow \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = 0$$

انرژی پتانسیل الکترو استاتیکی  
 برای این که مینیمم شود باید در معادله  
 لاپلاس صوق کند.

حالت های دیگر

$$I = \int F(x, y_1, y_2, \dots, y_n, y_1', y_2', \dots, y_n') dx \quad (*)$$

$y_1, y_2, \dots, y_n$  روی مرزها معلوم هستند

شرط اولی:  $F_{y_i} - \frac{d}{dx} F_{y_i'} = 0$

حالت خاص:

اگر  $F$  تابع  $x$  نباشد شرط اولی به صورت زیر رو تبدیل می شود:

$$F_{y_i} - \frac{d}{dx} F_{y_i'} = c$$

ماندگاری به شکل:

$$I = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) dx$$

$$\delta I = \int_{x_0}^{x_1} \left[ \frac{\partial F}{\partial y} \delta y + \frac{\partial F}{\partial y'} \delta y' + \frac{\partial F}{\partial y''} \delta y'' + \dots \right] dx = 0$$

یکبار جزء به جزء بگیریم  $\frac{\partial}{\partial x} (\delta y)$  دوبار جزء به جزء بگیریم  $\frac{d}{dx} (F_{y_i'})$

$$F_{y_i'} \delta y \Big|_{x_0}^{x_1} - \int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{dx} (F_{y_i'}) \delta y + \int_{x_0}^{x_1} \frac{d^2}{dx^2} (F_{y_i''}) \delta y$$

$\delta y$  در مرزها خازد

Subject:

Year:      Month:      Date:      ( )

$$= \int_{x_0}^{x_1} \left[ F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} + \frac{d^2}{dx^2} F_{y''} + \dots + (-1)^n \frac{d^n}{dx^n} F_{y^{(n)}} \right] \delta y dx$$

این جمله باید صفر شود

از ترکیب این حالت با حالت‌های قبلی می‌توان در کلی‌ترین حالت‌ها حالت‌های فانتیشال را حل کرد که به یک دستگاه معادلات دیفرانسیل یا یک معادله دیفرانسیل از مرتبه بالا می‌رسیم.

مثال:

$$V(y) = \int_0^{\pi/2} (y'' - y + x) dx, \quad y(0) = 1, \quad y(\pi/2) = 0$$

$$y'(0) = 0, \quad y'(\pi/2) = -1$$

$$-py - \frac{d}{dx} F_{y'} + \frac{d^2}{dx^2} (py'') = 0 \rightarrow y^{(4)} - y = 0 \rightarrow y = \cos x$$

فانتیشال‌ها با محدودیت (Constraints)

$$I = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) dx$$

در غیر این صورت ممکن است  $m < n$  است. مسأله جواب نداشته باشد (over defined)

در حال این مسأله با شرایط محدود گسسته، ضرایب لاگرانژ را تعریف می‌کنیم:

۱۳۰

Subject:

Year:      Month:      Date: ( )

$$I^* = \int_{x_0}^{x_1} \underbrace{\left[ F + \sum_{i=1}^m \lambda_i(x) \phi_i \right]}_{F^*} dx$$


فانکشنال جدید

یک فانکشنال جدید ایجاد کردیم که در حل آن فانکشنال قبلی و قیدها با هم در تضاد نباشند و حالا اینها را حل می‌کنیم:

$$F^*_{y_i} - \frac{d}{dx} F^*_{y'_i} = 0 \quad i=1, 2, \dots, m \quad \text{و } \phi_i = 0$$

حالتی که این فانکشنالها را حل می‌کنیم و

$$\phi(x, y, z) = 0$$



مثال:

$$\int_{(x_0, y_0, z_0)}^{(x_1, y_1, z_1)} \sqrt{1 + y'^2 + z'^2} dx \quad \text{و} \quad \phi(x, y, z) = 0$$

طول کمان

$$I^* = \int \left[ \sqrt{1 + y'^2 + z'^2} + \lambda(x) \phi(x, y, z) \right] dx$$


دو تابع باید متغیر  $y(x)$  و  $z(x)$

$$\begin{cases} \lambda(x) \phi_y - \frac{d}{dx} \frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2 + z'^2}} = 0 \\ \lambda(x) \phi_z - \frac{d}{dx} \frac{z'}{\sqrt{1 + y'^2 + z'^2}} = 0 \\ \phi(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

معادلاتی که باید حل شوند:


Subject: \_\_\_\_\_

Year \_\_\_\_\_ Month \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ ( )



مسئله همپیرامونی:  
طول  $l$  ثابت است و می خواهیم  
توسط آن ما کمترین سطح ممکن  
را ایجاد کنیم.

اگر با دو طول  $l_1$  دو سطح ایجاد می کنیم اگر  $S_1 < S_2$  به جای  $S_1$  از  $S_2$   
استفاده می کنیم پس باید این شکل در محور تقارن داشته باشد پس  
یک دایره است.




مسئله حساب تغییرات:  
طول  $l$  ثابت است. برای این سطح  
زیر منحنی آن ما کمترین شود  $l$  باید  
بخشی از یک دایره باشد.

$\langle A, V, P \rangle$

کلاس ۳۰

ریاضیات متوسطی:



مثال: همپیرامونی

$$\int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1+y'^2} dx = l \quad \text{و} \quad I = \int_{x_0}^{x_1} y dx = \text{مساحت}$$

تغییر فانتکشنال

$$\int_{x_0}^{x_1} (y + \lambda \sqrt{1+y'^2}) dx = I^*$$

$$F - y' F_{y'} = C_1 \rightarrow y + \lambda \sqrt{1+y'^2} - y' \frac{\lambda y'}{\sqrt{1+y'^2}} = C_1$$

مثال برای آلفا

←  $\lambda$  constant



۱۵

Subject:

Year. Month. Date. ( )

$$\rightarrow y - c_1 = \frac{-\lambda}{\sqrt{1+y'^2}} \quad , \quad y' = \tan t \rightarrow y = c_1 - \lambda \cos t$$


$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{d\alpha} \rightarrow d\alpha = \lambda \cos t dt \rightarrow \alpha = \lambda \sin t + c_2$$

هدف اصلی این کار یک تابع در نظر می شود. از نقاط A و B عبور می کند.

$$\lambda = \frac{\int_a^b [p(x)y' - q(x)y] dx}{\int_a^b r(x)y' dx} \quad \text{مثال: معادله ایستاتی}$$

$$= \frac{I_1}{I_2} \quad \text{ایستاتی (Stationary)}$$

نقاط min و max ایستاتی هستند زیرا تغییرات زیادی نمی کنند.



$$\delta \lambda = 0 \rightarrow \frac{I_2 \delta I_1 - I_1 \delta I_2}{I_2^2} = 0 \rightarrow \frac{1}{I_2} (\delta I_1 - \frac{I_1}{I_2} \delta I_2) = 0$$

$$= \frac{1}{I_2} (\delta I_1 - \lambda \delta I_2) = 0$$

$$\delta I_1 = \int_a^b [p(x)y' \delta y' - q(x)y \delta y] dx$$

$$p(x)y' \frac{d}{dx} [\delta y]$$

جزء از جزء میزنیم

$$p(x)y' \delta y \Big|_a^b - \int_a^b \frac{d}{dx} (p(x)y') \delta y dx$$

Subject:

Year: Month: Date: ( )

$$\rightarrow \delta I_1 = -\mu \int_a^b \left[ \frac{d}{dx} (\rho(x)y') + q(x)y \right] \delta y dx$$


$$\rightarrow \delta \lambda = \frac{1}{I_2} \left\{ -\mu \int_a^b \left[ \frac{d}{dx} (\rho(x)y') + q(x)y + \lambda r(x)y \right] \delta y dx \right\} = 0$$

چون  $\delta y$  یک عبارت اختیاری است برای صفر شدن عبارت بالا باید محل خط کشی شده صفر بشود.

$$\rightarrow \frac{d}{dx} [\rho(x)y'] + (q(x) + \lambda r(x))y = 0 \leftarrow \text{معادله اشتروم لیویل}$$

که پاسخ هم معادله اشتروم لیویل مقادیر ایستایی  $\lambda$  هستند.

که مدل همیلتون (دینامیک) از اصل همیلتونی متوان به بسیاری از قوانین فیزیکی رسید. همیلتونی قوانین نیوتن، همیلتونی معادلات ماکسول، همیلتونی KCL و KVL مدار.



$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} - \vec{F} = 0$$

طرفین را در  $\delta \vec{r}$  ضرب

ما کنیم:  $\leftarrow$  ما چیزی را  $\delta \vec{r}$  جواب اصلی مسئله است.

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} \cdot \delta \vec{r} - \vec{F} \cdot \delta \vec{r} = 0$$

$$\rightarrow \int_{t_1}^{t_2} \left[ m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} \cdot \delta \vec{r} - \vec{F} \cdot \delta \vec{r} \right] dt = 0$$

$$\int_{t_1}^{t_2} m \frac{d\vec{r}}{dt} \cdot \delta \vec{r} \Big|_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} m \frac{d\vec{r}}{dt} \cdot \delta \left( \frac{d\vec{r}}{dt} \right) dt = - \frac{m}{2} \int_{t_1}^{t_2} \delta \left[ \left( \frac{d\vec{r}}{dt} \right)^2 \right] dt$$

$$= - \int_{t_1}^{t_2} \delta T dt$$

اگر  $\delta$  را در نظر بگیریم عبارت داخل انتگرال انرژی جنبشی  $T$  باشد.

IV

Subject:

Year:      Month:      Date: ( )

$$\rightarrow - \int_{t_1}^{t_2} [\delta T + \vec{F} \cdot \delta \vec{r}] dt = 0$$
 اگر  $\vec{F}$  پایستار باشد  $\vec{r}$

$$-\vec{\nabla} V \cdot \delta \vec{r} = -\delta V \quad \vec{F} = -\vec{\nabla} \phi = -\vec{\nabla} V$$

$$d\phi = \vec{\nabla} \phi \cdot d\vec{r}$$
 تابع نیرو  
انرژی پتانسیل

$$\rightarrow \int_{t_1}^{t_2} \delta(T - V) dt = 0 \rightarrow \delta \left[ \int_{t_1}^{t_2} (T - V) dt \right] = 0$$
 اصل کمترین عمل  
انرژی پتانسیل - انرژی جنبشی

$$A = \int_{t_1}^{t_2} (T - V) dt$$
 Principle of Minimum Action  $\rightarrow \delta A = 0$   
 یا اصل کمترین عمل

$$L = T - V = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - V(x, y, z)$$
 مثال:

$$\rightarrow \int_{t_1}^{t_2} (T - V) dt = L(x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, t)$$

$$\frac{\partial L}{\partial y_i} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{y}_i} \right) = 0$$

$$\frac{\partial V}{\partial x} - \frac{d}{dt} (m\dot{x}) = 0 \rightarrow \frac{\partial V}{\partial x} - m\ddot{x} = 0 \rightarrow F_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$$

$$\frac{\partial V}{\partial y} - \frac{d}{dt} (m\dot{y}) = 0 \rightarrow \frac{\partial V}{\partial y} - m\ddot{y} = 0 \rightarrow F_y = -\frac{\partial V}{\partial y}$$

$$\frac{\partial V}{\partial z} - \frac{d}{dt} (m\dot{z}) = 0 \rightarrow \frac{\partial V}{\partial z} - m\ddot{z} = 0 \rightarrow F_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

PAPCO

Subject:

Year: Month: Date: ( )

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}V$$

که نیرو برابر منفی گرادیان انرژی پتانسیل می باشد:

\*\*\*

که معادله اشتروم لیوویک:

تعریف: عملگر الحاقی (Adjoint Operator)

$L$  عملگر

$$L \rightarrow Lu = a_0 \frac{d^n u}{dx^n} + a_1 \frac{d^{n-1} u}{dx^{n-1}} + \dots + a_n u$$

$L^*$  عملگر

$$L \rightarrow L^* v = (-1)^n \frac{d^n}{dx^n} (a_0 v) + (-1)^{n-1} \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (a_1 v) + \dots$$

که  $L^*$  عملگر الحاقی (adjoint Operator) عملگر  $L$  است.

که برای عملگرهای دیفرانسیلی مرتبه  $n$  داریم:

$$Lu = p_0 \frac{d^p u}{dx^p} + p_1 \frac{du}{dx} + p_2 u \quad p_0(x), p_1(x), p_2(x)$$

$$L^* u = \frac{d^p}{dx^p} (p_0 u) - \frac{d}{dx} (p_1 u) + p_2 u$$

$$= p_0 \frac{d^p u}{dx^p} + (p_1 p_0' - p_1) \frac{du}{dx} + (p_0'' - p_1' + p_2) u$$

این عبارت در بازه  $a \leq x \leq b$  مطرح است. با فرض پیوسته بودن  $p_0, p_1, p_2$

$p_0, p_0', p_0''$  عملگر خود الحاقی (self Adjoint) است اگر:

$$Lu = L^* u \rightarrow p_1 p_0' - p_1 = p_1 \rightarrow \boxed{p_0' = p_1}$$

شروط لازم:

$$Lu = \frac{d}{dx} \left[ p_0 \frac{du}{dx} \right] + p_2 u$$

در این حالت:

که معادله لژانژ  $y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$  در بازه  $(-1, 1)$  برقرار بود

19

Subject

Year      Month      Date      ( )

Self Adjoint است زیرا  $(1-x^2)' = -2x$  یعنی:

$$\frac{d}{dx} [(1-x^2)y'] + n(n+1)y = 0$$

نقاط  $x = \pm 1$  باعث حذف  $y$  می شود و از این رو به

آن ها نقاط تکین می گویند.

معادله بسک  $x^2 y'' + x y' + (\alpha^2 - \nu^2) y = 0$  خود الحاق نیست.

اگر معادله دیرانسلی خود الحاق نباشد با ضرب طرفین آن در  $g(x)$

$$\ll g(x) = \frac{1}{p_0} e^{\int \frac{p_1}{p_0} dx} \gg$$

خود الحاق می شود.

مثلاً برای تابع بسک داریم:

$$g(x) = \frac{1}{x^2} e^{\int \frac{x}{x^2} dx} = \frac{1}{x^2} e^{-\ln x} = \frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x^3}$$

$$\rightarrow x y'' + y' + (\frac{x^2 - \nu^2}{x}) y = 0 \rightarrow \frac{d}{dx} [x y'] + (\frac{x^2 - \nu^2}{x}) y = 0$$

تعریف نقاط تکین برای معادله دیرانسلی مرتبه  $n$ :

اگر معادله دیرانسلی به فرم زیر باشد:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

اگر توابع  $p(x)$  و  $q(x)$  برای نقطه  $x_0$  محدود باشند و  $x_0$  یک

نقطه معمولی گویند. ولی اگر یکی یا هر دو آن ها وقتی  $x \rightarrow x_0$  بی محدود و آنرا

شوند نقطه  $x_0$  یک نقطه تکین است.

دو نوع نقطه تکین داریم:

۱- نقطه تکین یکنواخت (Regular):

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (x-x_0)p(x) = \text{finite}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (x-x_0)^2 q(x) = \text{finite}$$

PAPCO

Subject:

Year. Month. Date. ( )

۲- نقطه تکیه غیریکوانت (irregular):

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) P(x) = \text{infinite}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0)^2 Q(x) = \text{infinite}$$

که عملگر اشتروم - لیوویل (Sturm-Liouville):

$$L: \frac{d}{dx} \left[ p(x) \frac{du}{dx} \right] + q(x)u$$

$$Lu = -\lambda u$$

که البته طرف دوم را در یک تابع وزنی  $r(x)$  نیز ضرب می کنند:

$$Lu = -\lambda r(x)u$$

توابع ویژه  $\rightarrow$  تابع وزنی  $\rightarrow$  مقدار ویژه  $\rightarrow$  عملگر اشتروم لیوویل

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} \left[ p \frac{du}{dx} \right] + (q + \lambda r)u = 0$$

که در عبارت  $Lu(x) + \lambda r(x)u(x) = 0$  برای یک  $\lambda$  داده شده، تابعی مثل  $u(x)$

که با فرض شرایط مرزی تعیینی در معادله مقدار ویژه صدق می کند را یک

تابع ویژه معادله مقدار ویژه  $\lambda$  می گویند. هیچ تضمینی وجود ندارد که برای هر

$\lambda$  دلخواه صفاً بتوان  $u(x)$  را یافت. در حقیقت، نیاز به وجود یک تابع ویژه

معمولاً مقادیر  $\lambda$  را به یک مجموعه گسسته محدود می کند.

مثال: انتشار حرارت در محیط غیر یکوانت

P1

Subject:

Year: Month: Date: ( )

$$C(x) \rho(x) \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left[ k(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right] + Q(x)$$

← منبع حرارتی      ← تابش اشعه‌های حرارتی      ← چگالی جرمی  
 ← گرما ویژه

که اگر از جواب سازی متغیرها استفاده کنیم و فرض کنیم منبع حرارتی  $Q(x) = \alpha u$  باشد آن گاه:

$$u(x, t) = X(x)T(t) \quad , \quad Q(x) = \alpha u$$

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} \left[ \frac{k(x)}{\rho(x)} \frac{dX}{dx} \right] + \left( \frac{\alpha + \lambda}{r(x)} \frac{\rho(x) C(x)}{\gamma(x)} \right) X = 0 & \rightarrow \text{معادله اشتروم لیوویل} \\ \frac{dT}{dt} + \lambda T = 0 \end{cases}$$

مشکل Singular Sturm-Liouville اگر  $\rho(x) = 0$  شود یا  $q(x) = \infty$  شود آن گاه ما باید مسئله کلیه اشتروم - لیوویل سروکار داریم.

مشکل عادی اشتروم - لیوویل:

$$\frac{d}{dx} \left[ p(x) \frac{du}{dx} \right] + (q(x) + \lambda r(x)) u(x) = 0 \quad a < x < b$$

توابع  $p$  و  $q$  و  $r$  و  $\rho$  حقیقی یا مختلط هستند و در بازه  $a < x < b$  پیوسته اند. در بازه  $a < x < b$  داریم  $p(x) > 0$  و  $r(x) > 0$  اگر صفر شوند دیگر مسئله عادی نیست. شرایط مرزی به صورت زیر است:

$$\alpha_1 u(a) + \alpha_2 \left. \frac{du}{dx} \right|_{x=a} = 0 \quad (\alpha_1 \text{ و } \alpha_2 \text{ همزمان صفر نیستند})$$

طرف دوم حتماً باید صفر باشد:

$$\beta_1 u(b) + \beta_2 \left. \frac{du}{dx} \right|_{x=b} = 0 \quad (\beta_1 \text{ و } \beta_2 \text{ همزمان صفر نیستند})$$

Subject:

Year. Month. Date. ( )

ریاضی مهندسی: جلسه ۴ << ۱۹, ۷, ۲۲ >>

مسئله عادی اشتروم-لیوویل (Regular S.L. Prob.):

$$\frac{d}{dx} \left[ p \frac{du}{dx} \right] + (q + \lambda r) u = 0 \quad a \leq x \leq b$$

در نقاط  $a$  و  $b$  ممکن است مسئله تکلیف شود از این رو آن‌ها را در نظر نمی‌گیریم.

$$\left. \begin{aligned} \alpha_1 u + \alpha_2 \frac{du}{dx} \Big|_{x=a} &= 0 \\ \beta_1 u + \beta_2 \frac{du}{dx} \Big|_{x=b} &= 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \text{شرط‌های مرزی:} \\ (\alpha_1, \alpha_2 \text{ همزمان صفر نیستند}) \\ (\beta_1, \beta_2 \text{ همزمان صفر نیستند}) \end{aligned}$$

$p, q$  و  $r$  و  $\lambda$  توابعی حقیقی از  $a$  هستند و برای  $a \leq x \leq b$  بی‌صفتی توابع  $p(x)$  و  $r(x)$  در بازه  $a \leq x \leq b$  مثبتند. کتاب Morse & Feshbach به خوبی این بحث را پوشش داده است.

اگر مسئله اشتروم-لیوویل عادی را به صورت  $Lu = -\lambda u$  بنویسیم: مقادیر ویژه  $\lambda_n$  همگی حقیقی‌اند. ( $\lambda_1$  و  $\lambda_2$  و ... طیف مسئله) مقادیر ویژه  $\lambda_n$  گراهِ پایین دارند و گراهِ بالا ندارند.

$$\lambda_1 < \lambda_2 < \dots$$

هر مقدار ویژه  $\lambda_n$  یک تابع ویژه  $U_n(x)$  متناظر یکتا (در صورت نرمالیزه کردن) دارد که در بازه  $a \leq x \leq b$  دارای  $n-1$  صفر است. توابع ویژه  $U_n(x)$  یک مجموعه کامل را تشکیل می‌دهند.

همچنین باید: هر تابع دلخواه  $f(x)$  می‌تواند در بازه  $a \leq x \leq b$  به صورت  $U_n(x)$  بسط داده شود.



۲۳

Subject:

Year. Month. Date. ( )

تابع لورانجیک مسئله کدی SL نسبت زیرا در نقاط مرزی  $\alpha = \pm 1$  ...  
 $P(\alpha)$  را مقرون کند  
 این مجموعه توابع ویژه  $u_m$  و  $u_n$  مشابه با دو مقدار ویژه متفاوت  
 با تابع وزنی  $r(\alpha)$  متعامند.  $a < \alpha < b$

$$\int_a^b u_n(\alpha) u_m(\alpha) r(\alpha) d\alpha = 0 \quad m \neq n$$

نسبت Rayleigh:

$$\left( \frac{d}{dx} \left[ p \frac{d}{dx} \right] + q \right) u = -\lambda r(\alpha) u$$

SL

$$\lambda = \frac{-p(\alpha) u(\alpha) \frac{du}{d\alpha} \Big|_a^b + \int_a^b \left[ p \left( \frac{du}{d\alpha} \right)^2 - q u^2 \right] d\alpha}{\int_a^b u^2(\alpha) r(\alpha) d\alpha}$$

نسبت Rayleigh

مسئله تکین اشتروم - لیبویک: (Singular SL Prob.)

$q$  در بازه  $a \leq \alpha \leq b$  بینهایت شود یا نامیوسته شود  
 $P(\alpha)$  و  $r(\alpha)$  در یک انتها (یا  $a$  یا  $b$  یا هر دو) صفر میشوند.

در  $P(\alpha)$  در  $\alpha = a$  یا  $\alpha = b$  صفر شود یا لااخرین مرتبه  $\frac{d}{d\alpha} \left[ p \frac{du}{d\alpha} \right]$  مقرون شود

نقطه تکین ← نقطه ای که  $P(\alpha)$  را مقرون کند.  
 نقطه ای که  $q(\alpha)$  را بینهایت کند.

مثال برای نقاط تکین:  $(\alpha X')' + \left( \frac{-n^2}{\alpha} + \lambda \alpha \right) X = 0$

در  $q = \infty$  در  $\alpha = 0$


Subject:

Year: Month: Date: ( )

$$[(1-x^2)X']' + \lambda X = 0$$

$$\rightarrow x = \pm 1, \rho = 0$$

مثال جدید غیر یکنواخت برآنها داده گویا:



$$\frac{\partial}{\partial x} \left[ k(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right] = c(x) \rho(x) \frac{\partial u}{\partial t}$$

س  $u(x,t)$  تابعی از  $x$  و  $t$  است.

جوابنازی:  $u = X(x)T(t)$

$$\frac{d}{dx} \left[ \frac{k(x)}{\rho(x)} \frac{dX}{dx} \right] + \lambda \frac{c(x)\rho(x)}{r(x)} X = 0 \quad \text{و} \quad \frac{dT}{dt} = -\lambda T$$

شرایط مرزی:  $X(0) = 0, X(x=l) = 0, u(x,0) = f(x)$   
 $\rho(x)$  و  $c(x)$  از داده های مسئله هستند.

$$u(x,t) = \sum_n a_n X_n(x) e^{-\lambda_n t}$$

جواب:

$$u(x,0) = \sum_n a_n X_n(x) = f(x)$$

هیچ اطلاعاتی در مورد این نداریم ولی از خواص داریم:

$$a_n = \frac{\int_0^l f(x) c(x) \rho(x) X_n(x) dx}{\int_0^l c(x) \rho(x) X_n^2(x) dx}$$

که از همه جا بترتیب های مهمتر است مثلاً:

$$u(x,t) \approx a_1 X_1(x) e^{-\lambda_1 t}$$

$$\lambda_1 < \lambda_2 \dots$$

درجه تقریب با معلوم بودن  $\lambda$  ها مشخص می شود  $t \rightarrow \infty$

$$\left(\frac{\pi}{l}\right)^2 \rightarrow \left(\frac{2\pi}{l}\right)^2 \dots \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2$$

که در هر حالت دینورتین:

و با دقت خوبی درجه ما بالا قابل دقتند

۲۵

Subject,

Year. Month. Date. ( )

اگر بتوانیم مقادیر ویژه را تعیین بزنیم با تقریب خوبی جواب مسئله را یافته ایم  
ما بیشتر از خواص مسئله SL استفاده می کنیم

قضیه ۱: توابع ویژه  $X_m$  و  $X_n$  متناظر با دو مقدار ویژه  $\lambda_m$  و  $\lambda_n$  با تابع وزنی  $r(x)$  متعامدند و در حالت های زیر معتبر هستند:

- اگر  $P(a) = 0$  باشد شرط مرزی ابتدایی حذف می شود.

- اگر  $P(b) = 0$  باشد شرط مرزی انتهایی حذف می شود.

- شرط مرزی تناوبی (مثلاً  $\lambda_m$  و  $\lambda_n$  هر دو برابر باشند و میل کرده ایم)

$P(a) = P(b)$  نیز معتبر است.

اثبات: ضرب در  $X_n$ :  $X_m \rightarrow (pX_m') + qX_m = -\lambda_m r X_m$

ضرب در  $X_m$ :  $X_n \rightarrow (pX_n') + qX_n = -\lambda_n r X_n$

با ضرب کردن  $X_n$  و  $X_m$  و کم کردن معادلات از هم و انتگرال گیری داریم:

$$(\lambda_m - \lambda_n) \int_a^b r X_m X_n dx = p(x) [X_m X_n' - X_n X_m'] \Big|_a^b$$

$$\Delta(x) = \begin{vmatrix} X_m & X_m' \\ X_n & X_n' \end{vmatrix} \text{ دترمینان}$$

$$\text{طرف دوم} \rightarrow P(b) \Delta(b) - P(a) \Delta(a)$$

$$\text{شرط مرزی} \rightarrow \begin{cases} \alpha_1 X_m(a) + \alpha_2 X_m'(a) = 0 \\ \alpha_1 X_n(a) + \alpha_2 X_n'(a) = 0 \end{cases}$$

- اگر  $\alpha_1 \neq 0$  و  $\alpha_2 \neq 0$  باشند آن گاه باید  $\Delta(a) = 0$  باشد.

- اگر  $\beta_1 \neq 0$  و  $\beta_2 \neq 0$  باشند آن گاه باید  $\Delta(b) = 0$  باشد.

Subject:

Year: Month: Date: ( )

پس طرف دوم صفر است:

$$(\lambda_m - \lambda_n) \int_a^b r x_m x_n dx = 0$$

$$\int_a^b r x_m x_n dx = 0$$

اگر  $\lambda_n \neq \lambda_m$  باشد آن گاه:

که حالت ها خاص:

۱- اگر  $P(a)$  صفر باشد شرط مرزی ابتدایی حذف می شود.

۲- اگر  $P(b)$  صفر باشد شرط مرزی انتهایی حذف می شود.

۳- اگر  $P(a) = P(b)$  باشد (شرط مرزی تناوبی) نیز این قضیه صدق می کند.

قضیه ۲:  $\lambda$  ها حقیقی هستند.

$$\frac{d}{dx} [p \frac{dx}{dx}] + (q + \lambda r)x = 0$$

در این معادله  $p$  و  $q$  و  $r$  حقیقی اند.

$$\rightarrow \frac{d}{dx} [p \frac{d\bar{x}}{dx}] + (q + \lambda r)\bar{x} = 0$$

$\bar{\lambda}$  مقدار ویژه متناظر با  $\lambda$  است. با  $\bar{\lambda}$  قضیه ۱ داریم:

$$(\lambda - \bar{\lambda}) \int_a^b r(x) x \bar{x} dx = (\lambda - \bar{\lambda}) \int_a^b r(x) |x|^2 dx = 0$$

چون  $r(x)$  همواره مثبت است پس  $\lambda = \bar{\lambda}$  یعنی  $\lambda$  حقیقی است.

قضیه ۳: گنجایی توابع ویژه

دو تابع ویژه متفاوت  $X(x)$  و  $Y(x)$  متناظر با  $\lambda$  را در نظر می گیریم و نشان می دهیم  $S$   $Y = CX$  است. (C ثابت است)

$$\frac{d}{dx} [pX'] + (q + \lambda r)X = 0$$

PAPCO

۲۷

Subject:

Year. Month. Date. ( )

$$\frac{d}{dx} [pY'] + (q + \lambda r)y = 0$$

شرایط مرزی:

$$\begin{cases} \alpha_1 X(a) + \alpha_2 X'(a) = 0 & \text{و} & \alpha_1 Y(a) + \alpha_2 Y'(a) = 0 \\ \beta_1 X(b) + \beta_2 X'(b) = 0 & & \beta_1 Y(b) + \beta_2 Y'(b) = 0 \end{cases}$$

$$Z(x) = Y'(a)X(x) - X'(a)Y(x)$$

فرض می کنیم:

تابع  $Z(x)$  در معادله SL صدق می کند. (ترکیب خطی)

در رابطه با شرایط مرزی داریم:

$$Z'(a) = 0, \quad Z(a) = ?$$

$$Z(a) = Y'(a)X(a) - X'(a)Y(a) = 0$$

ادعا می کنیم:

ما داریم برای این که  $\alpha_1$  و  $\alpha_2$  صفر نشوند باید در همینان ضرایب آن ها صفرباشند و  $Z(a)$  در همینان ضرایب آن ها صفر است پس  $Z(a) = 0$  است. تا وقتیتقریباً یکتایی جواب معادله دینامیک و معلوم بودن  $0 = Z(a) = Z'(a)$  داریم:

$$Z(x) \equiv 0 \rightarrow Z'(a) = 0, \quad Z(a) = 0$$

$$\rightarrow Y(x) = \frac{Y'(a)}{X'(a)} X(x) = c X(x)$$

اگر شرایط مرزی از نوع نیومان باشد که  $X'(a) = 0$  باشد آن که این رابطه دچارمشکل می شود برای رفع این مشکل در این حالت یک تابع کمی  $Z(x)$ 

جدید تعریف می کنیم تا این مشکل برای آن پیش نیاید.

تقریباً  $k$ : نسبت Rayleigh-Cauchy (R.C) یک گران بالا برای کمترین مقدار

ویژه بوسیله دهده

$$\lambda = \frac{[-pX'X]_a^b + \int_a^b [pX'^2 - qX^2] dx}{\int_a^b rX^2 dx}$$

Subject:

Year:      Month:      Date:      ( )

با ضرب طرفین رابطه در  $X$  و انتگرالگیری داریم:

$$LX = -\lambda rX$$

$$\lambda = \frac{\int_a^b XLX dx}{\int_a^b rX^p dx}$$

$$X = \sum_n a_n X_n \rightarrow LX = \sum_m a_m LX_m = \sum_m a_m (-\lambda r X_m)$$

$$RQ = + \frac{\int_a^b \sum_m \sum_n a_n a_m \lambda_n r X_n X_m dx}{\sum_m \sum_n \int_a^b r a_n a_m X_n X_m dx}$$

$$= + \frac{\sum_n \int_a^b \lambda_n a_n^p r X_n^p dx}{\sum_n \int_a^b r a_n^p X_n^p dx}$$

اگر به جای  $\lambda_n$  ما  $\lambda_1$  را قرار دهیم داریم:

در این جای  $\lambda$  ما کمترین مقدار  $\lambda$  است قرار دهیم داریم:

$$RQ > \lambda_1 \frac{\sum_n \int_a^b a_n^p r X_n^p dx}{\sum_n \int_a^b a_n^p r X_n^p dx} = \lambda_1 \rightarrow RQ > \lambda_1$$

در  $RQ$  برای  $\lambda$  به بالا برای کمترین مقدار  $\lambda$  است.

در تعیین کمترین مقدار ویژه:

مثال ساده:  $p(x)=1$  ،  $q(x)=0$  ،  $r(x)=1$

$$\rightarrow \phi'' + \lambda \phi = 0 \quad \phi(0) = \phi(1) = 0$$

۱۹

Subject:



Year: Month: Date: ( )

$$\phi_n = \sin n\alpha$$


$$\lambda_n = n\pi / l$$

جواب دقیق:

تابع آزمون:



به نسبت Rayleigh جوابی از روش پایسم: جواب دقیق  $\lambda_n = n\pi / l$  است که در بینم خلی به شکل  $\lambda$  سهوی نزدیک است.



مثال: ایجادکننده ورودی یک آنتن:

$$Z_i = -\frac{1}{I(0)^2} \int_{-l}^l \int_{-l}^l I(z)I(z')k(z,z')dzdz'$$


$$k(z,z') = -j\omega\mu_0 \left[ 1 + \frac{1}{k^2} \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right] G_0(z,z')$$

تابع گرین

$$G_0(z,z') \rightarrow \frac{e^{-jkR_a}}{kR_a}$$

$$R_a = \sqrt{(z-z')^2 + a^2}$$

$k$  جریان هادی در مرکز مسیر در نظر گرفته شده



یک شافت آنتن  
سیستم کمتری را  
استیبل شده است.

Subject :

Year. Month. Date. ( )

که اگر  $I(z)$  را سینوسی فرض کنیم:

$$I(z) = I_0 \sin k(l - |z|)$$

تقریب Storer:

برای  $l = \frac{1}{\mu}$  داریم  $I(0) = I_0 \sin \pi = 0$  است و این در عبارت  $I(z)$  ضریب  $\frac{1}{\mu}$  دارد ایجاد مشکلی کند. این تقریب تا  $l = \frac{1}{\mu}$  قابل قبول است.  $I(0)$

که تقریب بعدی:

$$I(z) = I_0 \sin k(l - |z|) + A [1 - \cos k(l - |z|)]$$

این تقریب نیز در  $k l = 2\pi$  دچار مشکل می شود:  $I(0) = 0$

که تقریب Tai:

$$I(z) = I_0 \sin k(l - |z|) + B(l - |z|) \cos k(l - |z|)$$

این تقریب تکین ایجاد نمی کند

در این مسائل ما تلاش کردیم به کمک توابعی که با تقریب خوبی در شرایط مرزی صدق می کنند، راهی مسئله را تقریب بزنیم.

که نکته جانبی در مورد عملگر  $L$  و عملگر الحاقی  $L^*$ :

$$u L v - v L^* u = \frac{d}{dx} [P(u, v)]$$

دیفرانسیل کامل:

ساختار بالا  $u L v - v L^* u$  تولید یک دیفرانسیل کامل می کند.

جواب ما معادله اشغوم لیوویل همیشه معلوم نیستند. ما یک سری توابع حدس می زنیم که در شرایط مرزی صدق می کنند و توسط این توابع و نسبت Rayleigh سعی می کنیم تا مقدار ویژه  $\lambda$  را می بینیم کنیم. آن که باید تقریب به این توابع توابع ویژه می گویند.

گاهی از روی این تابع ویژه  $\lambda$  را می بینیم که (با تقریب) به Gram-Schmidt



۲۰۱

Subject:

Year: Month: Date: ( )

سعی کنیم توابع ویژه بعدی را نیز بیابیم و از روی آن‌ها  $\lambda_1$  و  $\lambda_2$  و ... را بیابیم.

ریاضی مهندسی: جلسه ۹۵ «۱۹ / ۷ / ۲۰۱۵»


$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = k \frac{\partial u}{\partial t} \quad \text{معادله دیفرانسیل (حرارت)}$$

Separation of variables:  $u(x,t) = X(x)T(t)$

$$\begin{cases} \frac{d^2 X}{dx^2} + \lambda X = 0 \\ \frac{dT}{dt} + \frac{\lambda}{k} T = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \text{شرط مرزی از نوع سوم (مفروضه)} \\ 0 < x < l \\ X(0) = 0 \\ \left. \frac{dX}{dx} + hX \right|_{x=l} = 0 \end{cases}$$

با استفاده از شرایط مرزی:  $X = A \sin \sqrt{\lambda} x + B \cos \sqrt{\lambda} x$   
 معادله جبری  $\tan \sqrt{\lambda} l = -\frac{\sqrt{\lambda}}{h}$

برای یافتن مقادیر ویژه  $\lambda$  باید معادله غیر جبری از نوع  $\tan z = -\frac{z}{a}$  را حل کنیم



مقادیر ویژه  $\lambda$  از حل این معادله غیر جبری بدست می آید و این از نوع ویژه‌گی‌ها  
 شرط مرزی سوم است. (Robine شرط)

Subject: \_\_\_\_\_  
 Year: \_\_\_\_\_ Month: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

تخمین توابع بر حسب توابع ویژه:  
 در مسئله اشتراک لیبیل

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \phi_n(x)$$

$$a_n = \frac{\int_a^b f(x) r(x) \phi_n(x) dx}{\int_a^b r(x) \phi_n^2(x) dx}$$

$$f(x) \approx \sum_{n=1}^N a_n \phi_n(x)$$

یگانه تخمین ←  
 که به ضریب  $a_n$  جدید تقریبی کنیم و به جای  
 $a_n$  ها از  $\alpha_n$  ها در رابطه بالا استفاده کنیم و نشان می‌دهیم برای این خطا  
 این رابطه می‌تواند شود با  $\alpha_n = a_n$  باشد.

$$f(x) \approx \sum_{n=1}^N \alpha_n \phi_n(x)$$

خطا تقریب:  $\epsilon = \int_a^b [f(x) - \sum_{n=1}^N \alpha_n \phi_n(x)] r(x) dx$

چون تابع وزنی  $r(x)$  همواره مثبت است در رابطه تقریب خطا اثر مثبتی ندارد.

$$\epsilon = \int_a^b [f^p(x) - p \sum_{n=1}^N \alpha_n f(x) \phi_n(x) + \sum_{m=1}^N \sum_{n=1}^N \alpha_n \alpha_m \phi_n(x) \phi_m(x)] \dots r(x) dx$$

$$\epsilon = \int_a^b f^p(x) r(x) dx + \sum_{n=1}^N \left[ \alpha_n \int_a^b \phi_n^p(x) r(x) dx - p \alpha_n \int_a^b \phi_n(x) f(x) r(x) dx \right]$$

این رابطه را می‌توانیم به صورت زیر بنویسیم

۱۱۱

Subject:

Year: Month: Date: ( )

$$\varepsilon = \int_a^b f^p(x) r(x) dx + \sum_{n=1}^N \left\{ \int_a^b \phi_n^p(x) r(x) dx \left[ \alpha_n - \frac{\int_a^b f \phi_n^p r dx}{\int_a^b \phi_n^p r dx} \right]^p \right. \\ \left. - \frac{\left( \int_a^b f \phi_n^p r dx \right)^p}{\int_a^b \phi_n^p r dx} \right\}$$

شرط مینیمم شدن خطا تقریب این است  $\alpha_n = a_n$  باشد

$$\varepsilon \geq 0 \quad \varepsilon = \int_a^b f^p(x) r(x) dx - \sum_{n=1}^N a_n^p \int_a^b \phi_n^p(x) r(x) dx$$

اگر  $\phi_n$  ها را نرمالیزه کرده باشیم آن‌ها:

$$\int_a^b \phi_n^p(x) r(x) dx = 1 \rightarrow N \rightarrow \infty \Rightarrow \int_a^b r(x) f^p(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^p$$

← این همان قضیه پارسوال است.

در یافتن جواب‌ها مسئله اشتراک لیوویل:

$$\frac{d}{dx} \left[ p(x) \frac{dy}{dx} \right] + (q(x) + \lambda r(x)) y = f(x) \quad \text{معادله غیر همگن}$$

$$\begin{cases} \alpha_1 y(a) + \alpha_2 y'(a) = 0 \\ \beta_1 y(b) + \beta_2 y'(b) = 0 \end{cases}$$

در این مسئله  $\lambda$  باید گویی معادله باشد

قضیه Wronskian: اگر  $y_1$  و  $y_2$  دو پاسخ معادله همگن فوق

Subject:

Year. Month. Date. ( )

باشند که به ترتیب در شرایط مرزی ابتدایی و انتهای صحنه‌های گسسته  $y_1$  فقط در شرط اول صحنه‌های گسسته  $y_1$  فقط در شرط دوم صحنه‌های گسسته  $y_2$  پیوسته باشند در این صورت:

$$\rho(x)W(y_1, y_2, x) = \text{ثابت} \neq 0$$

اگر ثابت صفر باشد  $y_1$  و  $y_2$  به هم وابسته می‌شوند و دیگر جواب‌های مستقل نیستند.

$$W(y_1, y_2, x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}$$

$$\frac{d}{dx}(py_1') + (q + \lambda r)y_1 = 0 \quad x y_2 \quad \text{اثبات:}$$

$$\frac{d}{dx}(py_2') + (q + \lambda r)y_2 = 0 \quad x y_1$$

$$\frac{d}{dx}[pW] \equiv 0 \rightarrow pW = cte \quad (p(x)W(y_1, y_2, x) = cte)$$

در حال هدف یافتن جواب معادله غیر همگن S.L. است:

$$y = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x) \quad \text{بفرض جواب به صورت روبه‌رو:}$$

$y_1$  و  $y_2$  به راحتی از حل معادله اشتروم لیوویک فقط در یک شرط مرزی صحنه‌های گسسته قابل محاسبه هستند.

$$y = u_1 y_1 + u_2 y_2 \rightarrow y' = (u_1 y_1' + u_2 y_2') + (u_1' y_1 + u_2' y_2)$$

چون  $u_1$  و  $u_2$  دو ضریب دلخواه هستند از این‌رو این را مفرد بنظر می‌گیریم

$$\text{فرض} \quad u_1 y_1' + u_2 y_2' = 0 \quad \text{به نوعی تلاش برای}$$

تشکیل معادلاتی است که جواب‌های آن  $u_1$  و  $u_2$  باشد. اگر این محدودیت لحاظ

نشود دستگاه معادلات با جواب‌های  $u_1$  و  $u_2$  بینهایت جواب دارد.

۱۳۵

Subject:

Year. Month. Date. ( )

$$y'' = (u_1 y_1' + u_2 y_2') + (u_1 y_1'' + u_2 y_2'')$$

$$\begin{cases} P y_1'' + P' y_1' + (q + \lambda r) y_1 = 0 \\ P y_2'' + P' y_2' + (q + \lambda r) y_2 = 0 \end{cases} \rightarrow P y'' + P' y' + (q + \lambda r) y = f(x)$$

از حد این دستگاه معادلات مقادیر  $u_1$  و  $u_2$  را یافته و با انتگرال گیری

$$\rightarrow u_1 [P y_1'' + P' y_1' + (q + \lambda r) y_1] + u_2 [P y_2'' + P' y_2' + (q + \lambda r) y_2] = \dots$$

$$= P(u_1 y_1' + u_2 y_2') = f(x)$$

$$\rightarrow \begin{cases} P(u_1 y_1' + u_2 y_2') = f(x) \\ u_1 y_1 + u_2 y_2 = 0 \end{cases}$$

از حد این دستگاه معادلات مقادیر  $u_1$  و  $u_2$  را یافته و با انتگرال گیری

$$u_1 = \frac{-y_2 f(x)}{PW(y_1, y_2)}$$

$$u_1 = \frac{1}{PW} \int_a^b f(x) y_2(x) dx \quad x > a$$

$$u_2 = \frac{y_1 f(x)}{PW(y_1, y_2)}$$

$$u_2 = \frac{1}{PW} \int_a^x f(x) y_1(x) dx$$

با ضرب  $u_1$  در  $y_1$  و ضرب  $u_2$  در  $y_2$  داریم:

$$y = u_1 y_1 + u_2 y_2 = \frac{1}{PW} \begin{cases} \int_a^x f(x) y_1(x) y_2(x) dx, & x > a \\ \int_x^b f(x) y_2(x) y_1(x) dx, & x < a \end{cases}$$

Subject: \_\_\_\_\_

Year: \_\_\_\_\_ Month: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

۲۴

در بیان دیگر:

$$g(\alpha, \alpha', \lambda) = \frac{1}{PW} \begin{cases} y_1(\alpha) y_p(\alpha') & \alpha < \alpha' \\ y_1(\alpha') y_p(\alpha) & \alpha > \alpha' \end{cases}$$

$$\rightarrow y(\alpha) = \int_a^b g(\alpha, \alpha', \lambda) f(\alpha') d\alpha'$$

اگر داشته باشیم:

$$L = \frac{d}{d\alpha} \left[ p \frac{d}{d\alpha} \right] + (q + \lambda r)$$

اگر که معادله اشتراک بود یک ضریب ثابت به صورت  
رو به روششان داده شود:

$$Ly = f(\alpha) \Rightarrow y(\alpha) = \int_a^b g(\alpha, \alpha', \lambda) f(\alpha') d\alpha'$$

$$\rightarrow Ly = \int_a^b \left\{ \frac{d}{d\alpha} \left[ p \frac{d}{d\alpha} g \right] + (q + \lambda r) g \right\} f(\alpha') d\alpha' = f(\alpha)$$

$\delta(\alpha, \alpha')$

$\delta(\alpha, \alpha')$  عبارت دلف کوشه را


نام گذاری می کنیم.

$$\rightarrow \int_a^b \delta(\alpha, \alpha') f(\alpha') d\alpha' = f(\alpha)$$

داریم:

برای  $\delta(\alpha, \alpha')$  خواصی در نظر می گیریم.

فرض کنیم  $\alpha$  عددی بین  $a$  و  $b$  باشد و نسبت به متغیر انتگرال گیری مثل  
عزت ثابت رفتار کند. دو تابع دلخواه  $f(\alpha)$  و  $f^*(\alpha)$  در نقطه  $\alpha$   
با هم برابرند در نظر می گیریم:



$$f(\alpha) = f^*(\alpha)$$

۱۳۷

Subject

Year . Month . Date . ( )

$$\begin{cases} \int_a^b \delta(x, \bar{x}) f(\bar{x}) d\bar{x} = f(x) \\ \int_a^b \delta(x, \bar{x}) f'(\bar{x}) d\bar{x} = f'(x) \end{cases}, f(x) = f'(x)$$

از کم کردن این دو داریم:

$$\rightarrow \int_a^b \delta(x, \bar{x}) [f(\bar{x}) - f'(\bar{x})] d\bar{x} = 0$$

چون  $f$  و  $f'$  دو تابع دلخواهند پس برای این که این انتگرال صفر بشود داریم:

$$x' \neq x \rightarrow \delta(x, x') = 0 \quad \text{خاصیت اول تابع } \delta(x, x')$$

$$\int_a^b \delta(x, \bar{x}) f(\bar{x}) d\bar{x} = f(x) \quad \text{اگر } f(x) \equiv 1 \text{ قرار دهیم داریم:}$$

$$\int_a^b \delta(x, \bar{x}) d\bar{x} = 1 \quad \text{خاصیت دوم تابع } \delta(x, x')$$

این دو ویژگی تابع  $\delta(x, x')$  را به دست دلتای دیراک می‌برد.

$$\frac{d}{dx} \left[ p(x) \frac{dg}{dx} \right] + (q(x) + \lambda(x)) g = \delta(x, x')$$

در این جا  $\delta(x, x')$

"تابع" دلتای دیراک است و  $g$  تابع گرین مسئله است.  
 $\delta(x, x')$  از نوع توابع عادی نیست بلکه از نوع توزیع است. (Distribution)

اگر ما این معادله را حل کنیم به جواب مسئله  $Ly = f(x)$  برسیم. به معادله بالا معادله توزیع می‌گوئیم.


Subject: \_\_\_\_\_  
 Year: \_\_\_\_\_ Month: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

برای  $x \neq x'$  داریم:  $\frac{d}{dx} [p \frac{dg}{dx}] + (q + \lambda r)g = 0$

برای  $x = x'$  باید از خاصیت  $\int \delta(x, x') dx = 1$  برای حد معلوم استفاده کنیم که گویا غیر عادی است.  
 Distribution or a

Generalized function که تئوری توزیع  
 که توابع آزمون (Testing function):


مجموعه توابع آزمون در محدوده  $a < x < b$  صفر است و مشتق از هر مرتبه‌ای را داراست.



آیا چنین توابعی وجود دارند؟

«bounded support» و در سایر جاها صفر  $e^{-(x^2-1)}$

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{-(x-a)(x-b)} & a < x < b \\ 0 & x \leq a, x \geq b \end{cases}$$



در این توابع ترم  $e^{-\frac{1}{x^2}}$  آنقدر سریع به سمت صفر حرکت می‌کند که از هر نوع واگرایی توسط ترم‌های  $\frac{1}{x}$  جلوگیری می‌کند. پس همواره در تمامی نقاط حتی نقاط  $a$  و  $b$  هم بینهایت مشتق پذیر هستیم.

که توابع آزمون در نقاط  $a$  و  $b$  بسط تیلور ندارند زیرا مشتقاتشان در این نقاط تا بینهایت صفر است.

که مرجع این بحث کتاب Griffel است  
 ریاضی مهندسی: جلد ۴

«19, 17, 17»

توزیع‌ها - تابع دلتای دیراکی



Subject: مخ  
 Year: \_\_\_\_\_ Month: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

$\nabla^2 \left( \frac{1}{|\bar{x}|} \right) = -4\pi \delta(\bar{x})$

قفلیه: (علامت خط بالا  $\bar{x}$  نشان برداری بودن  $\bar{x}$  است.)

$Lg = \delta(x, \bar{x})$  : دلتا دیراک هم یک توزیع است.

$\langle f, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) \delta(x, \bar{x}) dx$


$f$  توزیع مورد نظر در این جا همان ... توزیع دلتای دیراک است.  
 $\varphi$  هم یک تابع آزمون است.

$\delta(x, \bar{x}) \xrightarrow{\text{نشانست}} \phi(x) \xleftarrow{\text{عدد}}$   
 توزیع ری نشانست از مجموع توابع آزمون با اعدادها باشد.

$\langle \delta, a\varphi_1 + b\varphi_2 \rangle \rightarrow a\varphi_1(0) + b\varphi_2(0)$  خاصیت خطی بودن:

$\text{supp}(f) = \{x | f(x) \neq 0\}$  Support:

تابع آزمون: تابعی است بینهایت بار مشتق پذیر و با  $\text{Supp}$  محدود است. (Bounded support).



توزیع: یک فانکشنال خطی پیوسته است.

$\delta(x, \bar{x}) : \phi(x) \rightarrow \int \delta(x, \bar{x}) \phi(x) dx$

توزیع      فضای نمونه      فانکشنال      عدد

توابع آزمون

Subject:

Year. Month. Date. ( )

که رابطه  $\int_{-\infty}^{\infty} |\phi(x)|^2 dx$  چونه خطی نیست پس یک توزیع نیست.

که دنباله‌ای همگرا از توابع از هون  $\phi_n(x)$  را در نظر می‌گیریم. اگر تابعی مورد نظر هر دنباله همگرا از توابع از هون را به دنباله‌ای همگرا از اعداد پیوسته گوئیم.

$$\begin{aligned} \phi_n &\rightarrow \phi \\ F(\phi_n) &\rightarrow F(\phi) \end{aligned}$$

که نکته: هر توزیع حویک تابع معمولی است.

$$dn(x) = \frac{n}{\pi(1+n^2x^2)} \rightarrow \text{یک توزیع معمولی یک تابع معمولی است.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} dn(x) = \delta(x) \rightarrow \text{توزیع دلتا دیراک}$$


$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}\alpha} e^{-\frac{(x-x')^2}{\alpha^2}} = \delta(x-x') \rightarrow \text{تابع دلتا دیراک}$$

که تساوی دو توزیع: اگر روی هر تابع از هون دلخواه اثر کمتر و حاصل نداشت یکسان باشد.

$$\langle f, \phi(x) \rangle = \langle g, \phi(x) \rangle$$

که اگر فانکشنال غیر خطی باشد دیگر بهمان توزیع نمی‌گوئیم. تمام تعاریف در توزیع باید تابع از هون یک‌هوشود.

که ضرب یک تابع در یک توزیع:



FI

Subject:

Year:      Month:      Date: ( )

$$F(\phi) : \phi \rightarrow F(\phi)$$

یک عدد      فضای تابعی

$$\langle h f, \varphi(x) \rangle = \int_a^b h f \varphi(x) = \langle f, h \varphi(x) \rangle$$

تابع ازبوس      تابع ازبوس

$$\langle f, \varphi(x) \rangle = - \langle f, \varphi'(x) \rangle$$

در حالتی که تابع مشتق

$$\int_a^b f \varphi(x) dx = \left[ f \varphi(x) \right]_a^b - \int_a^b f \frac{d\varphi(x)}{dx} dx$$

تابع ازبوس supp محدود دارد

$$\delta : \langle \delta, \varphi(x) \rangle = - \langle \delta, \varphi'(x) \rangle = - \varphi'(0)$$

$$\langle f^{(m)}, \varphi(x) \rangle = (-1)^m \langle f, \varphi^{(m)}(x) \rangle$$

در حالتی

$$\text{Heaviside} : H(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$$

و با مفهوم تفریق توزیع نشان می‌دهیم که توزیع مشتق تابع پوله واحد است.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dH}{dx} \varphi(x) dx = \left[ \varphi H \right]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} H(x) \frac{d\varphi}{dx} dx$$


تابع ازبوس supp محدود دارد

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} H(x) \frac{d\varphi}{dx} dx = - \int_0^M \frac{d\varphi}{dx} dx = - [\varphi(M) - \varphi(0)] = \varphi(0)$$

مکان عمل توزیع دلتای

Subject:

Year. Month. Date. ( )



$$\langle (hP)'; \varphi \rangle = \langle hP, -\varphi' \rangle = \langle P, -h\varphi' \rangle = \dots$$

$$= \langle P, -(h\varphi)' + \varphi h' \rangle = \langle P, \varphi h' \rangle + \langle P, -(h\varphi)' \rangle = \dots$$

$$= \langle h'P, \varphi \rangle + \langle P', h\varphi \rangle = \langle h'P, \varphi \rangle + \langle hP', \varphi \rangle = \dots$$

$$= \langle h'P + hP', \varphi \rangle$$

و  $P'$  یک توزیع است که توسط توابع آزمون باید توضیح داده شود

و Gelfond و Dirac در مورد این نظریه توزیع جدید کتاب دارند.

و هر خاصیت تابع دلتای دیراک باید برای تابع آزمون نشان داده

شود:

$$\langle \delta(ax), \varphi(x) \rangle = \langle \frac{1}{|a|} \delta(x), \varphi(x) \rangle$$

$$\langle \delta(x-a), \varphi(x) \rangle = \varphi(a)$$

$$\langle \delta(f(x)), \varphi(x) \rangle = \left( \sum \frac{1}{|f'(x_p)|} \delta(x), \varphi(x) \right)$$

← ریشه های  $f(x)$

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-j\omega x} dx$$

یافتن توزیع دلتا دیراک از فرمول های تبدیل فوریه:

FPU

Subject:

Year. Month. Date. ( )

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{j\omega x} d\omega$$

$$\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x') e^{-j\omega x'} dx' \right] e^{j\omega x} d\omega = \dots$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{+j\omega(x-x')} d\omega \right] f(x') dx'$$

توزیع دیراک  $\delta(x-x')$ 

$$\delta(x-x') = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega(x-x')} d\omega$$

در مورد این توزیع ها خوب سخن گفته اند Courant - Hilbert

که  $\bar{x} = (x_1, x_2, x_3)$  بردار است

$$\langle \nabla^p \frac{1}{|\bar{x}|}, \phi(\bar{x}) \rangle = -F\lambda \phi(\bar{0})$$

که نمایش ریاضی یک قضیه:

$$\nabla^p \frac{1}{|\bar{x}|} = -F\lambda \delta(\bar{x})$$


که نمایش ریاضی دیگری یک قضیه:

$$\left( \nabla^p \frac{1}{|\bar{x}|}, \phi(\bar{x}) \right) = \left( \frac{1}{|\bar{x}|}, \nabla^p \phi(\bar{x}) \right) = -F\lambda \phi(\bar{0})$$

چون  $\nabla^p$  مشتق مرتبه دوم است نتیجه گیری بالا بلا مانع است

Subject :

Year . Month . Date . ( )



$$\int_V \frac{1}{|\vec{x}|} \nabla^p \phi(\vec{x}) dV = \dots$$

$$= \int_{V_E} \frac{1}{|\vec{x}|} \nabla^p \phi(\vec{x}) dV + \int_{V_E^c} \frac{1}{|\vec{x}|} \nabla^p \phi(\vec{x}) dV = \dots$$

روی حجم هائینورزده  $\nabla^p \frac{1}{|\vec{x}|} = 0$  . اما  $\nabla^p \frac{1}{|\vec{x}|} = 0$   $\vec{x} \neq 0 \rightarrow$

$$\dots = \int_{V_E} \frac{1}{|\vec{x}|} \nabla^p \phi(\vec{x}) dV + \int_{V_E^c} \nabla^p \frac{1}{|\vec{x}|} \phi(\vec{x}) dV + \dots$$

$$+ \left[ \int_{V_E^c} \frac{1}{|\vec{x}|} \nabla^p \phi(\vec{x}) dV - \int_{V_E^c} \phi(\vec{x}) \nabla^p \frac{1}{|\vec{x}|} dV \right] =$$

$$\int_{\partial V} (f \nabla^p g - g \nabla^p f) dV = \int_{\partial V} (f \vec{\nabla} g - g \vec{\nabla} f) \cdot d\vec{S}$$

تقسیم حجم  
گرتین:

$$= \int_{V_E} \frac{1}{|\vec{x}|} \nabla^p \phi(\vec{x}) dV \quad \textcircled{1} + \int_{V_E^c} \nabla^p \frac{1}{|\vec{x}|} \phi(\vec{x}) dV \quad \textcircled{2} + \dots$$

$$+ \int_S (-\hat{r}) \cdot \left[ \frac{1}{|\vec{x}|} \vec{\nabla} \phi - \phi(\vec{x}) \vec{\nabla} \left( \frac{1}{|\vec{x}|} \right) \right] dS$$

(۳)
(۴)

FΩ

Subject:

Year:

Month:

Date:

$$\epsilon \rightarrow 0 \quad |\vec{\nabla} \phi| \leq B, \quad |\nabla^p \phi| \leq B'$$

$$\textcircled{1} \int_{\sqrt{\epsilon}} \frac{1}{|\vec{x}|} \nabla^p \phi d\vec{x} = \int_0^{\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{\epsilon} \frac{1}{r} \nabla^p \phi r^2 dr d\theta d\varphi =$$

$\downarrow$   
 $dV$  حجم

$$= \iiint \nabla^p \phi r^2 dr d\theta d\varphi \leq B' \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_0^{\epsilon} r^2 dr = 0$$

دو  $\nabla^p \frac{1}{|\vec{x}|}$  در  $\vec{x} \neq 0$  همواره یکسان است و انتگرال هم صفر است.

$$\textcircled{14} \int_S (-\hat{r}) \cdot \left[ \frac{1}{|\vec{x}'|} \vec{\nabla} \phi \right] dS = \iiint (-\hat{r}) \cdot \left[ \frac{1}{r} \vec{\nabla} \phi \right] r^2 d\theta d\varphi =$$

$$= \lim_{r \rightarrow 0} \int_0^{\pi} \int_0^{\pi} (-\hat{r}) \cdot \vec{\nabla} \phi r^2 d\theta d\varphi = 0$$

چون  $\vec{\nabla} \phi$  گزینا راست و  $\epsilon \rightarrow 0$  می شود صفر است پس این انتگرال نیز صفر است.

$$\textcircled{15} \int_S (-\hat{r}) \cdot \left[ \phi(\vec{x}) \vec{\nabla} \frac{1}{|\vec{x}|} \right] dS = \int_0^{\pi} \int_0^{\pi} (-\phi) r^2 d\theta d\varphi =$$

$\underbrace{\quad \quad \quad}_{-\phi \frac{-\hat{r}}{r^2}} \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{r^2 \sin \theta d\theta d\varphi}$

$$= -4\pi \phi(0,0,0) \rightarrow \left\langle \nabla^p \frac{1}{|\vec{x}|}, \phi \right\rangle = -4\pi \phi(\vec{0})$$

$$\nabla^p \frac{1}{|\vec{x}|} = -4\pi \delta(\vec{x}) \quad \left\langle \delta(\vec{x}), \phi \right\rangle = \phi(\vec{0}) \quad \text{درست است}$$

Subject:

Year. Month. Date. ( )

«۱۹ / ۷ / ۲۹»

جلسه ۷

ریاضی مهندسی:

$$\left\langle \frac{1}{|\vec{x}'|}, \nabla^2 \psi \right\rangle = -4\pi \psi(0,0,0)$$

که نشان دادیم:

$$\nabla^2 \psi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

اگر طرفین را در  $\frac{1}{|\vec{x}'|}$  ضرب کنیم و انتگرال گیری کنیم داریم:

$$\frac{1}{|\vec{x}'|} \nabla^2 \psi = \frac{1}{|\vec{x}'|} \frac{-\rho(\vec{x}', y', z')}{\epsilon_0}$$


$$\int_V \frac{1}{|\vec{x}'|} \nabla^2 \psi d\tau' = \int_V \frac{1}{|\vec{x}'|} \frac{\rho(\vec{x}', y', z')}{\epsilon_0} d\tau'$$

$$-4\pi \psi(0,0,0) \rightarrow \psi(0,0,0) = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{x}', y', z')}{|\vec{x}'|} d\tau'$$

$$\psi(\vec{x}) = \int \frac{\rho(\vec{x}', y', z')}{4\pi \epsilon_0 |\vec{x}' - \vec{x}|} d\tau'$$

فرم کلی تر جواب:

که برای متغیرها از پتانسیل و بردار ثابت‌ها بدون پیوسته استفاده کرده ایم.



$$\nabla^2 \psi = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \rightarrow \text{منبع}$$

$$\nabla^2 G = -\delta(\vec{x} - \vec{x}') \text{ یا } \delta_{\mu\nu} \delta(\vec{x} - \vec{x}')$$

$$\int_V (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) d\tau = \oint_{\partial V} (f \vec{\nabla} g - g \vec{\nabla} f) \cdot d\vec{s}$$



۴۷

Subject:

Year. Month. Date. ( )

$$f = \rho, \quad g = G$$


$$\int [\rho(\alpha') \nabla'^2 G(\bar{x}, \bar{x}') - G \nabla'^2 \rho] d\alpha' = \dots$$

در  $\nabla'$  مربوط به  
متغیرهای پتانسیل  
میباشد.

$$= \oint [\rho \vec{\nabla}' G(\bar{x}, \bar{x}') - G \vec{\nabla}' \rho] \cdot d\vec{s}'$$

$$\nabla'^2 G(\bar{x}, \bar{x}') = -\delta(\bar{x}, \bar{x}') \quad \text{نماد: } d\alpha'$$

$$\rightarrow \rho(\alpha) = \int \frac{G(\bar{x}, \bar{x}') \rho(\alpha')}{\epsilon} d\alpha' + \int_{S'} [\rho \vec{\nabla}' G + G \vec{\nabla}' \rho] \cdot d\vec{s}'$$



اثر منبع

شرط مرزی

که اگر حجم  $V$  به سمت بی نهایت برود اثر شرایط مرزی از بین می رود  
که با داشتن شرایط مرزی و منابع داخل حجم  $V$  می توان میدان داخل حجم را یافت.

$$\vec{\nabla}' \rho \cdot d\vec{s}' = \vec{\nabla}' \rho \cdot \hat{n} d\alpha' = \frac{\partial \rho}{\partial n} d\alpha'$$

که شرط مرزی نیومان:

که اگر  $\rho$  معلوم باشد شرط مرزی دیریکله صادق است.

$$\rho = a$$

$$\nabla'^2 G = -\delta(\bar{x} - \bar{x}') \rightarrow G|_{\text{مرز}} = 0$$

شرط مرزی  $G$  همواره باید معلوم باشد تا بتوان تابع گرین آن مسئله را یافت  
این شرط مرزی از نوع شرط مرزی خود مسئله است. مثلاً اگر شرط مرزی  
مسئله دیریکله باشد شرط مرزی  $G$  هم دیریکله است و همین طور برای  
شرط مرزی نیومان.

Subject:


Year: Month: Date: ( )

که برای یافتن تابع گرین مسئله دو چیز لازم است ← اینرا تئور مثلاً لاپلاس یا هلمهولتز  
 ← شرایط مرزی دیریکله یا نیومان

که معادله هلمهولتز:

$$\nabla^2 \bar{A} + k^2 \bar{A} = -\mu \bar{J} \quad \left\{ \begin{array}{l} \bar{A} = \mu g \hat{a} \\ \bar{J} = \delta \delta(\bar{R} - \bar{R}') \end{array} \right.$$

لاپلاسین برداری



$$\nabla^2 \bar{A}_1 + k^2 \bar{A}_1 = -\mu \hat{a} \delta(\bar{R} - \bar{R}') \quad \leftarrow \text{برداریکه در امتداد J}$$

که تبدیل مسئله به معادله اسکالر (Scalar)

$$\nabla^2 g + k^2 g = -\delta(\bar{R} - \bar{R}')$$

$$\bar{R} \neq \bar{R}' \rightarrow \nabla^2 g + k^2 g = 0 \quad |\bar{R} - \bar{R}'| = r$$

که اینجا مسئله را برای  $\bar{R} \neq \bar{R}'$  حل می کنیم سپس برای نقطه  $\bar{R} = \bar{R}'$  فکری

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial g}{\partial r} \right) + k^2 g = 0 \rightarrow g = C \frac{e^{-jkr}}{r}$$

موج بیرون رویا  
outgoing

که موج درون رویا هم در معادله صدق می کند که ما آن را در نظر نمی گیریم زیرا معنای  
 کارا در فرض کرده ایم و شرط مرزی Sommerfeld در بینهایت  
 صادق است.

که برای یافتن جعبول C باید از حجم V زمانیکه  $r \rightarrow \infty$  کنوا انتگرال  
 بگیریم تا C محاسبه شود.



۱۳۹

Subject:

Year: Month: Date: ( )

$$\int_V (\nabla^2 g + k^2 g) dV = -1 \rightarrow \int_V \nabla \cdot (\nabla g) dV = -1$$

$\int_V r^2 \sin\theta d\theta d\phi dr$   
 dΩ زاویه قطبی

$$\rightarrow \int_S \nabla g \cdot d\vec{s} = \int_S \hat{r} \frac{\partial g}{\partial r} \cdot \hat{r} d\Omega = -1$$

با جایگذاری  $\rightarrow k^2 C = -1 \rightarrow C = \frac{-1}{k^2}$

$$g = \frac{e^{-jk r}}{4\pi r} \rightarrow \vec{A} = \int_V \mu \frac{e^{-jk |\vec{R} - \vec{R}'|}}{4\pi |\vec{R} - \vec{R}'|} dV'$$

در الکترو استاتیک عملگر دلتا لاپلاس بود و در الکترو دینامیک همان هلمهولتز است. روشی یافتن تابع گرین برای هر دو مشابه هم است.

$$\mathcal{L}u = f(x)$$

در حل معادلات غیر همگن: به کمک توابع ویژه و مقادیر ویژه عملگر  $\mathcal{L}$  مسئله را بررسی می کنیم:

$$\mathcal{L}\phi_n = \lambda_n \phi_n$$

اجزای توابع ویژه و مقادیر ویژه عملگر  $\mathcal{L}$  را از رابطه روبه روی می یابیم:

$$u = \sum \alpha_n \phi_n \quad , \quad f = \sum \beta_n \phi_n$$

موجود است  $\leftarrow$   $\beta_n$   $\leftarrow$  موجود است

توابع  $u$  و  $f(x)$  را بر حسب توابع ویژه  $\phi_n$  بسط می دهیم:

$$\beta_n = \langle f, \phi_n \rangle$$

Subject:

Year. Month. Date. ( )

$$L(\sum \alpha_n \phi_n) = \sum \beta_n \phi_n \rightarrow \sum L(\alpha_n \phi_n) = \sum \alpha_n L(\phi_n)$$

$$= \sum \alpha_n \lambda_n \phi_n = \sum \beta_n \phi_n \rightarrow \sum (\alpha_n \lambda_n - \beta_n) \phi_n = 0$$

در  $\phi_n$  رابطه بالا را ضرب می‌کنیم و انتگرال می‌گیریم داریم: (در این جا از تقارن توابع ویژه استفاده کرده ایم)

$$\alpha_n = \frac{\beta_n}{\lambda_n} \rightarrow u = \sum \frac{\beta_n}{\lambda_n} \phi_n$$

$$u(x) = \sum \frac{\phi_n(x)}{\lambda_n} \int \phi_n^*(x') f(x') dx' = \dots$$

ممكن است  $\phi_n(x)$  مختلف باشد

$$= \sum \int \frac{\phi_n(x) \phi_n^*(x') f(x')}{\lambda_n} dx' = \int \underbrace{\sum \frac{\phi_n(x) \phi_n^*(x')}{\lambda_n}}_{\text{تابع گرین است}} f(x') dx'$$

$$G(\bar{x}, \bar{x}') = \sum_n \frac{\phi_n(\bar{x}) \phi_n^*(\bar{x}')}{\lambda_n}$$

تابع گرین است  
یک بیان دیگر از تابع گرین:

یک راه کلی یافتن تابع گرین یافتن توابع ویژه و مقادیر ویژه عملگر است.  
عملگرهای معادلات درجه دوم را حتی به عملگر اشتروم لیوویک تبدیل می‌شوند

این حل برای دو وسیله بعدی هم معتبر است.  
اگر معادله ما به صورت روبرو باشد آن گاه:

$$L u(\bar{x}) + \lambda u(\bar{x}) = f(\bar{x}) \rightarrow G(\bar{x}, \bar{x}') = \sum \frac{\phi_n(\bar{x}) \phi_n^*(\bar{x}')}{\lambda_n - \lambda}$$

Subject: ۵۱  
 Year: \_\_\_\_\_ Month: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

مثال:  $\frac{d^2 G}{dx^2} + k^2 G = \delta(x - x')$   $x \in (0, l)$   
 پاسخ معادله همکنش را انتخاب می‌نماییم:

$x \neq x' \rightarrow \frac{d^2 G}{dx^2} + k^2 G = 0 \rightarrow G = \begin{cases} A \sin kx & x < x' \\ B \sin k(l-x) & x > x' \end{cases}$   
 در شرط مرز انتخاب می‌نماییم که در شرط مرزی انتهای صفر می‌گردد.

دو شرط داریم:  
 ۱- شرط پیوستگی تابع گریه در  $x = x'$ :  $A \sin kx' = B \sin k(l-x')$   
 ۲- شرط منبع:

انتگرال حول  $x'$  و برابر با اقرار می‌دهیم:  
 $\left. \frac{dG}{dx} \right|_{x'}^+ = 1$

$G = \frac{-1}{k \sin kl} \begin{cases} \sin kx \sin k(l-x) & x < x' \\ \sin kx' \sin k(l-x) & x > x' \end{cases}$

تابع گریه نسبت به  $x$  و  $x'$  متقارن است.  
 در حل مسائل پیچیده به سرعت می‌توانیم یک حدس اولیه برای جواب بزنیم.  
 فقط در یکی از شرایط مرزی صفر می‌گردد. سپس به دلیل تقارن توابع گریه  
 به فرم کلی جواب می‌رسیم و فقط باید ضرایب را پیدا کنیم.

$G = \begin{cases} A \sin kx \\ B \sin k(l-x) \end{cases} \rightarrow G = \begin{cases} \sin kx \sin k(l-x) \\ \sin kx' \sin k(l-x) \end{cases}$  ضریب

مثال: عملگر  $\frac{d^2}{dx^2}$  در بازه  $[0, l]$ : (دیریکله)

$\frac{d^2 f}{dx^2} = -\lambda f$

داده:  $\lambda_n = n^2 \pi^2, \phi_n = \sqrt{P} \sin n\pi x$

Subject:

Year. Month. Date. ( )

تابع گرین بر حسب تابع و نرزه:

$$G(x, x') = \frac{1}{n^2} \sum \frac{\sin n\pi x \sin n\pi x'}{n^2}$$

حل دوم:

$$\frac{d^2 P}{dx^2} = 0 \quad 0 < x < 1 \rightarrow \frac{d^2 g}{dx^2} = \delta(x - x')$$

در شرط مرزی اول صحت می کند

$$\begin{cases} y_1 = x \\ y_2 = 1 - x \end{cases}$$

در شرط مرزی دوم صحت می کند

$W(y_1, y_2) = -1 \rightarrow G(x, x') = \frac{1}{-1} \begin{cases} x(1-x') & x < x' \\ x'(1-x) & x > x' \end{cases}$

با توجه به این جدول دو جواب کاملاً متفاوت (از نظر ظاهری) یافتیم که هر کدام برای یک جا کاربرد دارد و هر دو به نسبت هم همگرا هستند.

در حالت غیر همگرا:

$$L \equiv f_0(t) \frac{d^p}{dt^p} + f_1(t) \frac{d}{dt} + f_2(t)$$

یافتن تابع گرین:

$$f_0 \frac{d^p G}{dt^p} + f_1 \frac{dG}{dt} + f_2 G = \delta(t - t')$$

در بازه  $(t'_- , t'_+)$  انتگرال می گیریم:

$$\int_{t'_-}^{t'_+} f_0 \frac{d^p G}{dt^p} dt + \int_{t'_-}^{t'_+} f_1 \frac{dG}{dt} dt + \int_{t'_-}^{t'_+} f_2 G dt = 1$$

پوسته  
گراگذار

در داخل پوسته  $G$  :  $G$  در  $t = t'$  پیوسته است  
 در  $t = t'$  مشتق  $G$  گراگذار است.

۵۳

Subject:

Year:      Month:      Date: ( )

جزء به جزء  $\rightarrow f_0 \frac{dG}{dt} \Big|_{t'_-}^{t'_+} - \int_{t'_-}^{t'_+} \frac{dG}{dt} \frac{df_0}{dt} dt = 1$

کراندار

$\rightarrow f_0 \frac{dG}{dt} \Big|_{t'_-}^{t'_+} = 1 \rightarrow \boxed{\frac{dG}{dt} \Big|_{t'_-}^{t'_+} = \frac{1}{f_0(t')}}$

در معادله معادله را حل می کنیم و دو جواب  $x_1(t)$  و  $x_2(t)$  می یابیم یکی در شرط مرزی اولی و دیگری در شرط مرزی دومی صادق است.

$$G(t, t') = \begin{cases} a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t) & t > t' \\ b_1 x_1(t) + b_2 x_2(t) & t < t' \end{cases}$$

$a_1$  و  $a_2$  و  $b_1$  و  $b_2$  توانی بر حسب  $t'$  هستند.

از دو شرطی که برای تابع  $G$  داریم استفاده می کنیم:  $G|_{t'=t} = \dots$

$$\left\{ \frac{dG}{dt} \Big|_{t'_-}^{t'_+} = \frac{1}{f_0(t')} \right.$$

$$G(t, t') = b_1 x_1(t) + b_2 x_2(t) - \left[ \frac{x_1(t) x_2(t') - x_2(t) x_1(t')}{f_0(t') W(t')} \right] \quad t > t'$$

$$G(t, t') = b_1 x_1(t) + b_2 x_2(t) \quad t < t'$$

در حال توسط دو شرط مرزی مسئله مقادیر  $b_1$  و  $b_2$  را می یابیم.

Subject.

Year. Month. Date. ( )

مثال:  $L \equiv \frac{d^2}{dx^2} + \omega_0^2$  در فاصله [۰، ۱] (شرط دیریکله)

$$x_1 = \sin \omega_0 t \quad , \quad x_2 = \sin \omega_0 (1-t)$$

$$G(t, t') = \begin{cases} \frac{\sin \omega_0 (1-t) \sin \omega_0 t'}{\omega_0 \sin \omega_0} & t > t' \\ \frac{\sin \omega_0 (1-t') \sin \omega_0 t}{\omega_0 \sin \omega_0} & t < t' \end{cases}$$

ریاضی مهندسی: جلسه  $\Delta$  «۱۹، ۱۸، ۱۷»

تعارف تابع گرین

تابع گرین برای معادله پولسون:

که تابع گرین برای عملگر با شرایط مرزی خاصی بدست می آید. معادله شرط مرزی تابع گرین چه در حالت دیریکله و چه در حالت نینومان منفر در نظر گرفته می شود.

که راه های یافتن تابع گرین عملگر مربوطه:

- ۱- حل معادله همگن و انتگرال گیری حول منبع
- ۲- در نظر گرفتن یک ناحیه ایپسیلونی اطراف منبع و استفاده از قضیه دوم گرین

۳- به کمک توابع ویژه عملگر مربوطه

۴- به کمک قضیه رونسکی با فرض دو جواب  $x_1$  و  $x_2$  که هر کدام در یک شرط مرزی به ترتیب صفرها می گذرد. در این جا از پیوستگی تابع گرین و گسستگی محدود مشتق تابع گرین نیز کمک می گیریم.



۵۵

Subject:

Year: Month: Date: ( )


$$\int (\mu \nabla^2 v - v \nabla^2 \mu) dV = \oint_S (\mu \vec{\nabla} v + v \vec{\nabla} \mu) \cdot d\vec{S}$$

« دو بگری »




$$\int (\mu \nabla^2 v - v \nabla^2 \mu) dS = \oint_C (\mu \vec{\nabla} v + v \vec{\nabla} \mu) \cdot d\vec{l}$$

« دو بگری »



$$\nabla^2 G(\vec{r}, \vec{r}_0) = \delta(\vec{r} - \vec{r}_0)$$



برای یافتن تفاوت تابع گرین دو معادله توزیع فرض می‌کنیم:

$$\nabla^2 G(\vec{R}, \vec{R}_{01}) = \delta(\vec{R} - \vec{R}_{01})$$

$$\nabla^2 G(\vec{R}, \vec{R}_{02}) = \delta(\vec{R} - \vec{R}_{02})$$

$$u = G(\vec{R}, \vec{R}_{01})$$

$$v = G(\vec{R}, \vec{R}_{02})$$


$$\text{فرض دوم گرین: } \int [G(\vec{R}, \vec{R}_{01}) \delta(\vec{R} - \vec{R}_{02}) - G(\vec{R}, \vec{R}_{02}) \delta(\vec{R} - \vec{R}_{01})] dV$$

$$= \oint_S [G(\vec{R}, \vec{R}_{01}) \frac{\partial G(\vec{R}, \vec{R}_{02})}{\partial n} - G(\vec{R}, \vec{R}_{02}) \frac{\partial G(\vec{R}, \vec{R}_{01})}{\partial n}] dS$$

$$\vec{\nabla} G \cdot \hat{n} = \frac{\partial G}{\partial n}$$

طرف دوم معادله بالا رو مرتبه با شوی که در هر صورتی صفر است:

Subject: \_\_\_\_\_  
 Year: \_\_\_\_\_ Month: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_



که چه شرط قضا آزاد  $(G_0)$  یا دیرنگه  $(G_1)$  یا نیومان  $(G_2)$  یا مخلوط  $(G_3)$  برقرار باشد طرف دوم معادله بالا صفر است.

$$\text{طرف اول} = G_1(\bar{R}_{02}, \bar{R}_{01}) - G_2(\bar{R}_{01}, \bar{R}_{02}) = 0$$

تقارن در این جا برای عملگر لاپلاس درست آمده است  $\rightarrow G_1(\bar{R}_{01}, \bar{R}_{02}) = G_2(\bar{R}_{02}, \bar{R}_{01})$


که تقارن تابع گرین به نوعی همان مفهوم Reciprocity می باشد و ممکن است در بعضی جاها برقرار نباشد و در واقع تقارن تابع گرین برقرار نباشد.

که تابع گرین برای عملگر هلمهولتز هم متقارن است.

که تابع گرین برای عملگر لاپلاس در حالت ۲ بعدی:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial g}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 g}{\partial \phi^2} = -\delta(\bar{r} - \bar{r}')$$

کلمات منحنی طبق قرار داد معادله لاپلاس است.



اگر منبع در مبدأ فرض شود  $\rightarrow \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial g}{\partial r} \right) = -\delta(\bar{r})$

راه حلها:


۱- حل معادله هلمهولتز و سپس انتگرال حول  $\dots$  میجا بگیریم و آن را برابر یک قرار دهیم.

۲- یک دایره کوچک حول منبع بزنیم و از قضیه دوم گرین استفاده کنیم.

$$\int_S \bar{\nabla} \cdot \bar{\nabla} g \, dS = -1 \rightarrow \int_S \bar{\nabla} \cdot (\bar{\nabla} g) \, dS = \oint_C \bar{\nabla} g \cdot \hat{n} \, dl = \dots$$

Subject: د.ف  
 Year: \_\_\_\_\_ Month: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

$$= \oint_C \frac{\partial g}{\partial x} dx = -1$$



از خط معادله حقیقی داریم:  $g = c \ln r$  با حد استیلا بالا داریم:

$$g(r, \theta) = -\frac{1}{2\pi} \ln |\bar{r} - \bar{r}'| \quad c = -\frac{1}{2\pi}$$

اگر منبع در مبدأ باشد و در محل  $\bar{r}'$  باشد:  $\leftarrow$  منطبق بر مقدار داده شده

$$\nabla^p G(\bar{x}, \bar{x}_0) = \delta(\bar{x} - \bar{x}_0)$$

در مسئله  $p$  بعدی به  $\delta$  توابع ویژه:

$$\mathcal{L} \phi_n = \lambda_n \phi_n$$

در این معادله خود را با  $\mathcal{L}$  نشان دهیم:

$$\nabla^p \phi_n = \lambda_n \phi_n$$

برای این مثال خاص داریم:

$$G(\bar{x}, \bar{x}_0) = \sum a_n \phi_n \rightarrow \nabla^p \sum a_n \phi_n = \sum a_n \nabla^p \phi_n = \dots$$

$$\dots = \sum a_n \lambda_n \phi_n = \delta(\bar{x} - \bar{x}_0)$$

$$a_n \lambda_n = \phi_m^*(\bar{x}_0)$$

باضرب طرفین در  $\phi_m$  و انتگرال گیری داریم:


چون متعام است  $\phi_n(\bar{x})$  فقط با  $\phi_n$  از این رو  $\int \delta$  داشته ایم:

$$G(\bar{x}, \bar{x}_0) = \sum_m \frac{\phi_m(\bar{x}) \phi_m^*(\bar{x}_0)}{\lambda_m}$$

مثال: ناحیه مستطیلی با شرط مرزی صفری:

$$\lambda_n = -\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$$

Subject: \_\_\_\_\_  
 Year: \_\_\_\_\_ Month: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_



$$G = \sum_m \sum_n \frac{\sin(\frac{m\pi x}{a}) \sin(\frac{n\pi y}{b}) \sin(\frac{m\pi x_0}{a}) \sin(\frac{n\pi y_0}{b})}{(\frac{m\pi}{a})^2 + (\frac{n\pi}{b})^2}$$

اگر  $\Phi_m^*$  و  $\Phi_m$  را نیز مالیزه کنیم ضرب  $\frac{F}{ab}$  در عبارت بالا ضرب می شود.

یک حد دیگر برآورد مسئله:  $\nabla^2 G(\bar{x}, \bar{x}_0) = \delta(\bar{x} - \bar{x}_0)$

با جایگذاری در معادله داریم:  $G(\bar{x}, \bar{x}_0) = \sum A_m(y) \sin(\frac{m\pi x}{a})$

$$\sum_m \left[ \frac{d^2 A_m}{dy^2} - (\frac{m\pi}{a})^2 A_m \right] \sin \frac{m\pi x}{a} = \delta(x - x_0) \delta(y - y_0)$$

دو طرف معادله را در  $\sin \frac{m\pi x}{a}$  ضرب می کنیم و در مرزهای مسئله انتگرال گیری می کنیم:  $(0, a)$

$$\frac{d^2 A_m}{dy^2} - (\frac{m\pi}{a})^2 A_m = \frac{F}{a} \sin \frac{m\pi x_0}{a} \delta(y - y_0)$$

$$A_m(y) = \begin{cases} C_m \sinh(\frac{m\pi y}{a}) \sinh \frac{m\pi}{a} (b - y_0) & y < y_0 \\ C_m \sinh \frac{m\pi}{a} (b - y) \sinh \frac{m\pi y}{a} & y > y_0 \end{cases}$$

به دلیل حفظاناری

$$\frac{dA_m}{dy} \Big|_{y_0^+} = \frac{F}{a} \sin \frac{m\pi x_0}{a} \rightarrow C_m \text{ پیدا می شود}$$

۵۹

Subject:

Year: Month: Date: ( )

$$C_m = \frac{\rho \sin\left(\frac{m\pi x_0}{a}\right)}{m\pi \sin h\left(\frac{m\pi b}{a}\right)}$$

که هر دو حالت جواب مسئله است  
و هر حالت برای یک جای خاص  
به دردی می خورد

که حل مسئله نیم صفحه به کمک تابع گرین:

$$\begin{cases} \nabla^2 u(\bar{x}) = f(\bar{x}) \\ \bar{x} = (x, y) \\ u(\bar{x})|_{y=0} = h(x) \end{cases}$$

$\bar{x}_0$

شرط دیریکله

$\bar{x}_0^*$

برای یافتن تابع گرین مسئله نیم صفحه یک منبع  $\bar{x}_0^*$  نیز در زیر نیم صفحه در نظر  
می گیریم. مسئله تابع گرین به این صورت است:

$$\begin{cases} \nabla^2 G = \delta(\bar{x} - \bar{x}_0) \\ G|_{y=0} = 0 \end{cases} \rightarrow \nabla^2 G = \delta(\bar{x} - \bar{x}_0) - \delta(\bar{x} - \bar{x}_0^*)$$

تابع گرین کلی صفحه (سطح  $\rho$  بعدی)  $\rightarrow G = \frac{1}{2\pi} \ln |\bar{x} - \bar{x}_0|$

$$G = \frac{1}{2\pi} \ln \left| \frac{\bar{x} - \bar{x}_0}{\bar{x} - \bar{x}_0^*} \right|$$

پاسخ مسئله ما تابع گرین نیم صفحه  
است.

اگر این جواب را در مسئله قرار دهیم می بینیم که صدق می کند و در محل مرز هم  
داریم  $G=0$  و شرط مرزی را هم برآورده می کنیم پس جواب مسئله همین است.


تا حالا ما پاسخ تابع گرین را یافته ایم ولی پاسخ مسئله اصلی چگونه است؟

Subject: \_\_\_\_\_  
 Year: \_\_\_\_\_ Month: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

$$\int_S (u \nabla^2 v - v \nabla^2 u) ds = \oint_C (u \vec{\nabla} v - v \vec{\nabla} u) \cdot \hat{n} dl$$

$$\rightarrow \int_S [u(\vec{x}) \delta(\vec{x} - \vec{x}_0) - G F(\vec{x})] ds = \int_0^{2\pi} (h(x) \frac{\partial G}{\partial n} - G \frac{\partial u}{\partial n}) dl$$

$$u(\vec{x}_0) = \int_S G F(\vec{x}) d\vec{x} + \oint h(x) \frac{\partial G}{\partial n} dx$$



با تبدیل  $\vec{x}_0$  و  $\vec{x}$  به  $x_0$  و  $x$  داریم:


$$u(\vec{x}) = \int_S F(\vec{x}_0) G(\vec{x}, \vec{x}_0) d\vec{x}_0 - \int_{-\infty}^{+\infty} h(x_0) \frac{\partial G(\vec{x}, \vec{x}_0)}{\partial y_0} dx_0$$

$$G = \frac{1}{4\pi} \ln \frac{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}{(x-x_0)^2 + (y+y_0)^2}$$

$$\frac{\partial G}{\partial y_0} \Big|_{y_0=0} = \frac{-y}{\pi [(x-x_0)^2 + y^2]}$$

در حالت خاص  $\oint F(\vec{x}) = 0$  معادله لاپلاس است:

$$u(x, y) = \frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{h(x_0)}{(x-x_0)^2 + y^2} dx_0$$




اگر  $h(x)$  نامتناهی بود عبارت دوم  $u(x, y)$  موجود نبود و ما فرم کلی جواب موجود بود

۹۱

Subject:

Year. Month. Date. ( )



حل معادله پوآنسون برای ناحیه دایره‌ای:

$$\nabla^2 u = f(\bar{z})$$

حل با تئوری تصویر:

$$\begin{cases} u(\alpha, \theta) = \rho \cos \alpha \\ \theta - \theta_0 = \varphi \end{cases}$$

$$\begin{cases} \nabla^2 G = \delta(\bar{z} - \bar{z}_0) \\ G|_{\text{روی مرز}} = 0 \\ \gamma = \alpha \end{cases}$$

حل تابع گرین مسئله:

$$G = \frac{1}{2\pi} \ln |\bar{z} - \bar{z}_0| - \frac{1}{2\pi} \ln |\bar{z} - \bar{z}_0^*| + C$$

$$G = \frac{1}{2\pi} \ln \left| \frac{\bar{z} - \bar{z}_0}{\bar{z} - \bar{z}_0^*} \right| + C \rightarrow \text{برای آنکه } G \text{ روی مرز صفر نشود}$$

$$|\bar{z} - \bar{z}_0| = k_1 |\bar{z} - \bar{z}_0^*|$$

مقدار C بر حسب  $k_1$  قابل بیان است:

$$\bar{z}_0^* = \delta \bar{z}_0$$

هم‌راستا بودن بردارها...  $\bar{z}_0^*$  و  $\bar{z}_0$ :

$$|\bar{z} - \bar{z}_0|^p = |\bar{z}|^p + |\bar{z}_0|^p - p|\bar{z}||\bar{z}_0| \cos \varphi$$

$$|\bar{z} - \bar{z}_0^*|^p = |\bar{z}|^p + |\bar{z}_0^*|^p - p|\bar{z}||\bar{z}_0^*| \cos \varphi$$

نسبت مورد نظر باید مستقل از  $\varphi$  ثابت باشد:

$$a^p + \gamma_0^p - p a \gamma_0 \cos \varphi = k [a^p + \gamma_0^p \delta^p - p a \delta \gamma_0 \cos \varphi]$$

$$k = \frac{1}{\delta}, \quad \delta = \frac{a^p}{\gamma_0^p} \rightarrow \bar{z}_0^* = \frac{a^p}{\gamma_0^p} \bar{z}_0 \rightarrow |\bar{z}_0^*| = \frac{a^p}{\gamma_0}$$

$$G = \frac{1}{2\pi} \ln \left[ \frac{\gamma_0^p (\gamma^p + \gamma_0^p - p \gamma \gamma_0 \cos \varphi)}{\gamma^p \gamma_0^p + a^p - p \gamma \gamma_0 a^p \cos \varphi} \right], \quad \varphi = \theta - \theta_0$$

Subject:

Year. Month. Date. ( )

اگر شرط مرزی ما نهمان باشد شکل کلی جواب  $G$  عوض می شود


ریاضی مهندسی: جلسه ۹ «۱۹، ۱، ۱۰»

ماده پواسون: تابع گرین با شرایط دیریکله

$$\nabla^2 u = f(\bar{x})$$

$$u(\bar{x}) = \iint_A f(\bar{x}_0) G(\bar{x}, \bar{x}_0) dA + \oint_C h(\bar{x}_0) \nabla_{\bar{x}_0} G(\bar{x}, \bar{x}_0) \cdot \hat{n} dl$$

مقدار تابع روی مرز



در حالت خاص: ماده لاپلاس  $f(\bar{x}_0) = 0$

$$(r, \theta), (r_0, \theta_0) \rightarrow \theta - \theta_0 = \varphi$$

$$\frac{\partial G}{\partial r_0} \Big|_{r_0=a} = u = \frac{a}{2\pi} \frac{1 - (r/a)^2}{r^2 + a^2 - 2ar \cos(\theta - \theta_0)}$$

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} h(\theta_0) \left[ \frac{a^2 - r^2}{a^2 + r^2 - 2ar \cos(\theta - \theta_0)} \right] d\theta_0$$

تابع گرین از جمله مربوطه با شرایط مرزی خاص بدست می آید  
 که تاکنون تابع گرین داخل کره و نیم کره را یافته ایم.



۹۳

Subject:

Year: Month: Date: ( )

Field Theory of Guided Waves, Collin کتاب

فصل دوم در مورد تحلیل‌های حوزه طیفی باشد.

که قضیه: اگر  $G(\alpha, \alpha')$  تابع گرین عمگر استروم لیبویک باشد.

$$\mathcal{L} G + \lambda \gamma G = -\delta(\alpha - \alpha')$$

در این صورت:

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda_j}} \oint_C G(\alpha, \alpha', \lambda) d\lambda = -\frac{\delta(\alpha - \alpha')}{\gamma(\alpha')}$$

که  $C$  کانتور است که تمام تکین‌ها را در برده بگیرد. کانتور (پربند)

اثبات: تابع گرین مسئله قبلاً هم این صورت بوده است:

$$G(\alpha, \alpha', \lambda) = -\sum \frac{\psi_n(\alpha) \psi_n(\alpha')}{\lambda - \lambda_n}$$

تقاطع تکین  $G$ ،  $\lambda_n$  هستند.

$$-\frac{1}{\sqrt{\lambda_j}} \sum \oint_C \frac{\psi_n(\alpha) \psi_n(\alpha')}{\lambda - \lambda_n} d\lambda = -\sum \psi_n(\alpha) \psi_n(\alpha')$$

حل این مسئله به کمک انتگرال‌های مختلف محاسبه شده است.

طرفین رابطه رو به رو را در  $\psi_m(\alpha)$  ضرب می‌کنیم و انتگرال می‌گیریم:

$$\delta(\alpha - \alpha') = \sum \alpha_n \psi_n(\alpha) \rightarrow \gamma(\alpha') \psi_m(\alpha') = \alpha_m$$

$$\delta(\alpha - \alpha') = \sum \gamma(\alpha') \psi_m(\alpha) \psi_m(\alpha') \rightarrow \frac{\delta(\alpha - \alpha')}{\gamma(\alpha')} = \sum \psi_m(\alpha) \psi_m(\alpha')$$

Subject :

Year. Month. Date. ( )

در مسائل پیچیده بودنت آوردن جواب در حوزه طیفی بسیار پرکاربرده می باشد

مثال:  $\frac{d^p G}{dx^p} + \lambda G = -\delta(x-x')$  ,  $[0, a]$


$$G(x, x', \lambda) = \frac{\sin \sqrt{\lambda} x_{<} \sin \sqrt{\lambda} (a - x_{>})}{\sqrt{\lambda} \sin \sqrt{\lambda} a}$$

$\left\{ \begin{array}{l} x_{<} : \text{عدد کمتر} \\ \text{بین } x' \text{ و } x \\ x_{>} : \text{عدد بزرگتر} \\ \text{بین } x' \text{ و } x \end{array} \right.$

مقادیر  $\lambda = (\frac{n\pi}{a})^p$  :  $\lambda = (\frac{n\pi}{a})^p$

$$\frac{1}{p\pi j} \oint_C G d\lambda = \frac{1}{p\pi j} \oint_C G(x, x', \lambda) d\lambda = p\pi j \times \frac{1}{p\pi j} \times \dots$$

$$\left[ \sum \frac{\sin \sqrt{\lambda} x_{<} \sin \sqrt{\lambda} (a - x_{>})}{\frac{1}{p\sqrt{\lambda}} \sin \sqrt{\lambda} a + \frac{a}{p} \cos \sqrt{\lambda} a} \right] \lambda = (\frac{n\pi}{a})^p$$




$G(x)$  در این جا  $\perp$  است.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p}{a} \frac{\sin \frac{n\pi}{a} x'}{\frac{a}{p}} \frac{\sin \frac{n\pi}{a} x}{a} = \delta(x-x')$$

این هم تابع دلتا جبراً است.

مثالها کاربرد:



مثال از خط انتقال یک بعدی:  $\omega$  تابع گرین است که از دو طرفانه ورودی است.

۹۵

Subject:

Year: Month: Date: ( )

$\frac{d^2 g_0}{dx^2} + k^2 g_0 = -\delta(x-x')$  خط اتصال کوتاه ( $V=0$ ) شرط مرزی  
 دیرینگی است.  
 $\frac{dV}{dx} = 0$  است شرط مرزی نیومان است  
 $(i=0)$   $S$  همان

روش مرسوم (Conventional Method):

$$g_0(x, x') = \begin{cases} A e^{jkx} & \rightarrow \text{outgoing } x > x' \\ B e^{-jkx} & \rightarrow \text{incoming } x < x' \end{cases}$$

$e^{j\omega t}$  در فرض فازی و  $e^{-j\omega t}$  به عنوان جواب فرض شده است. وابستگی زمانی  
 $e^{j\omega t}$  در فرضی و  $e^{-j\omega t}$  در فرضی

در فیزیک و مهندسی به عنوان وابستگی زمانی جواب فرض می شود.  
 در حل شرط های پیوستگی و گراندار بودن مشتق مرتبه اول تابع گرین راهی نوینیم:

$$A e^{jkx} = B e^{-jkx}, \quad \frac{dg_0}{dx} \Big|_{x'}^+ = -1$$

$$g_0(x, x') = \frac{j}{\mu k} e^{jk|x-x'|} \leftarrow \text{جواب به این صورت است}$$

روش Ohm-Rayleigh: این روش جواب را به صورت طیفی می دهد

جواب را بر حسب توابع ویژه مسئله فرض می کنیم:  
 تماماً حل این مسئله مشابه تجزیه فوریه شده است و نباید اشتباه شود.  
 این همان مسئله تجزیه فوریه است. در این روش ما توابع ویژه مسئله را می یابیم  
 و به کمک آن ها مسئله را حل می کنیم.

$$g_0 = \int_{-\infty}^{+\infty} B e^{jkx} dx \rightarrow \text{بسیار جواب } g_0 \text{ به کمک توابع ویژه مورد نیاز می گیریم}$$

Subject:

Year. Month. Date. ( )

$$\delta(\alpha - \alpha') = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\lambda(\alpha - \alpha')} d\lambda$$

کسبیت تابع  $\delta(\alpha - \alpha')$  و  $\delta(\alpha - \alpha')$  توابع ویژه صورت می گیرند.

عبارت ها بالا را در مسئله قرار می دهیم و مجهول B را می یابیم:


$$\int_{-\infty}^{+\infty} \lambda^p B e^{j\lambda\alpha} d\lambda + \int_{-\infty}^{+\infty} k^p B e^{j\lambda\alpha} d\alpha = \text{طرف دوم}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} B(k^p - \lambda^p) e^{j\lambda\alpha} d\lambda = \text{طرف دوم} \rightarrow B = \frac{e^{-j\lambda\alpha}}{2\pi(\lambda^p - k^p)}$$

$$\rightarrow g_0 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{j\lambda(\alpha - \alpha')}}{2\pi(\lambda^p - k^p)} d\lambda$$

این روش حل را روش حل فرم طیفی می گویند.

"Spectral Solution"



$$\lambda = \pm k$$

اگر کف داشته باشیم k ها را یکدیگر مقابله دارند.

$$g_0 = 2\pi j x \left[ \frac{1}{2\pi} \frac{e^{jk(\alpha - \alpha')}}{k} \right] \quad \alpha > \alpha'$$

$$\rightarrow g_0 = \frac{j}{k} e^{jk(\alpha - \alpha')} \quad \alpha > \alpha'$$

برای  $\alpha < \alpha'$  جواب می رسیم.

۴۷


Subject:

Year: Month: Date: ( )

در روش دوم همان روش طیفی موسوم است تابع گرین را بر حسب توابع ویژه بسط می دهند.

### Eigenfunction Expansion

$$\frac{\partial^2 G}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 G}{\partial y^2} = -\delta(x-x')\delta(y-y')$$



در فضای:

در باروشن جدا سازی متغیرها مسئله را به دو ناهمبند حل می کنیم:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} = \mathcal{L}_x, \quad \frac{\partial^2}{\partial y^2} = \mathcal{L}_y, \quad \nabla^2 = \mathcal{L}$$

برای یافتن تابع گرین باید این مسئله را حل کنیم و نتایج را در هم از حد این مسائل یک بوی به یک رابطه های پایین می توان تابع گرین مسئله بوی را یافت.

$$\begin{cases} \mathcal{L}_x G_x + \mathcal{L}_y G_x = -\delta(x-x') \\ \mathcal{L}_x G_y + \mathcal{L}_y G_y = -\delta(y-y') \end{cases}$$

برای یافتن توابع ویژه باید این دو معادله را حل کنیم:

$$\begin{cases} \mathcal{L}_x \psi_x + \lambda_x \psi_x = 0 \\ \mathcal{L}_y \psi_y + \lambda_y \psi_y = 0 \end{cases}$$

$$\lambda_x = -\lambda_y \rightarrow \mathcal{L} = \mathcal{L}_x + \mathcal{L}_y + \lambda_x + \lambda_y$$

$$G(x, y, x', y') = \frac{-1}{\rho_{xj}} \oint_{C_x} G_x(x, x', \lambda_x) G_y(y, y', \lambda_y) d\lambda_x = \dots$$

تمام تکلیفها را دور بزنند و تکلیفها را خواسته باشند.

Subject:

Year:

Month:

Date:

$$= \frac{-1}{\sqrt{\pi j}} \oint_{C_y} G_{\alpha}(x, \bar{x}, \lambda_{\alpha}) G_y(y, \bar{y}, \lambda_y) d\lambda_y$$

شرط‌های مرزی تابع  
گرفتن عین شرط‌های  
مرزی مسئله اصلی

$$G_{\alpha}|_{x=0,a} = 0 \quad \& \quad G_y|_{y=0,b} = 0$$

است ← شرط دیریکله

در مشتاق  $G$  داده شده در معادله اصلی صدق می‌کند

$$\mathcal{L} G = (\mathcal{L}_{\alpha} + \mathcal{L}_x + \mathcal{L}_y + \mathcal{L}_y) \left( \frac{-1}{\sqrt{\pi j}} \oint_{C_x} G_{\alpha} G_y d\lambda_{\alpha} \right) = \dots$$

$$= \frac{-1}{\sqrt{\pi j}} \oint_{C_x} (\mathcal{L}_{\alpha} + \mathcal{L}_x + \mathcal{L}_y + \mathcal{L}_y) G_{\alpha} G_y d\lambda_{\alpha} = \dots$$

$$= \frac{-1}{\sqrt{\pi j}} \oint_{C_x} [ -\delta(\alpha - \bar{\alpha}) G_y - \delta(y - \bar{y}) G_{\alpha} ] d\lambda_{\alpha} = \dots$$

چون  $C_x$  فقط تکین‌های  $G_{\alpha}$  را دور  
می‌زند


$$= \frac{1}{\sqrt{\pi j}} \oint_{C_x} G_{\alpha}(x, \bar{x}, \lambda_{\alpha}) \delta(y - \bar{y}) d\lambda_{\alpha} = \dots$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi j}} \delta(y - \bar{y}) \oint_{C_x} G_{\alpha}(x, \bar{x}, \lambda_{\alpha}) d\lambda_{\alpha} = -\delta(\alpha - \bar{\alpha}) \delta(y - \bar{y})$$


49

Subject:

Year: Month: Date: ( )



کنتال از هوجیرها:



مدلسازی منابع الکترومغناطیسی در فصل 4 مرجع [1] آمده است.

$$\vec{A} = A_y \hat{y} = \psi \hat{y}$$

که تبدیل به معادله است:

$$\left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k_0^2 \right) \psi = -\mu_0 I_0 \delta(x-x') \delta(z-z')$$

«معمولاً این را با فرقی کردن مسئله را حل کرد.»

در شرایط تابش از  $-\infty$  تا  $+\infty$  صدق می کند زیرا هوجیر نامحدود است.

$$\frac{\partial^2 G_{xx}}{\partial x^2} + \lambda_x G_{xx} = -\delta(x-x'), \quad G_{xx}|_{x=0, a} = 0$$

$$\frac{\partial^2 G_{zz}}{\partial z^2} + \lambda_z G_{zz} = -\delta(z-z')$$

در شرط تابش از  $-\infty$  تا  $+\infty$  صدق می کند زیرا هوجیر نامحدود است.

$$G_{xx} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{a}x'\right)$$

$$G_{zz} = \frac{1}{\mu_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{G_{zz}(\beta)}_{\text{تبدیل فوریه}} e^{-j\beta z} d\beta = \dots$$

که تبدیل فوریه است.

Subject:

Year: Month: Date: ( )

$$= \frac{1}{P\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-j\beta(z-z')} d\beta}{\beta^2 - \lambda_z^2}$$

$$(\beta - \sqrt{\lambda_z})(\beta + \sqrt{\lambda_z})$$

یکبار از طرف بالا و یکبار از طرف پایین استگرال مختلف می گیریم و جواب مسئله را همیابیم:

$$G = \frac{1}{a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(\frac{n\pi}{a}x) \sin(\frac{n\pi}{a}x')}{\sqrt{(\frac{n\pi}{a})^2 - k_0^2}} e^{-\Gamma_n |z-z'|}$$

بررسی کنیم  $\leftarrow$  به  $G$  باید از قضیه صفت ۹۷ یا ۹۸ استفاده کرد «خط استگرال در صفت ۹۸ کتاب»

$$\Gamma_n = \sqrt{(\frac{n\pi}{a})^2 - k_0^2}, \text{Im}\{\Gamma_n\} > 0$$

«Collin»

«ریاضی مهندسی: جلسه ۱۰» «۱۹، ۱۹»

«منابع الکترومغناطیسی: فصل ۴ کتاب Dudley»

$$\delta(\bar{x} - \bar{x}') = \delta(x - x') \delta(y - y') \delta(z - z')$$

\* مختصاً درستی

$$f(r, \varphi) \delta(r - r') \delta(\varphi - \varphi') = \frac{1}{r} \delta(r - r') \delta(\varphi - \varphi')$$

\* مختصات استوانه ای: (استوانه آدویچو)

$$\int \frac{\delta(r - r') \delta(\varphi - \varphi')}{r} r dr d\varphi = 1$$

«Weighted Dirac-Delta Function»

اگر منبع در مبدأ باشد برای مختصات استوانه ای تقارن نسبت به  $\varphi$  داریم:

$$\frac{\delta(r)}{P\pi r}$$



VI

Subject:

Year. Month. Date. ( )

$$\frac{\delta(r-r') \delta(\varphi-\varphi') \delta(z-z')}{r}$$

در حالت سه بعدی:

$$\frac{\delta(r) \delta(z-z')}{\rho \pi r}$$

منبع روی محور z:

$$\frac{\delta(r) \delta(z)}{\rho \pi r}$$

منبع روی سطح باشد:

$$\frac{\delta(R-R') \delta(\theta-\theta') \delta(\varphi-\varphi')}{R^2 \sin \theta}$$


مختصات کروی:

$$\frac{\delta(R)}{K \pi R^2}$$

منبع روی سطح باشد:

$$\frac{\delta(R-R') \delta(\theta)}{\rho \pi R^2 \sin \theta}$$

منبع روی محور z باشد:



$$\vec{J} = \hat{x} J_0 \delta(z)$$

منبع صفحه‌ای:

$$\vec{E}(x, y, z), \vec{H}(x, y, z) \rightarrow$$

فقط  $H_y$  و  $E_x$  دارد

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \times \vec{E} = -j\omega \mu \vec{H} \\ \vec{\nabla} \times \vec{H} = j\omega \epsilon \vec{E} + \vec{J} \end{cases}$$

منبع در بالا است.

$$\frac{\partial}{\partial x} = 0, \frac{\partial}{\partial y} = 0$$

$$\textcircled{I} - \frac{dH_y}{dz} = J_0 \delta(z) + j\omega \epsilon E_x \quad , \quad \frac{dH_x}{dz} = j\omega \epsilon E_y \quad \textcircled{II}$$

PAPCO

Subject:

Year. Month. Date. ( )

$$\textcircled{\text{III}} \quad 0 = j\omega \epsilon E_z \rightarrow E_z = 0$$

$$\textcircled{\text{IV}} \quad \frac{dE_y}{dz} = j\omega \mu H_x \quad , \quad \frac{dE_x}{dz} = -j\omega \mu H_y \quad \textcircled{\text{V}}$$

$$\textcircled{\text{VI}} \quad 0 = j\omega \mu H_z \rightarrow H_z = 0$$

لا در روابط بالا  $\textcircled{\text{II}}$  و  $\textcircled{\text{IV}}$  معادلاتی هستند بدون منبع هستند از این رو هیچ تدریجی ندارند و جواب آن‌ها صفر است:  $E_y = H_x = 0$

در روابط بالا تنها  $E_x$  و  $H_y$  باقی مانده اند پس:

$$\frac{d^2 E_x}{dz^2} + k^2 E_x = j\omega \mu J_0 \delta(z)$$

مسئله تابع گرین  $\rightarrow$


$$\frac{d^2 g}{dz^2} + k^2 g = -\delta(z)$$

با حل مسئله رو به رو باید ضریب ثابت مسئله اصلی حل می شود.

$$g(z,0) = \frac{e^{-jk|z|}}{\mu jk}, \quad \text{Im}\{k\} < 0 \quad \leftarrow e^{j\omega t} \quad \text{قرارداد}$$

$$g(z,0) = \frac{1}{\mu \pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{j\beta z}}{\beta^2 - k^2} d\beta$$

به کمک تبدیل فوریه به فرم انتگرالی جواب می رسیم. با انتگرال گیری مختلف به فرم بالا می رسیم.



منبع خطی (Line Source):

$$\vec{J} = I_0 \delta(x) \delta(y) \hat{z}$$

$$\vec{J} = I_0 \frac{\delta(r)}{\mu \pi r} \hat{z}$$

به کمک تقارن اثر  $\phi$  حذف می شود.

VK

Subject:

Year. Month. Date. ( )

$(H_x, H_y, E_z)$  و  $(H_\varphi, E_z)$  :  $\frac{\partial}{\partial \varphi} = 0, \frac{\partial}{\partial z} = 0$  در دلیل تقارن

①  $\frac{dH_z}{dr} = -j\omega \epsilon E_\varphi$

معادلات ① و ② چون منبع

②  $\frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r E_\varphi) = -j\omega \mu H_z$

خارج و کوپلینگ هم با سایر

معادله ها خارج از این پرو

$E_\varphi = H_z = 0$


③  $\frac{dE_z}{dr} = j\omega \mu H_\varphi$

④  $\frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r H_\varphi) = J_z + j\omega \epsilon E_z$


$E_r = 0, H_r = 0$

$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r \frac{dE_z}{dr}) + k^2 E_z = j\omega \mu \frac{I_0 \delta(r)}{r}$  در مختصات استوانه‌ای

$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r \frac{dg}{dr}) + k^2 g = \frac{\delta(r)}{r}$  در تابع گرین مسئله



بسیار استوانه‌ای



در مسئله بسیار استوانه‌ای

$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r \frac{dg}{dr}) + k^2 g = \frac{\delta(r-r')}{r}$

Subject:

Year. Month. Date. ( )

در ابتدا مسئله را برای حالت صاف حل می‌کنیم:

$$g = \begin{cases} A J_0(kr) + B N_0(kr) & r < r' \\ C H_0^{(1)}(kr) + D H_0^{(2)}(kr) & r > r' \end{cases}$$

در اینجا  $H_0^{(1)}$  موج ورودی و  $H_0^{(2)}$  موج خروجی است.

در جای خود کاربرد دارد.  $J_0(x)$ ،  $N_0(x)$ ،  $H_0^{(1)}(x)$  و  $H_0^{(2)}(x)$  جوابهای معادله بسل هستند و هر کدام

$H_0^{(1)}(x) = J_0(x) - jN_0(x) \rightarrow$  outgoing wave

$H_0^{(2)}(x) = J_0(x) + jN_0(x) \rightarrow$  incoming wave

در مسائل با فضای محدود کاربرد دارند.

در  $J_0(x)$  و  $N_0(x)$  مثل توابع  $\cos x$  و  $\sin x$  و در  $H_0^{(1)}(x)$  و  $H_0^{(2)}(x)$  مثل توابع  $e^{-jkx}$  و  $e^{jkx}$  و در دستگانه استوانه هستند.

به دلیل تقارن تابع  $g$  داریم:

$$g = D \begin{cases} J_0(kr) H_0^{(1)}(kr') & r < r' \\ J_0(kr') H_0^{(1)}(kr) & r > r' \end{cases}$$

که مجهول  $D$  را توسط منبع می‌توانیم:

$$D = \frac{\rho r}{j}$$

$$E_z = \frac{-\omega \mu I_0}{k} \left\{ \dots \right\}$$

برای بسط معادله  $r > r'$  است داریم:

$$g(r, 0) = \frac{\pi}{2j} H_0^{(1)}(kr)$$

۷۵

Subject:

Year:      Month:      Date: ( )

در خطه  $\delta$  تبدیل فوریه بسل (تبدیل هانکل):

$$F(\lambda) = \int_0^{\infty} f(r) J_0(\lambda r) r dr$$

$$f(r) = \int_0^{\infty} F(\lambda) J_0(\lambda r) \lambda d\lambda$$

روابط تبدیل فوریه بسل

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left( r \frac{dg}{dr} \right) + k^p g = -\frac{\delta(r-r')}{r}$$

معادله تابع گرین ←

$$\frac{\delta(r-r')}{r} = \int_0^{\infty} A(\lambda) J_0(\lambda r) \lambda d\lambda \quad \text{و} \quad A(\lambda) = J_0(\lambda r')$$

طرف اول (طرف اول)  $\rightarrow -\lambda^p G(\lambda) + k^p G(\lambda) =$  طرف دوم

$$\rightarrow G(\lambda, r') = \frac{J_0(\lambda r')}{\lambda^p - k^p}$$

$$\rightarrow g(r, r') = \int_0^{\infty} \frac{J_0(\lambda r') J_0(\lambda r)}{\lambda^p - k^p} \lambda d\lambda$$

در مقایسه با جواب قبلی:


$$H_0^{(p)}(kr) = \frac{p}{\pi} j \int_0^{\infty} \left[ \frac{J_0(\lambda r)}{\lambda^p - k^p} \right] \lambda d\lambda \quad (\text{اگر } r=0 \text{ باشد})$$

$$\frac{1}{\lambda^p - k^p} = \frac{\pi}{pj} \int_0^{\infty} H_0^{(p)}(kr) J_0(kr) r dr$$

Subject:

Year: Month: Date: ( )

که تابع پسل و هنکل در کتاب Watson به خوبی توضیح داده شده اند.



$$\frac{\partial}{\partial z} = 0$$

که در مختصات دکارتی:  
 $E_z$  و  $H_x$  و  $H_y$  موجود هستند و  
 $E_x$  و  $E_y$  و  $H_z$  حذف میشوند.

TM

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} = -j\omega\mu H_x$$

$$\frac{\partial E_z}{\partial x} = j\omega\mu H_y$$

که در TE حذف نمیشود منبع وجود ندارد

TE

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = -j\omega\mu H_z$$

$$\frac{\partial H_z}{\partial y} = j\omega\epsilon E_x$$

$$\frac{\partial H_z}{\partial x} = -j\omega\epsilon E_y$$

TM

$$\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = I \delta(x-x') \delta(y-y')$$

که برای TM:

$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} + k^2 E_z = j\omega\mu I_0 \delta(x-x') \delta(y-y')$$

« منبع روی محور z »

$$\nabla^2 E_z$$

VU

Subject,

Year. Month. Date. ( )

$$\frac{d^p \hat{E}_z}{dy^p} + (k^p - k_x^p) \hat{E}_z = j\omega\mu I_0 \delta(y) \quad \text{تجدید فوریه نسبت به } x$$

$$E_z = -\frac{\omega\mu I_0}{k_x} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-jk_y|y|} e^{jk_x x}}{k_y} dk_x$$

راه دوم: یکبار نسبت به  $x$  تجدید فوریه بگیریم و یکبار نسبت به  $y$  و معادله را کلاً به فرم جبری تبدیل کنیم. سپس با  $k_x$  بار عکس فوریه گرفتن به جواب برسیم. هر راه یک فرم برای تابع گرین ارائه می‌دهد.

$$H_0^{(1)}(k\sqrt{x^p + y^p}) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-j\sqrt{k^p - k_x^p}|y|} e^{jk_x x}}{\sqrt{k^p - k_x^p}} dk_x$$

تجدید فوریه نسبت به  $x$  و  $y$ :

$$\tilde{E}_z = \frac{j\omega\mu I_0}{k^p - k_x^p - k_y^p}$$

$$E_z = j\omega\mu I_0 \left(\frac{1}{\pi}\right)^p \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{j(k_x x + k_y y)}}{k^p - k_x^p - k_y^p} dk_x dk_y$$

فرم دیگری برای تابع سینوس:


$$H_0^{(1)}(k\sqrt{x^p + y^p}) = \frac{1}{j\pi^p} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{j(k_x x + k_y y)}}{k^p - k_x^p - k_y^p} dk_x dk_y$$

Subject:

Year: Month: Date: ( )

در خلی از این فرم ها انتگرالی در مسائل Scattering مطرح هستند.

ریاضی هستند: جمله ۱۱ « ۱۹ / ۱ / ۱۹ »



$$\nabla^2 G + k_0^2 G = \delta(r - r')$$

$$= \frac{\delta(r - r') \delta(\varphi - \varphi')}{r}$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \frac{\partial G}{\partial r}) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 G}{\partial \varphi^2} = \nabla^2 G$$

بد انتخاب برای جواب می کنیم:

$$G = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} g_m(r, r', \varphi, \varphi') e^{jm\varphi}$$

توابع ویژه هستند  $e^{\pm jm\varphi}$  هستند.

با جایگذاری داریم:

$$\sum_{m=-\infty}^{+\infty} \left( \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} - \frac{m^2}{r^2} + k_0^2 \right) g_m e^{jm\varphi} = \frac{\delta(r - r') \delta(\varphi - \varphi')}{r}$$

طرفین را در  $e^{-jm\varphi}$  ضرب می کنیم و انتگرال گیری می کنیم (به یک معادله از نوع اشتروم - لیوویل برسیم که پاروشهای مختلف قابل حل است).

$$r \frac{d^2 g_m}{dr^2} + \frac{dg_m}{dr} + \left( r k_0^2 - \frac{m^2}{r} \right) g_m = \frac{e^{-jm\varphi'}}{r} \delta(r - r')$$

معادله بالا از نوع بیسل است: در مبدأ گرانگاری نیست

$$\begin{cases} g_m^{(1)} = A_m J_m(k_0 r) + B_m Y_m(k_0 r) & r < r' \\ g_m^{(2)} = C_m H_m^{(1)}(k_0 r) + D_m H_m^{(2)}(k_0 r) & r > r' \end{cases}$$

PAPCO

موج برشست



۷۹

Subject:

Year:      Month:      Date: ( )

و با استفاده از  $W(r')$  مسئله در حالت کلی قابل حل است:

$$W(r') = -jk_0 A_m D_m \left[ J_m(k_0 r) H_m^{(p)}(k_0 r') - J_m(k_0 r') H_m^{(p)}(k_0 r) \right]$$

$$g(r, r', \varphi) = \begin{cases} \int J_m(k_0 r) H_m^{(p)}(k_0 r') e^{-jm\varphi'} & r < r' \\ \int J_m(k_0 r') H_m^{(p)}(k_0 r) e^{-jm\varphi} & r > r' \end{cases}$$

$$G(r, r', \varphi, \varphi') = \sum g_m e^{jm\varphi}$$

و می توان برای منبع خطی در محور z:

$$E_z = \frac{\omega_0 \mu_0 I_0}{k} H_0^{(p)}(k_0 r) \quad , \quad G = \frac{1}{k_j} H_0^{(p)}(k_0 r)$$

این علامت یعنی اگر از  $\delta$  استفاده کنیم بدست می آید.

$$G = \frac{1}{k_j} H_0^{(p)}(k_0 |r - r'|)$$

اگر منبع خطی در محور نباشد این علامت (منبع در محل  $r$  است)

باید همان قرارداد جواب ها داریم:


$$H_0^{(p)}(k_0 |r - r'|) = \begin{cases} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} H_n^{(p)}(k_0 r') J_n(k_0 r) e^{jn(\varphi - \varphi')} & r < r' \\ \sum_{n=-\infty}^{+\infty} H_n^{(p)}(k_0 r) J_n(k_0 r') e^{jn(\varphi - \varphi')} & r > r' \end{cases}$$

«Addition Theorem»

«APCO for Bessel Functions»

Subject:

Year: Month: Date: ( )



مثال از موجبر مستطیلی:

$$\begin{cases} \sin \frac{m\pi x}{a} \\ \sin \frac{n\pi y}{b} \end{cases}$$
 توانی که در شرایط مرزی صدق می کند.

$$\nabla^2 \bar{E} + k_0^2 \bar{E} = -j\omega \mu \bar{J}$$

$$\nabla^2 G + k_0^2 G = \delta(x-x') \delta(y-y') \delta(z-z')$$

$$G = \sum \sum g_{mn}(x, x', y, y', z, z') \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right)$$

$$\sum \sum \left[ -\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 + k_0^2 + \frac{\partial^2}{\partial z'^2} \right] g_{mn} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right)$$

از جایگذاری  $G$  در معادله داریم: طرف دوم  $m =$

برای تجزیه مسئله به یک مسئله یک بعدی طرفین رابطه را در  $\sin\left(\frac{p\pi x}{a}\right)$

ضرب می کنیم و انتگرال می گیریم:  $\sin\left(\frac{q\pi y}{b}\right)$

در جمع این جلسه فصل 11 کتاب ← Adv. EM, Balmainise

$$\left(\frac{d^2}{dz'^2} + k_z^2\right) g_{mn} = \frac{k}{ab} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \delta(z-z')$$

جواب مسئله را چون از طرف  $z$  وارد می شود به صورت  $e^{\pm jk_z z}$  در نظر

۱۱

Subject:

Year. Month. Date. ( )

$$\begin{cases} g_{mn}^{(1)} = A_m e^{jk_z z} & z < z' \\ g_{mn}^{(2)} = B_m e^{-jk_z z} & z > z' \end{cases}$$


پاسخ نهایی مسئله:

$$g_{mn} = \frac{\mu_j}{ab} \left[ \frac{\sin\left(\frac{m\pi}{a} x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b} y\right)}{k_z} \right] e^{-jk_z |z-z'|}$$

$$G = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} g_{mn} \sin\left(\frac{m\pi}{a} x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b} y\right)$$

تقریب سینوسی نسبت به متغیرها  $x$  و  $x'$  و  $y$  و  $y'$  و  $z$  و  $z'$

منبع نقطه‌ای در مبدأ:



$$(\nabla^2 + k^2)g = -\delta(\vec{R} - \vec{R}') \frac{e^{-jkR}}{kR}$$

مسئله را در مختصات دالارتی حل می‌کنیم. با تبدیل فوریه گرفتن به این جواب می‌رسیم:

$$G = \frac{-1}{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2}$$

$$G = \frac{-1}{(2\pi)^3} \iiint_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{j(k_x x + k_y y + k_z z)}}{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2} dk_x dk_y dk_z$$

یک راه دیگر این است که  $\mu$  بار تبدیل فوریه بگیریم و معادله باقیمانده را حل کنیم:

Subject:

Year: Month: Date: ( )

$$\left(\frac{d^2}{dz^2} + k^2\right) \hat{G} = -\delta(z-z')$$

$$\hat{G} = \frac{e^{-jk|z|}}{2jk} \rightarrow G = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-jk|z|} j(k_x x + k_y y)}{2jk} dk_x dk_y$$

چون منبع در مبدأ است  
 $z' = 0$

این ها همگی شکل های مختلف جواب یک مسئله هستند.

\* در مسئله صفحات استوانه ای: فصل ۴ کتاب Dudley

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial G}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 G}{\partial z^2} + k^2 G = -\frac{\delta(r) \delta(z)}{2\pi r}$$

از تبدیل فوریه بپس بگیریم:

$$\frac{d^2 \tilde{G}}{dz^2} + \left( \frac{k^2 - \lambda^2}{r^2} \right) \tilde{G} = -\frac{\delta(z)}{2\pi} \quad \leftarrow \text{تبدیل فوریه نسبت به } r$$

$$2\pi \tilde{G} = \frac{e^{-j\Gamma z}}{2j\Gamma} \rightarrow G(r, z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} \frac{e^{-j\Gamma z}}{2j\Gamma} J_0(\lambda r) \lambda d\lambda$$

تبدیل فوریه نسبت به  $z$


تبدیل فوریه نسبت به  $z$ :

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial \hat{G}}{\partial r} \right) + \left( \frac{k^2 - k_z^2}{r^2} \right) \hat{G} = -\frac{\delta(r)}{2\pi r}$$

$$2\pi \hat{G} = \frac{\pi}{2j} H_0^{(1)}(\tau r) \rightarrow G(r, z) = \frac{1}{2\pi j} \int_{-\infty}^{+\infty} H_0^{(1)}(\tau r) e^{jk_z z} dk_z$$

Subject: ۱۳  
 Year:      Month:      Date: ( )

این ها همه فرم ها مختلف جواب برا تابع گرین هستند.



\* تابع گرین در مختصات کروی:

$$\nabla^2 G + k^2 G = \delta(\bar{R} - \bar{R}') \quad G|_{r=a} = 0$$

« شرط دیریکله »

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial G}{\partial r}) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial G}{\partial \theta}) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 G}{\partial \varphi^2} + k^2 G = \delta(\bar{R} - \bar{R}')$$

$\varphi$ : توابع ویژه:  $\varphi = e^{\pm jm\varphi}$

$\theta$ : زاویه وابسته

$r$ : توابع بیس کروی که با  $n$  و  $j$ :

(دروغ کوچک) نشان داده می شوند

$$G(\bar{R} - \bar{R}') = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} g_{mn}(r, r', \theta, \varphi) \underbrace{P_n^m(\cos \theta) e^{\pm jm\varphi}}_{T_{mn}(\theta, \varphi)}$$

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial T_{mn}}{\partial \theta}) + [n(n+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta}] T_{mn} = 0$$

جواب ها معادله بالا Tesserall Harmonics می گویند.

با جایگذاری  $G$  در معادله داریم:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=-n}^n \left\{ \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial g_{mn}}{\partial r}) + [(kr)^2 - n(n+1)] g_{mn} \right\} T_{mn} = \dots$$

PAPCO

$$\frac{\delta(r-r') \delta(\theta-\theta') \delta(\varphi-\varphi')}{\sin \theta}$$

Subject:

Year. Month. Date. ( )

در  $T_{mn}$  ها متعامد هستند از این روی می توانیم رابطه بالا را ساده کنیم و به یک

بجای بررسییم:  $\int_0^{2\pi} \int_0^\pi T_{mn} T_{pq}^* \sin\theta d\theta d\varphi = \delta_{mp} \delta_{nq}$  ← رابطه تعامد

در کتاب Stratton «EM Theory» دلتا کرونگر  $T_{pq}^* = (-1)^p T_{(-p)q}$

$P_n^m(\cos\theta) \rightarrow$  Zonal Harmonics

$\rightarrow \frac{d}{dr}(r^p g_{mn}) + [(kr)^p - n(n+1)]g_{mn} = \delta(r-r') T_{mn}^*(\theta, \varphi)$

پاسخ این مسئله توابع بیسل گروی هستند:

$$\begin{cases} g_{mn}^{(I)} = A_m j_n(kr) + B_m y_n(kr) & r < r' \\ g_{mn}^{(II)} = C_m j_n(kr) + D_m y_n(kr) & r > r' \end{cases}$$

چون مسئله ما برای یک فضای محدود است برای همین از زو و استفاده کردیم. این قسمت از مسئله به روش های مختلفی قابل حل است زیرا از نوع اشتروم - لیوویل است.

روی  $r=a$  پاسخ مسئله صفر است، شرایط مرز دیریکله  $D_m = -C_m \frac{j_n(ka)}{y_n(ka)}$

$W(r') = -\frac{1}{k} \frac{A_m C_m j_n(ka)}{y_n(ka) r'^p}$

۱۵

Subject:

Year: Month: Date: ( )

توابع بیسل گروهی قابل تبدیل به توابع بیسل استوانه‌ای هستند البته با انجیس غیر منبسط

← ادامه حل در کتاب Balanise انجام است

$$P_n^m(\cos\theta) P_n^m(\cos\theta) e^{-jm(\varphi - \varphi')} \rightarrow \text{چنین عبارتی در جواب وجود دارد}$$

رابطه بین توابع بیسل گروهی و استوانه‌ای:


$$\begin{cases} J_n(x) = \sqrt{\frac{x}{\pi}} J_{n+1/2}(x) \\ Y_n(x) = \sqrt{\frac{x}{\pi}} Y_{n+1/2}(x) \end{cases}$$

«۸۹ / ۸ / ۱۱»

جلسه ۱۲

ریاضی مهندسی:

تابع گرین به کمک نگاشت ها:



$$G = \frac{1}{\pi} \ln \left| \frac{z - \bar{z}_0}{z - z_0} \right|$$

جواب تابع گرین برای نیمه  
مستطیل توسط تئوری تصویر  
جستار



کاربرد اصلی این روش در خطوط مایکرواستریپ می باشد

تابع گرین نیمه منحنه با شرایط مرزی دیریکله:

$$G = \frac{1}{\pi} \ln \left[ \frac{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}{(x-x_0)^2 + (y+y_0)^2} \right] = \frac{1}{\pi} \ln \left| \frac{z-z_0}{z-\bar{z}_0} \right|$$

Subject:

Year. Month. Date. ( )

$$W = F(z) \rightarrow G = \frac{1}{2\pi} \ln \left| \frac{F(z) - F(z_0)}{F(z) - F(\bar{z}_0)} \right|$$

مثال:


$$\bar{\nabla}^p \phi(x, y) = 0 \rightarrow \frac{\partial^p \phi}{\partial x^p} + \frac{\partial^p \phi}{\partial y^p} = 0, \phi(x, y) = f(x + \alpha y)$$

$$\rightarrow f''(x + \alpha y) + \alpha^p f''(x + \alpha y) = 0 \rightarrow \alpha = \pm j$$

$$\phi(x, y) = f(x + jy) \text{ \& } f(x - jy)$$

$$\phi = f(z) + g(\bar{z})$$

در این جا  $f$  و  $g$  و  $z$  کاملاً اختیاری هستند و ما هنوز شرایط مرزی مسئله را اعمال نکرده ایم.




$$\bar{\nabla}^p \phi = f(\bar{z}) = f(r, \theta)$$

مثال: دایره یک

$$\phi|_{r=1} = h(\theta)$$

$$\phi(r, \theta) = \iint f(r, \theta) G(r, r_0, \theta, \theta_0) dA + \int_C h(\theta_0) \frac{\partial G}{\partial n} dl$$

$r_0$



این فرم کلی جواب مسئله است.

$$F(z) = j \frac{1-z}{1+z}, \quad z = r e^{j\theta}, \quad z_0 = r_0 e^{j\theta_0}$$



AV

Subject:

Year. Month. Date.

$$G(r, r_0, \theta, \theta_0) = \frac{1}{4\pi} \ln \left[ \frac{(r^2 - 2rr_0 \cos(\theta - \theta_0) + r_0^2)^{1/2}}{1 - 2rr_0 \cos(\theta - \theta_0) + r^2} \right]$$


$$\frac{\partial G}{\partial n} = \frac{\partial G}{\partial r_0} \bigg|_{r_0=1} = \frac{1}{4\pi} \left[ \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(\theta - \theta_0) + r^2} \right]$$

مثال: حل معادله لاپلاس در ناحیه دایره  $a^2 < r < a^2$

$$\phi(r, \theta) = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(1 - r^2) h(\theta_0)}{1 - 2r \cos(\theta - \theta_0) + r^2} d\theta_0 + \dots$$

به دلیل  $a \neq 1$  باشد:  $a^2 < r < a^2$  معادله لاپلاس

تابع گرین در نواحی نامحدود:



نگاشت  $W = e^z$  ناحیه مستطیلی را به نیم صفحه تبدیل می کند

$$W = e^{\frac{\pi z}{b}}$$

$$\begin{cases} Z = x + jy \\ Z = x + jb \end{cases}$$

$$G = \frac{1}{4\pi} \ln \left| \frac{e^{\frac{\pi z}{b}} - e^{\frac{\pi z_0}{b}}}{e^{\frac{\pi z}{b}} - e^{\frac{\pi \bar{z}_0}{b}}} \right| = \frac{1}{4\pi} \ln \left[ \frac{\cosh \frac{\pi}{b} (x_0 - x) - \cos \frac{\pi}{b} (y_0 - y)}{\cosh \frac{\pi}{b} (x_0 - x) - \cos \frac{\pi}{b} (y_0 + y)} \right]$$

معادله پواسن را هم برای نیم صفحه حل کرده ایم و جواب این مسئله هم بانگشت قابل یافتن است.


Subject:

Year:      Month:      Date: ( )

معادله پواسون:  $\{ \nabla^2 \phi(x, y) = f(x, y), \phi|_{\text{مرز}} = \text{مقادیر} \}$

مثال:

$$\nabla^2 \phi(x, y) = 0, \phi(x, 0) = f(x), \phi(x, b) = 0$$



$$\phi = \iint_{\text{Area}} f(x_0) G dx_0 + \oint_C h(x_0) \nabla_{x_0} G \cdot \hat{n} dl$$

$$\frac{\partial G}{\partial y_0} \Big|_{y_0=0} = \frac{1}{\rho b} \left[ \frac{\sin \frac{\pi y}{b}}{\cosh \rho \frac{\pi}{b} (x_0 - x) - \cos \frac{\pi y}{b}} \right]$$

$$\phi(x, y) = \frac{1}{\rho b} \sin\left(\frac{\pi}{b} y\right) \int_{-\infty}^{+\infty} \left( \frac{f(x_0)}{\cosh \rho \frac{\pi}{b} (x_0 - x) - \cos\left(\frac{\pi}{b} y\right)} \right) dx_0$$

مرجع این بحث: Field Theory of Guided Waves, Collin

کاربردهای روش در یافتن تابع گرین مساله مایکرواستریپ خود را به خوبی نشان دهد.

کاربرد نکات:

- ۱- بدست آوردن تابع گرین
- ۲- ظرفیت خازن ها - طیف پراش لایه ها
- ۳- امپدانس مشخصه


۸۹

Subject:

Year. Month. Date. ( )


چون انرژی در هر دو فضای (تبدیل یافته و اصلی) تغییر نمی کند و  $\nabla^2 \phi = 0$  در محل  
 مرزها ثابت می ماند و انرژی هم در هر دو فضای ثابت است ( $W = \frac{1}{\rho} C V^2$ )  
 پس  $C$  در طی نگاشت تغییر نمی کند و می توان آن را به طور دقیق محاسبه کرد.

مثال: کاربرد نگاشت - ظرفیت بین دو رسانا



یک راه حل معادله لاپلاس در کل فضای  
 روی شدت میدان توزیع بار روی صفحات  
 را محاسبه کرده و  $C = \frac{Q}{V}$  را بیابیم.

$$W = \frac{1}{\rho} \epsilon \iint |\nabla \phi|^2 ds$$




$$u = e^{\frac{\pi x}{d}} \cos \frac{\pi y}{d}$$

$$v = e^{\frac{\pi x}{d}} \sin \frac{\pi y}{d}$$

$$-\frac{a}{p} \leq x \leq \frac{a}{p}, y=0 \rightarrow (u = e^{\frac{\pi x}{pd}}, e^{-\frac{\pi x}{pd}}, v=0)$$

$$-\frac{a}{p} \leq x \leq \frac{a}{p}, y=d \rightarrow (u = -e^{\frac{\pi x}{pd}}, -e^{-\frac{\pi x}{pd}}, v=0)$$



$$g = \rho e^{\frac{\pi a}{pd}}, \frac{a}{d} = \frac{\rho \ln \rho}{g} \rightarrow C \sim \epsilon \frac{a}{d}$$

برای مقادیر

Subject



Year Month Date ( )

$$C = \frac{\mu \epsilon_0}{\pi} \ln \frac{r}{g}$$

برای اینکه این تقریب معتبر باشد باید  $\frac{a}{g}$  بزرگ باشد که معادله یک  $g$  کوچک است.




که این تقریب دریافتی ظرفیت خازنی خطوط CPW به ما کمک می کند  
Coplanar Waveguide



تفسیر: اگر شرط دیریکله داشته باشیم در تبدیل یافته هم شرط دیریکله داریم

اگر شرط نیومان داشته باشیم در تبدیل یافته هم شرط نیومان برقرار است به گونه ای که  $\frac{\partial \phi}{\partial n}$  در محیط جریب از همان  $n$  محیط جریب تبعیت می کند

در جمع برای شرایط مرزی تبدیل یافته ← Potential Theory, Kellogg



مثال:  $j\theta_1$   
 $z - a = r_1 e^{j\theta_1}$

$z + a = r_2 e^{j\theta_2}$

$$W = \ln \frac{z - a}{z + a}$$

$$W = u + jv = \ln \frac{r_1}{r_2} + j(\theta_1 - \theta_2)$$

91

Year. \_\_\_\_\_ Month. \_\_\_\_\_ Day. \_\_\_\_\_

Subject: \_\_\_\_\_

$$\begin{cases} u = \ln \gamma_1 \\ v = \theta_1 - \theta_2 \end{cases} \rightarrow \frac{\gamma_1}{\gamma_2} = e^u$$

$$\frac{(\alpha - a)^p + y^p}{(\alpha + a)^p + y^p} = e^{pu}, \quad (\alpha - a \cosh u)^p + y^p = (a \cosh u)^p$$

شکل دایره:

$$C = \frac{2\pi\epsilon}{\cosh^{-1} \frac{c}{b} - (-\cosh^{-1} \frac{c}{b})} = \frac{2\pi\epsilon}{2 \cosh^{-1} \left(\frac{c}{b}\right)}$$

ظرفیت:

به دلیل تقارن این نتیجه را داده است.


که مساحت تیغه‌ای در نگاشت (نگاشت شوارتز کریستوفل) برتری روش نگاشت است.

«19, 1, 19»


جلسه 12

ریاضی مهندسی:

که نگاشت شوارتز کریستوفل:



طت استفاده از این نگاشت که ساده معادله لاپلاس در نیم صفحه است.



که خطوط مایکرواستریپ هم چند ضلعی محسوب می‌شوند.

به کمک شکل معادله می‌توان اثر لبه‌ها را به صورت تحلیلی محاسبه کرد.

New Clasic

Year. \_\_\_\_\_ Month. \_\_\_\_\_ Day. \_\_\_\_\_

Subject: \_\_\_\_\_

$$W = \int A (z - \alpha_1)^{\frac{\alpha_1 - 1}{\kappa}} (z - \alpha_2)^{\frac{\alpha_2 - 1}{\kappa}} \dots dz + B$$

$$\frac{dW}{dz} = A (z - \alpha_1)^{\frac{\alpha_1 - 1}{\kappa}} (z - \alpha_2)^{\frac{\alpha_2 - 1}{\kappa}} \dots$$

$$\arg\{dW\} = \arg\{dz\} + \arg\{A\} + \left(\frac{\alpha_1}{\kappa} - 1\right) \arg\{z - \alpha_1\} + \dots$$

$$\arg\{W = \text{cte.}\} = \text{یک خط راست}$$


گذران نقطه  $\alpha_1$  معادل تغییر آرگومان به اندازه  $\pi$  می باشد.

$$\arg z: 0 \rightarrow \pi \quad \leftarrow \text{گذران } \alpha_1$$

زاویه طرف اول به اندازه  $\pi(\alpha_1 - \pi)$  می شود یا  $\pi(\pi - \alpha_1)$  می شود.

$$\left(\frac{\alpha_1}{\kappa} - 1\right)\pi \rightarrow \alpha_1 - \pi$$

مثال:



$$\frac{dW}{dz} = A (z+1)^{-1/p} (z-1)^{-1/p} = \frac{A}{\sqrt{z^p - 1}} \rightarrow W = A \cosh^{-1} z + B$$

$$\begin{cases} j\pi = A \cosh^{-1}(-1) \\ 0 = A \cosh^{-1}(1) + B \end{cases} \rightarrow W = \cosh^{-1} z$$

مرجع این بحث: Field Theory of Guided Waves, Collin



برای تعیین  $z_c$  و  $C$  خطوط انتقال

۹۳

Year. \_\_\_\_\_ Month. \_\_\_\_\_ Day. \_\_\_\_\_

Subject: \_\_\_\_\_

مثال: ناحیه مورد بحث کل صفحه به غیر از محل خودتینها است.



$$W = \int A(z+1)^{-1}(z-0)^{-1}(z-1)^{-1} dz + B = \int \frac{A(z^2-1)}{z} dz + B = \dots$$


$$\dots = A\left(\frac{z^2}{2} - \ln z\right) + B$$

$$\begin{cases} jd = A\left(\frac{1}{2} - \ln(-1)\right) + B \\ 0 = A\left(\frac{1}{2} - \ln(1)\right) + B \end{cases}$$

از روابط مقابل ضرایب مجهول A و B یافته میشوند.

$$W = \frac{d}{\kappa} \left[ \frac{1-z^2}{2} + \ln z \right]$$

شکل کلی از یک طرفه به طرف دیگر جوابهای مساوی دقتی به ماها دهند تا به شکل های بسته:



$$\phi = A\theta + B = \frac{V_0}{\kappa} \theta$$

$$P_S = -\epsilon_0 \frac{\partial \phi}{\partial n} = -\epsilon_0 \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} = -\epsilon_0 \frac{1}{|\alpha|} \frac{V_0}{\kappa}$$

چون خازن ۲ صفحه موازی از یک طرفه نامحدود است پس در آن ظرفیت بینهایت است.

با انتخاب طول l به نقاط (E و F) در صفحه جدید ما رسیدیم.

New Classic

Year. \_\_\_\_\_ Month. \_\_\_\_\_ Day. \_\_\_\_\_

Subject: \_\_\_\_\_

$$Q = \int_{x_1}^{x_2} \epsilon_0 \frac{1}{x} \frac{V_0}{\pi} dx = \frac{\epsilon_0 V_0}{\pi} \ln \frac{x_2}{x_1}$$

در  $x_1$  و  $x_2$  ریشه های  
معادله زیر هستند.

$$-l = \frac{d}{\pi} \left[ \frac{(1-z^p)}{p} + \ln z \right]$$

$$l \gg d \rightarrow -\frac{l}{d} = \frac{1}{\pi} \left[ \frac{1-z^p}{p} + \ln z \right] \quad 0 < x_1 < 1, x_2 > 1$$

$$x_1: -\frac{l}{d} \approx \frac{1}{\pi} \ln x_1$$

$$x_2: -\frac{l}{p} \approx \frac{d}{\pi} \left( -\frac{x_2^p}{p} \right) \rightarrow x_2^p \approx \frac{\pi l}{d}$$

$$\ln x_2 \approx \frac{1}{p} \ln \frac{\pi l}{d} \rightarrow Q(l) = \frac{\epsilon_0 V_0}{\pi} \left( \frac{1}{p} \ln \frac{\pi l}{d} + \frac{\pi l}{d} \right)$$

$$\frac{Q}{V_0} = \frac{\epsilon_0 l}{d} + \frac{\epsilon_0}{\pi} \ln \frac{\pi l}{d}$$

اترلبها

در تریک خازن  $b \times b$ :

$$C = \frac{\epsilon_0 b^p}{p} + \frac{p b \epsilon_0}{\pi} \ln \frac{\pi b}{d}$$

تعمیر ظرفیت به  $Q$ :

- استفاده از تابع گرین (روش Variational)

- استفاده از روش تطبیقی


مثال بالا از کتاب الکترومقناطیس Collin گرفته شده است.



95

Year. \_\_\_\_\_ Month. \_\_\_\_\_ Day. \_\_\_\_\_

Subject: \_\_\_\_\_



حل مسئله با روش پواسن به کمک توابع گرین:

$$\nabla^2 V = -\frac{P}{\epsilon}$$

شرایط مرزی:

$$y=h: \epsilon_1 \frac{\partial V}{\partial y} - \epsilon_2 \frac{\partial V}{\partial y} = -P$$


$$\frac{\partial V}{\partial x} \Big|_{h^+} = \frac{\partial V}{\partial x} \Big|_{h^-}$$

اگر تابع گرین در داخل به صورت  $G(x, y, x_0, y_0)$  فرض شود:

$$V(x, y) = \int_{x_0} \frac{G(x, y, x_0, y_0) P}{\epsilon} dx_0$$

تابع گرین مسئله

$$\frac{\partial^2 G}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 G}{\partial y^2} = -\frac{1}{\epsilon} \delta(x-x_0) \delta(y-y_0)$$



ایده حسن زدن فرم جواب برای تابع گرین:

$$G = \sum_{\text{فرد } n} f_n(y) \cos \frac{n\pi x}{a}$$

$$\sum_n \left[ \frac{d^2 f_n}{dy^2} - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 f_n \right] \cos \frac{n\pi x}{a} = -\frac{1}{\epsilon} \delta(x-x_0) \delta(y-y_0)$$

فرضه را در  $\cos \frac{n\pi x}{a}$  ضرب می کنیم و انتگرال می گیریم و به کمک ایزر

میرسیم:

$$\frac{d^2 f_n}{dy^2} - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 f_n = -\frac{1}{\epsilon} \cos \left(\frac{n\pi x_0}{a}\right) \delta(y-y_0)$$

Year. \_\_\_\_\_ Month. \_\_\_\_\_ Day. \_\_\_\_\_


Subject: \_\_\_\_\_

«۸۹، ۸، ۱۸»

جلسه ۱۴

ریاضی مهندسی:

۲  
که بررسی مساختم مقابل جابوشها:



۱- روش variational

۲- روش تحلیلی

محدایافته  $\epsilon_2$  و  $C$  است.

$$\frac{\partial^2 G}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 G}{\partial y^2} = -\frac{1}{\epsilon} \delta(x-x_0) \delta(y-y_0)$$

$$G = \sum_{n=1,3,5,\dots} P_n(y) \cos \frac{n\pi x}{a}$$

$$\frac{d^2 P_n}{dy^2} - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 P_n = -\frac{1}{\epsilon} \cos\left(\frac{n\pi x_0}{a}\right) \delta(y-y_0)$$

$$P_n(y) = \begin{cases} C_1 \sinh\left(\frac{n\pi}{a} y\right) \\ C_2 \sinh\left(\frac{n\pi}{a} (b-y)\right) \end{cases}$$

که مواردی که باید بررسی شوند:

۱) پیوستگی پتانسیل:  $C_1 \sinh \frac{n\pi}{a} h = C_2 \sinh \left(\frac{n\pi}{a} (b-h)\right)$

۲) شرط منبع:  $\hat{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \rho_s : \epsilon_2 \frac{dP_n}{dy} \Big|_{y=h^+} - \epsilon_1 \frac{dP_n}{dy} \Big|_{y=h^-} = -\frac{\cos \frac{n\pi x_0}{a}}{a}$

97

Year. \_\_\_\_\_ Month. \_\_\_\_\_ Day. \_\_\_\_\_

Subject: \_\_\_\_\_

$$G = \begin{cases} \sum_{n>0} c_n \sinh\left(\frac{n\pi y}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \\ \sum_{n>0} c_n \sinh\left(\frac{n\pi (b-y)}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \end{cases}$$

$$C = \frac{Q}{V_0} \rightarrow \int P(x_0) dx_0 \rightarrow C = \frac{Q^p}{QV_0}$$


$$Q^p = \int Q P(x_0) dx_0 = \iint P(x) P(x_0) dx dx_0$$

$$V_0 = \int_{x_0} P(x_0) G dx_0 \rightarrow C = \frac{Q^p}{QV_0} = \frac{\left[\int_{x_0} P(x_0) dx_0\right]^p}{\iint_{x, x_0} P(x) P(x_0) G dx dx_0}$$

$$P \propto \frac{1}{1 + \alpha|x|}$$

نحوه توزیع بار روی یک دیسک به شعاع  $a$ :

$$P \propto \frac{1}{\sqrt{a^2 - r^2}}$$




راه‌ها مختلف یافتن توزیع بار روی یک دیسک:

راه اول: برای یافتن تابع  $P(r')$  ابتدا برای یک نقطه  $Q$  پتانسیل  $V$  را یافته

سپس این نقطه را روی دیسک قرار می‌دهیم و پتانسیل آن را برابر

$V_0$  می‌گیریم و به یک معادله انتگرالی برای یافتن  $P(r')$  می‌رسیم

راه دوم: در دستگاه مقابل




oblate spheroid

$$C = 18.6a$$

New Clasic

مسئله اصلی را ادامه می دهیم و آنرا به چند بخش تقسیم می کنیم و معادله را در هر بخش حل می کنیم. در ابتدا فرض می کنیم



کفایت وجود ندارد

$$V_p(x, y) = \sum_n B_n \sinh\left(\frac{n\pi}{b} \left(\frac{a}{\mu} - x\right)\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b} y\right)$$

فرد

این جواب معادله لاپلاس در این بخش است و بسیار دقیق است.

جواب قسمت 1 را با تقریب حل می کنیم:

$$V_1 = \frac{\mu V_0}{b} y \quad \frac{w}{\mu} \gg l$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} B_n \sinh\left(\frac{n\pi}{b} \left(\frac{a}{\mu} - \frac{w}{\mu}\right)\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b} y\right) \equiv \frac{\mu V_0}{b} y$$

$C_n$

$$B_n = \frac{\mu V_0 \sin(n\pi/\mu)}{n^2 \pi^2 \sinh\left(\frac{n\pi}{\mu b} (a-w)\right)}$$

حال  $B_n$  و  $C_n$  را می یابیم از روی  $V$  می توانیم معادله را محاسبه کرد.

$$E_{px} = -\frac{\partial V}{\partial x}, \quad E_{py} = -\frac{\partial V}{\partial y} \quad W_p = \frac{1}{\mu} \int \epsilon |E|^2 dV$$

انرژی

$$W_p = \sum_{n \neq 0} \frac{\mu \epsilon V_0^2}{n^4 \pi^4} \frac{\sinh^2\left(\frac{n\pi}{b} (a-w)\right)}{\sinh^2\left(\frac{n\pi}{\mu b} (a-w)\right)}$$

$$C = \epsilon \left[ \frac{\mu w}{b} + \frac{\mu \mu}{\pi^4} \sum_{n \neq 0} \frac{1}{n^4} \frac{\sinh^2\left(\frac{n\pi}{b} (a-w)\right)}{\sinh^2\left(\frac{n\pi}{\mu b} (a-w)\right)} \right]$$

99


Year. \_\_\_\_\_ Month. \_\_\_\_\_ Day. \_\_\_\_\_

Subject: \_\_\_\_\_

در جمع این قسمت کتاب Collin است.

مثال: جهت آوردن گران بالا بردن C به روش Variational

$$C = \frac{\frac{1}{\mu} \epsilon \int_V |\vec{E}|^{\mu} dV}{\frac{1}{\mu} V_0^{\mu}} = \frac{W_e}{\frac{1}{\mu} V_0^{\mu}}$$



$$C = \frac{\epsilon \int_S |\vec{\nabla}_t \Phi|^{\mu} ds}{\left| \int_a^b \vec{\nabla}_t \Phi \cdot d\vec{l} \right|^{\mu}}$$


ابتداءً تقریباً  $\Phi$  میزنیم:

$$\Phi = A_0 + A_1 r$$

$$C = \frac{\epsilon \int_0^{\pi} \int_a^b A_1^{\mu} r dr d\varphi}{\left| \int_a^b A_1 dr \right|^{\mu}} = \pi \epsilon \left( \frac{b+a}{b-a} \right) \leftarrow \begin{array}{l} \text{ظرفیت خازنه با} \\ \text{تقریب} \end{array}$$

$$C = \frac{\mu \pi \epsilon}{\ln(b/a)} \quad \ln(b/a) = \mu \left[ \frac{b-a}{b+a} + \frac{1}{\mu} \left( \frac{b-a}{b+a} \right)^{\mu} + \dots \right]$$

اگر خاصه  $\mu$  استوانه خیلی کم باشد این تقریب معتبر است.





$$C \approx \mu \pi \epsilon \leftarrow b = \mu a$$

$$C = \mu \pi \epsilon \quad \text{ذبا} = \frac{0.1}{\mu} = 10\%$$

Year. \_\_\_\_\_ Month. \_\_\_\_\_ Day. \_\_\_\_\_

Subject: \_\_\_\_\_

که برای یافتن مقادیر ویژه تقریبی می توانیم از توابع زیر هم استفاده کنیم:



که اگر بخواهیم رسیدن به دقت بیشتر از تقریب زیر استفاده کنیم داریم:


$$C = A_0 + A_1 \gamma + A_2 \gamma^2 \rightarrow C \cong \mu, \lambda, \lambda, \lambda$$

با انتخاب این فرض برای C مسئله over define میشود. ما کمترین C را از تغییرات پارامترهای  $A_0$  و  $A_1$  و  $A_2$  را اختیار می کنیم پس:

$$\frac{\partial C}{\partial A_0} = \frac{\partial C}{\partial A_1} = \frac{\partial C}{\partial A_2} = 0$$

ریاضی مهندسی: جلسه ۱۵  $\langle\langle \lambda_1, \lambda_2, \mu \rangle\rangle$


که ظرفیت یک خازن نیمه محدود:




جریست آوردن ظرفیت یا امپدانس مشخصه شکل مقابل به کمک روش Variational و توابع گریه



که با استفاده از نگاشت شوارتز گریستوفل این شکل را به شکل نیم صفا چل می کنیم:



ما با گشت ترکیبی شکل بالا به دو صفحه موازی را پیدا کنیم. نگاشت اول شوارتز کریستوفل است.



$$Z = A_1 \int (t+1)(t-\alpha)^{-1} dt + A_2$$

$$w = D \ln t + E$$

$$Z = A_1 \int \frac{t+1}{t} dt + A_2$$

اگر ما از شکل P صفحه موازی به نیمه بالا برویم داریم:

$$Z = A_1 (t + \ln t) + A_2$$

$$W = D \int (t-\alpha)^{-1} dt + E$$

$$W = D \ln t + E$$

$$Z = \frac{h}{\pi} (1+t + \ln t)$$

در این مرحله نیز از شوارتز کریستوفل استفاده گرفته ایم.

$$u_1 = D \ln(-1) + E \rightarrow u_1 = j\pi D + E$$

گذر از نقطه تکین B برآ یافته ضرایب مجهول:

$$dw = \frac{D}{t}$$

$$\int_{u_1}^{u_2} dw = D \int_{\pi}^0 \frac{j\epsilon e^{j\theta}}{\epsilon e^{j\theta}} d\theta \rightarrow u_2 - u_1 = -j\pi D$$

$$W = u_2 + j \left( \frac{u_2 - u_1}{\pi} \right) \ln t$$


Year. \_\_\_\_\_ Month. \_\_\_\_\_ Day. \_\_\_\_\_

Subject: \_\_\_\_\_

$$t = e^{\frac{\pi(\omega - u_r)}{j(u_r - u_l)}}, \quad \omega = u_l + jv$$

$$x + jy = \frac{h}{\pi} \left[ 1 + e^{j \frac{\pi(\omega - u_r)}{u_r - u_l}} + \frac{\pi(\omega - u_r)}{j(u_r - u_l)} \right]$$

$$x + jy = \frac{h}{\pi} (1 - \pi v + e^{-\pi v} \cos(\pi u)) + j \frac{h}{\pi} (\pi u + e^{-\pi v} \sin(\pi u))$$



$$\left. \begin{aligned} x = -b \\ v_l \rightarrow -b = \frac{h}{\pi} (1 - \pi v_l + e^{-\pi v_l} \cos(\pi u_l)) \\ v_r \rightarrow -b = \frac{h}{\pi} (1 - \pi v_r + e^{-\pi v_r} \cos(\pi u_r)) \end{aligned} \right\}$$

تا این جا حل دقیقاً بوده است و باروشها عددی می توان در حد دقیقاً یافت ولی در حد  $\frac{h}{b} \ll 1$  است:

$$\frac{h}{b} \ll 1 \rightarrow \{u_l = 1, u_r = 0\}$$

$$\left\{ \begin{aligned} -\frac{\pi b}{h} &= 1 - \pi v_l - e^{-\pi v_l} \rightarrow \frac{\pi b}{h} \sim 1 - \pi v_l \\ -\frac{\pi b}{h} &= 1 - \pi v_r - e^{-\pi v_r} \rightarrow \frac{\pi b}{h} \sim 1 - e^{-\pi v_r} \end{aligned} \right.$$

$$v_l - v_r = \frac{1}{\pi} \left[ 1 + \frac{b\pi}{h} + \ln\left(1 + \frac{b\pi}{h}\right) \right]$$

$$C = \frac{\epsilon_0}{\pi} \left[ 1 + \frac{b\pi}{h} + \ln\left(1 + \frac{b\pi}{h}\right) \right]$$

$$C = \frac{\epsilon_0 b}{h} + \left\{ \frac{\epsilon_0}{\pi} + \frac{\epsilon_0}{\pi} \ln\left(1 + \frac{b\pi}{h}\right) \right\}$$

New Clasic

فازده جزء اولیه

اثربیه




1010

Year. \_\_\_\_\_ Month. \_\_\_\_\_ Day. \_\_\_\_\_

Subject: \_\_\_\_\_

مسئله ۲ :

ربع ساختار را در نظر می گیریم  
و آن را دوباره به دو بخش  
I و II تقسیم می کنیم.



روش Variational :

$$\phi_I = \frac{V_0}{a}y + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cosh\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{a}\right)$$

در حد y = a لایس

اگر یک بعد را سینوسی بگیریم دیگری باید بویست است.

$$\phi_{II} = \sum_{n>0} b_n \sin\left(\frac{n\pi y}{d}\right) e^{-\frac{n\pi x}{d}}$$

به دلیل ساختارناهمگون

بیوستاتی تقابلی

$$\frac{V_0}{a}y + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cosh\left(\frac{n\pi l}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{a}\right) = \sum_{n>0} b_n e^{-\frac{n\pi l}{d}} \sin\left(\frac{n\pi y}{d}\right)$$

بیوستاتی ویژگی الکتریکی

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\pi}{a} a_n \sinh\left(\frac{n\pi l}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{a}\right) = \dots$$

$$\dots = \sum_{n>0} \frac{n\pi}{d} b_n e^{-\frac{n\pi l}{d}} \sin\left(\frac{n\pi y}{d}\right)$$